

Pregunta 6
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
✓ Marcar pregunta

En el examen vaginal:

Seleccione una:

- a. Se deben tomar ciertas medidas de asepsia, manos limpias y uso de guantes estériles
- b. Se realizarán los estrictamente necesarios; normalmente en la fase de dilatación bastará un examen cada cuatro horas
- c. Entre sus indicaciones está una disminución de la intensidad y frecuencia de las contracciones, antes de administrar analgésicos, cuando la mujer tenga sensación de pujo
- ☒ d. Todas las respuestas son correctas ✓

La respuesta correcta es: Todas las respuestas son correctas

Pregunta 7
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
✓ Marcar pregunta

Respecto a la auscultación de la frecuencia cardiaca fetal:

Seleccione una:

- a. La sensibilidad para identificar riesgo de pérdida de bienestar fetal es alta, pero su especificidad es baja
- b. Proporciona un elevado índice de falsos positivos
- c. En embarazos de alto riesgo, ha demostrado ser útil
- ☒ d. Todas son correctas ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 8
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
✓ Marcar pregunta

¿A qué se llama actividad uterina eficaz?

Seleccione una:

- a. La presencia de cinco contracciones en diez minutos
- b. La presencia de dos contracciones en diez minutos
- ☒ c. La que favorece la progresión del parto sin efectos adversos para la madre y el feto ✓
- d. Todas son correctas

La respuesta correcta es: La que favorece la progresión del parto sin efectos adversos para la madre y el feto

Pregunta 9
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
✓ Marcar pregunta

¿En qué casos se justifica una amniotomía?

Seleccione una:

- a. Siempre que la mujer alcance los 3 cm de dilatación
- b. Después de administrar oxitocina
- ☒ c. Cuando exista sospecha de líquido amniótico meconial ✓
- d. Para una monitorización externa

La respuesta correcta es: Cuando exista sospecha de líquido amniótico meconial

Pregunta 10
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
✓ Marcar pregunta

La monitorización biofísica fetal puede realizarse con:

Seleccione una:

- a. Estetoscopio de Pinard
- b. Detector ultrasónico
- c. Cardiotocografía
- ☒ d. Todas son correctas ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas