

Pregunta 11
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

¿Qué cuidados inmediatos se deben prestar al neonato?

Seleccione una:

- a. Evitar el contacto con el abdomen materno
- b. Asegurar que tiene la vía aérea libre ✓
- c. Disminuir su temperatura corporal
- d. Todas son correctas

La respuesta correcta es: Asegurar que tiene la vía aérea libre

Pregunta 12
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

¿Qué maniobra se utiliza una vez que la placenta comienza a salir al exterior?

Seleccione una:

- a. Ahfeld
- b. Branch
- c. Dublin ✓
- d. Küstner

La respuesta correcta es: Dublin

Pregunta 13
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

¿Cuál es el procedimiento de elección de analgesia intraparto en España?

Seleccione una:

- a. Analgesia caudal
- b. Analgesia de pudendos
- c. Dolantina + Haloperidol
- d. Analgesia epidural ✓

La respuesta correcta es: Analgesia epidural

Pregunta 14
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

¿Qué síntoma no aparece al comienzo del expulsivo?

Seleccione una:

- a. Se sienten deseos de empujar, ya que la cabeza fetal o las membranas presionan el recto
- b. Se suele producir una rotura espontánea de membranas
- c. El cérvix ha alcanzado su dilatación completa
- d. Suele disminuir el nivel de conciencia materno ✓

La respuesta correcta es: Suele disminuir el nivel de conciencia materno

Pregunta 15
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

La presión arterial del feto:

Seleccione una:

- a. Está determinada por los movimientos fetales
- b. Durante el periodo de dilatación produce un aumento del pH fetal
- c. Es un mecanismo protector durante los episodios anóxicos que producen las contracciones uterinas en el parto ✓
- d. Sólo la placenta determina que el feto no tenga peligro en estos episodios anóxicos

La respuesta correcta es: Es un mecanismo protector durante los episodios anóxicos que producen las contracciones uterinas en el parto