

Pregunta 1

¿Cuáles son las hormonas que suelen intervenir para determinar el funcionamiento ovárico?

Seleccione una:

- a. Estradiol y PRL
- b. Estradiol y FSH
- c. Estradiol, LH y PRL
- d. FSH y LH

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Estradiol y FSH

Pregunta 2

¿En qué consiste la histerosalpingografía?

Seleccione una:

- a. Es la visualización del interior de la cavidad uterina mediante una óptica que se introduce por el cérvix
- b. Es la visualización por ecografía de la cavidad uterina tras haberla distendido con suero fisiológico
- c. Es la visualización radiológica de la cavidad uterina y de las trompas, mediante la introducción de un contraste radiopaco a través del cérvix
- d. Es la visualización de todos los órganos de la pelvis, mediante la introducción de una cámara, previa insuflación en el abdomen de CO₂

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Es la visualización radiológica de la cavidad uterina y de las trompas, mediante la introducción de un contraste radiopaco a través del cérvix

Pregunta 3

¿Qué es un útero bicorne bicollis?

Seleccione una:

- a. Útero doble con duplicación del cérvix y vagina normal
- b. Útero doble con cérvix y vagina normal
- c. Útero con ligera depresión en el fondo
- d. Útero doble con duplicación de cérvix y vagina

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Útero doble con duplicación del cérvix y vagina normal

Pregunta 4

¿Qué consecuencias tiene la edad sobre la capacidad reproductiva en la mujer?

Seleccione una:

- a. Disminuye porque se produce anovulación y un aumento importante de andrógenos
- b. Disminuye por alteraciones en la mucosa endometrial, afectando a la implantación embrionaria
- c. Disminuye por un descenso progresivo en la dotación folicular y una peor calidad ovocitaria
- d. Realmente no tiene ninguna consecuencia negativa sobre la capacidad reproductiva de la mujer

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Disminuye por un descenso progresivo en la dotación folicular y una peor calidad ovocitaria

Pregunta 5

¿Cuáles son las patologías más frecuentes que afectan a la correcta funcionalidad de las trompas de Falopio?

Seleccione una:

- a. Infecciones agudas que pueden afectar al útero, trompas y ovarios
- b. EIP, endometriosis, hidrosalpinx y presencia de cicatrices u obstrucción producida por cirugías previas
- c. Endometriosis e hidrosalpinx
- d. EIP e hidrosalpinx

Retroalimentación

La respuesta correcta es: EIP, endometriosis, hidrosalpinx y presencia de cicatrices u obstrucción producida por cirugías previas

Pregunta 6

Hablamos de menopausia precoz si los síntomas empiezan a aparecer antes de:

Seleccione una:

- a. 40 años
- b. 45 años
- c. 35 años
- d. 30 años

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 40 años

Pregunta 7

¿Cuál es la definición de fertilidad humana?

Seleccione una:

- a. Capacidad fisiológica de una mujer para concebir
- b. Capacidad funcional de una pareja para obtener un embarazo normal
- c. Capacidad fisiológica de un varón para fecundar
- d. Capacidad fisiológica de una mujer, de un hombre o pareja para generar un hijo vivo

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Capacidad fisiológica de una mujer, de un hombre o pareja para generar un hijo vivo

Pregunta 8

¿Cómo se manifiesta clínicamente el síndrome del ovario poliquístico?

Seleccione una:

- a. Irregularidades menstruales, hirsutismo y acné
- b. Irregularidades menstruales e hirsutismo
- c. Infertilidad, irregularidades menstruales, hirsutismo, alteraciones lipídicas, acné y pérdida de cabello en la zona frontal
- d. Irregularidades menstruales e infertilidad

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Infertilidad, irregularidades menstruales, hirsutismo, alteraciones lipídicas, acné y pérdida de cabello en la zona frontal

Pregunta 9

¿Cuáles son las patologías más comunes en el factor ovárico?

Seleccione una:

- a. La endometriosis y el Síndrome del ovario poliquístico
- b. Síndrome del ovario poliquístico, la menopausia precoz y la anexectomía
- c. La mala calidad ovocitaria y la causa genética
- d. Síndrome del ovario poliquístico, la endometriosis, mala calidad ovocitaria, anexectomía, la menopausia precoz y la causa genética

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Síndrome del ovario poliquístico, la endometriosis, mala calidad ovocitaria, anexectomía, la menopausia precoz y la causa genética

Pregunta 10

En países desarrollados, la tasa de parejas estériles que no acuden a la consulta para solucionar su problema se sitúa:

Seleccione una:

- a. En el 80%
- b. Entre el 25-50%
- c. En el 15%
- d. En el 100%

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Entre el 25-50%

Pregunta 11

Existe un 15% de riesgo de aborto espontáneo. Este porcentaje alude a:

Seleccione una:

- a. Interrupciones voluntarias del embarazo
- b. Interrupciones del embarazo confirmado mediante análisis hormonales y/o ecografía
- c. Interrupciones del embarazo provocadas por una alteración genética
- d. Interrupciones del embarazo derivadas de la edad materna

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Interrupciones del embarazo confirmado mediante análisis hormonales y/o ecografía

Pregunta 12

¿Cómo se denomina la incapacidad de obtener un embarazo tras doce meses de coitos sin protección anticonceptiva?

Seleccione una:

- a. Esterilidad
- b. Fecundidad
- c. Infertilidad
- d. Anovulación

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Esterilidad

Pregunta 13

Se sabe que la posibilidad de que una gestación siga su curso normal es del 97% una vez que:

Seleccione una:

- a. La mujer está gestante de al menos cinco semanas

- b. La mujer ya ha tenido un embarazo con recién nacido vivo
- c. La prueba de embarazo es positiva
- d. Existe confirmación ecográfica del latido cardiaco embrionario

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Existe confirmación ecográfica del latido cardiaco embrionario

Pregunta 14

¿Cuál de las siguientes respuestas se corresponde con esta definición: “tumor benigno del músculo liso, no encapsulado, compuesto sobre todo de músculo, pero con algunos elementos de tejido conjuntivo fibroso”?

Seleccione una:

- a. Pólipo endometrial
- b. Mioma uterino
- c. Sinequia
- d. Tabique uterino

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Mioma uterino

Pregunta 15

Identifica un factor condicionante de la evaluación de la prevalencia de la esterilidad en una población:

Seleccione una:

- a. La dificultad para encontrar una estabilidad familiar y/o económica
- b. Las infecciones que originan una EPI
- c. La edad de las parejas que comienzan a intentar obtener un embarazo
- d. La existencia de mujeres solteras con deseo gestacional que quieren someterse a una TRA

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La edad de las parejas que comienzan a intentar obtener un embarazo

Pregunta 16

¿Cuál de los siguientes no es un motivo de la falta de consulta?

Seleccione una:

- a. Falta de interés
- b. Coste económico, ignorancia o desconocimientos
- c. Olvidar la cita



d. A y C son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: A y C son correctas

Pregunta 17

¿Cuál de las siguientes se considera una técnica de recuperación quirúrgica de espermatozoides?

Seleccione una:



a. Biopsia testicular



b. Vasectomía



c. Seminograma



d. Test de Hühner-Insler

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Biopsia testicular

Pregunta 18

¿Qué es la oligozoospermia?

Seleccione una:



a. Ausencia total de espermatozoides en el eyaculado



b. Concentración de espermatozoides inferior a 20 millones/cc en el eyaculado



c. Disminución en la movilidad de los espermatozoides



d. Presencia de una proporción anormalmente elevada de espermatozoides con morfología alterada

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Concentración de espermatozoides inferior a 20 millones/cc en el eyaculado

Pregunta 19

¿Cuál de los siguientes es un motivo de la falta de consulta?

Seleccione una:



a. Falta de deseo de procreación en la pareja.



b. Coste económico, ignorancia o desconocimientos



c. Olvidar la cita



d. Todas son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Coste económico, ignorancia o desconocimientos

Pregunta 20

¿Cuál es el porcentaje en el que se sitúan las parejas que tienen algún problema de esterilidad a lo largo de su vida reproductiva?

Seleccione una:

- a. 10-15%
- b. 25-50%
- c. 75-80%
- d. 95-100%

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 10-15%