

Navegación por el cuestionario

i

1

2

3

4

5

Finalizar revisión

Comenzado el	martes, 26 de junio de 2018, 15:47
Estado	Finalizado
Finalizado en	martes, 26 de junio de 2018, 15:53
Tiempo empleado	5 minutos 53 segundos
Puntos	5,00/5,00
Calificación	<b>10,00</b> de un máximo de 10,00 ( <b>100%</b> )
Comentario -	<b>APTO</b>

Información

Marcar pregunta

Paciente de 80 años que ingresa en urgencias el 20 de Febrero por RAO (retención aguda de orina) tras haber sido dado de alta a su domicilio hace 24 horas tras recuperación de una RTU (resección transuretral) por hiperplasia benigna de próstata. El día previo al alta, se le retiró la sonda vesical, realizando micción espontánea positiva, con orina clara (previamente a la retirada de la sonda vesical, la orina no contenía restos hemáticos). Antecedentes personales: HTA, EPOC (con uso de oxígeno domiciliario), hipoacusia derecha (utilización de audífono), lumbalgia. El paciente refiere dolor agudo en zona suprapúbica (Escala EVA: 8). El paciente refiere no fiebre termometrada, toma de antibióticos y analgesia en domicilio según pauta médica y toma de 1 comprimido de aspirina hace 12 horas debido a que el paracetamol según refiere el paciente " a él no le hace efecto".

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Debido a la patología del paciente y al dolor que refiere en zona suprapúbica, ¿qué esperamos encontrar al inspeccionar el abdomen del paciente?

Seleccione una:

☐ a. Abdomen blando y depresible

☐ b. Signo de Blumberg positivo

☒ c. Zona suprapúbica endurecida y con sonido mate a la percusión ✓

☐ d. En el abdomen no encontraremos ningún hallazgo, en la zona dorsal encontraremos dolor a la palpación.

Zona suprapúbica endurecida y con sonido mate a la percusión. Signos identificativos de globo vesical.

La respuesta correcta es: Zona suprapúbica endurecida y con sonido mate a la percusión

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

¿Cuál será una de las primeras medidas a tomar?

Seleccione una:

☒ a. Toma de constantes y realización de historia indicando antecedentes y alergias. ✓

☐ b. Administración de analgesia

☐ c. Incentivar a beber agua para forzar diuresis

☐ d. Extracción de analítica

Toma de constantes y realización de historia indicando antecedentes y alergias

La respuesta correcta es: Toma de constantes y realización de historia indicando antecedentes y alergias.

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Tras valoración facultativa, el médico de guardia indica sondaje vesical. Una de las primeras medidas de asepsia con el paciente antes de realizar el sondaje es:

Seleccione una:

☒ a. Lo primero de todo es ponernos los guantes estériles

☒ b. Nos lavamos las manos, nos ponemos guantes limpios y realizamos lavado y desinfección de genitales del paciente. ✓

☐ c. Lubricar la sonda

☐ d. Colocar la bolsa colectora de orina en la parte baja de la cama.

Debemos lavarnos las manos y ponernos guantes limpios. Después, proceder al lavado y desinfección de genitales del paciente.

La respuesta correcta es: Nos lavamos las manos, nos ponemos guantes limpios y realizamos lavado y desinfección de genitales del paciente.

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

El paciente presentaba globo vesical de 1100 cc. ¿Cómo crees que se debe evacuar esa cantidad de orina?

Seleccione una:

☒ a. De forma rápida puesto que el paciente tiene dolor

☒ b. De forma intermitente, pinzando la sonda tras evacuar volúmenes aproximados de 300cc. ✓

☐ c. De forma intermitente, pinzando la sonda tras evacuar volúmenes aproximados de 50cc

☐ d. Todas son correctas

El vaciado de la retención de orina debe hacerse de forma intermitente, se pinzará la sonda cuando se drene a la bolsa una cantidad de orina aproximada a los 300cc. Se irá despinzando progresivamente hasta que la vejiga quede totalmente vacía.

La respuesta correcta es: De forma intermitente, pinzando la sonda tras evacuar volúmenes aproximados de 300cc.

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

¿Cuáles son los principales riesgos de portar una sonda vesical?

Seleccione una:

☐ a. Infección

☐ b. Dolor

☐ c. Sangrado por tracción accidental

☒ d. A y C son correctas ✓

Infección y sangrado por tracción accidental son riesgos que conlleva llevar una sonda vesical. Una sonda vesical no debe generar dolor una vez bien colocada.

La respuesta correcta es: A y C son correctas