

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Algunas de las manifestaciones clínicas que pueden presentar los pacientes que sufren una disección aórtica son:

Seleccione una:

- a. Dolor torácico, siendo la manifestación mas común.
- b. Hipotensión arterial y mala perfusión periférica previa a la ruptura.
- c. La mayoría son asintomáticas.
- d. Pulsos periféricos presentes, fuertes y simétricos

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Dolor torácico, siendo la manifestación mas común.

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Algunos de los problemas de colaboración que pueden aparecer en pacientes con dolor torácico en urgencias, son:

Seleccione una:

- a. Estrés por sobrecarga.
- b. Insuficiencia cardiaca, arritmias y parada cardiorrespiratoria.
- c. Retención urinaria, estreñimiento y aislamiento social.
- d. Cansancio del rol de cuidador.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Insuficiencia cardiaca, arritmias y parada cardiorrespiratoria.

Pregunta 3

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De las relaciones expuestas a continuación en relación al tratamiento del SCACEST señale la incorrecta:

Seleccione una:

- a. Tratamiento antitrombótico: AAS + Clopidogrel
- b. Estrategia de referfusión: ICP o fibrinólisis.
- c. Tratamiento analgésico: morfina o meperidina
- d. Tratamiento antiisquémico: Nitroglicerina, calcioantagonistas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Tratamiento antiisquémico: Nitroglicerina, calcioantagonistas.

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Dentro de las intervenciones de enfermería incluidas en la NIC que podemos realizar en un paciente con dolor no se encuentran:

Seleccione una:

- a. Administración de analgésicos.
- b. Manejo de la sedación.
- c. Administración de hemoderivados.
- d. Manejo del dolor.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Administración de hemoderivados.

Pregunta 5

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Dentro de las medidas generales de manejo del síndrome coronario agudo con elevación del ST (SCACEST) hay una que ha mostrado especial relevancia a la hora de disminuir la mortalidad por FV. Señale la correcta:

Seleccione una:

- a. Administración de nitratos.
- b. Dieta absoluta.
- c. Canalización de dos vías venosas periféricas de grueso calibre.
- d. Monitorización electrocardiográfica continua y acceso a desfibrilador.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Monitorización electrocardiográfica continua y acceso a desfibrilador.

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Dentro de los cuidados de enfermería del paciente con dolor torácico podemos encontrar:

Seleccione una:

- a. Toma de constantes y realización de ECG de 12 derivaciones, que debe estar correctamente realizado e interpretado antes de 30 minutos del primer contacto.
- b. Fomentar la realización de ejercicio físico durante su estancia en la unidad.
- c. Evitar maniobrar molestas para el paciente como la monitorización electrocardiográfica continua
- d. Prestar atención a signos de hipoperfusión como palidez cutánea y sudoración profusa, diferencias en pulsos radiales, presencia de pulsos pedios.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Prestar atención a signos de hipoperfusión como palidez cutánea y sudoración profusa, diferencias en pulsos radiales, presencia de pulsos pedios.

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Dentro de los factores de riesgo para sufrir una disección aórtica no se encuentra:

Seleccione una:

- a. Síndrome de Marfan.
- b. Edad avanzada.
- c. Cirrosis hepática.
- d. Hipertensión arterial.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Cirrosis hepática.

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Dentro de los signos de alarma que orientan a emergencia en el contexto del dolor torácico podemos encontrar:

Seleccione una:

- a. Dolor de inicio progresivo.
- b. Dolor que se alivia con antiácidos.
- c. Dolor acompañado de sudoración, náuseas y vómitos.
- d. Dolor acompañado de tetania y parestesias.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Dolor acompañado de sudoración, náuseas y vómitos.

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El diagnóstico del SCA se fundamenta en tres pilares fundamentales, señale la falsa:

Seleccione una:

- a. Clínica que presenta el paciente.
- b. Radiografía de tórax.
- c. Determinación de enzimas cardíacas.
- d. Electrocardiograma de 12 derivaciones compatible.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Radiografía de tórax.

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En el contexto del síndrome coronario agudo (señale la correcta):

Seleccione una:

- a. Se debe administrar oxigenoterapia en gafas nasales a todos los pacientes.
- b. No es preciso administrar oxigenoterapia.
- c. Se debe administrar oxigenoterapia a alta concentración a todos los pacientes.
- d. Se debe administrar oxigenoterapia cuando la saturación de oxígeno sea menor del 90por ciento medida por pulsioximetría.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Se debe administrar oxigenoterapia cuando la saturación de oxígeno sea menor del 90por ciento medida por pulsioximetría.

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En el contexto del síndrome coronario agudo, el dolor torácico atípico parece con más frecuencia en:

Seleccione una:

- a. Mayores de 75 años, mujeres, diabéticos, pacientes con insuficiencia renal crónica o con demencia.
- b. Mayores de 75 años, mujeres, hipertiroideos, pacientes con hepatopatía crónica o con demencia.
- c. Hombres, menores de 65 años, diabéticos y pacientes con demencia.
- d. Menores de 75 años, hombres, diabéticos, pacientes con insuficiencia renal crónica o sin demencia.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Mayores de 75 años, mujeres, diabéticos, pacientes con insuficiencia renal crónica o con demencia.

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En el tratamiento de la pericarditis aguda no se incluyen:

Seleccione una:

- a. Morfina.
- b. Fibrinólisis.
- c. Ninguno de los anteriores.

d. Nitritos

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Ninguno de los anteriores.

Pregunta 13

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En relación a las estrategias de reperfusión en el paciente con SCACEST, es cierto que:

Seleccione una:

- a. Dentro de las contraindicaciones absolutas para la fibrinólisis se encuentra el uso de anticoagulantes orales.
- b. El desarrollo de estrategias como el CODIGO INFARTO por parte de las distintas comunidades autónomas pretende disminuir el tiempo desde primer contacto médico hasta ICP primaria por debajo de los 180 minutos.
- c. El uso de fibrinolíticos se ha propuesto como alternativa a la intervención coronaria percutánea primaria cuando no es posible realizar esta en los tiempos recomendados en las guías.
- d. La fibrinólisis precoz es la terapia de reperfusión más accesible, fácil y efectiva y tiene una menor tasa de hemorragias graves.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: El uso de fibrinolíticos se ha propuesto como alternativa a la intervención coronaria percutánea primaria cuando no es posible realizar esta en los tiempos recomendados en las guías.

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En relación con las manifestaciones clínicas del aneurisma de aorta es cierto que:

Seleccione una:

- a. Los aneurismas abdominales pueden producir voz bitonal.
- b. En la mayoría de los casos cursa con sintomatología específica.
- c. El dolor lumbar es frecuente en los aneurismas localizados a nivel del cayado aórtico.
- d. El dolor torácico, cuando hay sintomatología, suele ser el síntoma más frecuente, variando sus características en función de la localización.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: El dolor torácico, cuando hay sintomatología, suele ser el síntoma más frecuente, variando sus características en función de la localización.

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En un paciente con un aneurisma de aorta, podemos encontrar riesgo de sangrado. Dentro de los criterios de resultado incluidos en a NOC que podemos plantearnos durante la planificación se encuentran:

Seleccione una:

- a. Prevención del shock.
- b. Administración de hemoderivados.
- c. Signos vitales: sin desviación del rango normal.
- d. Cuidados de la emergencia.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Signos vitales: sin desviación del rango normal.

Pregunta 16

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De las siguientes definiciones, cuál es correcta

Seleccione una:

- a. La cardiopatía isquémica es un ensanchamiento de más del cincuenta por ciento del diámetro, localizado y permanente de las arterias coronarias.
- b. Un aneurisma de aorta es la rotura de la capa íntima de la aorta, con el consiguiente acúmulo de sangre entre la capa media y la íntima.
- c. La disección aórtica se produce por un desequilibrio entre el aporte de oxígeno y su demanda en el tejido cardíaco, lo que origina una isquemia en el miocardio.
- d. La pericarditis aguda es un síndrome producido por la inflamación del pericardio.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La pericarditis aguda es un síndrome producido por la inflamación del pericardio.

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La cardiopatía isquémica se produce por un desequilibrio entre el aporte de oxígeno y su demanda en el tejido cardíaco, lo que origina una isquemia en el miocardio que puede manifestarse según su intensidad y duración como :

Seleccione una:

- a. Síndrome coronario agudo.
- b. Angina inestable
- c. Todas las anteriores.
- d. Angina estable.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las anteriores.

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La causa más frecuente de pericarditis es:

Seleccione una:

- a. El infarto agudo de miocárdico.
- b. Infección vírica.
- c. De origen neoplásica.
- d. Enfermedades autoinmunes

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Infección vírica.

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale la correcta en relación a los aneurismas de aorta:

Seleccione una:

- a. Todas son correctas.
- b. Se dice que es un aneurisma verdadero cuando afecta a las tres capas de la pared arterial.
- c. Es un ensanchamiento de más del cincuenta por ciento del diámetro, localizado y permanente que produce una debilidad en la arteria.
- d. Según la morfología pueden clasificarse en saculares o fusiformes.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 20

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Usted se encuentra trabajando en un servicio de urgencias. Uno de los pacientes que están a su cargo refiere dolor torácico. Usted decide realizarle un ECG. Tras

obtener el mismo (se muestra a continuación), cuál sería la secuencia de actuación

más apropiada

Seleccione una:

- a. Administrar analgesia pautada.
- b. Avisar al médico, mantener monitorizado al paciente y un desfibrilador accesible.
- c. Mantener al paciente en reposo absoluto, canalizar vía venosa periférica, administrar analgesia pautada, administrar oxigenoterapia al paciente y repetir el ECG en 15 minutos.
- d. Canalizar una vía venosa periférica, administrar oxigenoterapia al paciente y repetir el ECG en 15 minutos.

Retroalimentación

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Avisar al médico, mantener monitorizado al paciente y un desfibrilador accesible.