

Navegación por el  
cuestionario[Finalizar revisión](#)

**Comenzado el** martes, 8 de octubre de 2019, 07:34  
**Estado** Finalizado  
**Finalizado en** martes, 8 de octubre de 2019, 08:00  
**Tiempo empleado** 25 minutos 48 segundos  
**Puntos** 23,00/30,00  
**Calificación** 7,67 de un máximo de 10,00 (77%)  
**Comentario** - Apto

**Pregunta 1**

Correcta  
 Puntúa 1,00  
 sobre 1,00  
 Marcar  
 pregunta

En el caso de sospechar neumotórax a tensión, se procederá a su drenaje inmediato insertando:

Seleccione una:

- a. Un abocath del nº 16 en el segundo espacio intercostal de la línea media clavicular.
- b. Un abocath del nº 14 en el cuarto espacio intercostal de la línea media clavicular.
- c. Un abocath del nº 14 en el segundo espacio intercostal de la línea media clavicular. ✓
- d. Un abocath del nº 16 en el tercer espacio intercostal de la línea media clavicular.

**Pregunta 2**

Incorrecta  
 Puntúa 0,00  
 sobre 1,00  
 Marcar  
 pregunta

Durante la valoración primaria (ABCDE), en el apartado Airway no tenemos que:

Seleccione una:

- a. Colocar cánula de Guedell.
- b. Realizar estricto control cervical.
- c. Estabilizar hemodinámicamente. ✗
- d. Realizar IOT.

**Pregunta 3**

Correcta  
 Puntúa 1,00  
 sobre 1,00  
 Marcar  
 pregunta

Un paciente que abre los ojos al dolor, tiene una respuesta verbal confusa y localizar el dolor. Tiene un Glasgow de:

Seleccione una:

- a. 12/15
- b. 10/15
- c. 11/15 ✓
- d. 9/15

**Pregunta 4**

Correcta  
 Puntúa 1,00  
 sobre 1,00  
 Marcar  
 pregunta

Señala la respuesta incorrecta:

Seleccione una:

- a. Valorar el peristaltismo mediaste la auscultación nos aporta información relevante en el paciente politraumatizado. ✓
- b. Ante la sospecha de lesión medular hay que valorar la posibilidad de administrar corticoides.
- c. La fractura de pelvis puede provocar un sangrado elevado causando shock hipovolémico.
- d. En el caso de presentar luxaciones no se deben traccionar para evitar el aumento de las lesiones vasculo-nerviosas.

**Pregunta 5**

Incorrecta  
 Puntúa 0,00  
 sobre 1,00  
 Marcar  
 pregunta

Al valorar la pelvis de un paciente politraumatizado: Señala la respuesta correcta.

Seleccione una:

- a. La fractura de pelvis no provoca sangrado muy elevado.
- b. Que no haya rotación externa de MMII nos indica fractura de pelvis.
- c. El anillo pélvico se comprimirá con una mano. ✗
- d. El tratamiento irá encaminado a disminuir el dolor y tratar de forma precoz el shock hipovolémico antes de que se haya instaurado.

**Pregunta 6**

Correcta  
 Puntúa 1,00  
 sobre 1,00  
 Marcar  
 pregunta

En la clasificación de las hemorragias, en función de las pérdidas sanguíneas, las de tipo II corresponde a:

Seleccione una:

- a. TAs normal, FC menor que 100lpm. Fr 14-20rpm. y agitación
- b. TAs normal, FC menor que 100lpm. Fr 20-30rpm. y agitación. ✓
- c. TAs normal, FC mayor que 100lpm. Fr 20-30rpm. y agitación.
- d. TAs normal, FC menor que 100lpm. FR 20-30rpm. y ansioso.

**Pregunta 7**

Correcta  
 Puntúa 1,00  
 sobre 1,00  
 Marcar  
 pregunta

Señala la respuesta incorrecta:

Seleccione una:

- a. Si el relleno capilar es superior a 2 seg puede indicar mala perfusión.
- b. La piel fría es indicativo de buena perfusión. ✓
- c. La piel azulada, pálida o cérea indica mala perfusión.
- d. La piel húmeda puede indicar mala perfusión.

**Pregunta 8**

Incorrecta  
Puntúa 0,00  
sobre 1,00

Marcar  
pregunta

Un paciente que no abre los ojos al dolor, tiene una respuesta verbal incomprensible y localiza al dolor, su puntuación en la escala de coma de Glasgow es de:

Seleccione una:

- a. 6/15
- b. 11/15
- c. 8/15
- d. 9/15 ✗

**Pregunta 9**

Incorrecta  
Puntúa 0,00  
sobre 1,00

Marcar  
pregunta

Para detectar neumotórax auscultaremos:

Seleccione una:

- a. 2º-3º espacio intercostal de la cara anterior. ✗
- b. 1º-2º espacio intercostal de la cara anterior.
- c. 2º-3º espacio intercostal de la cara posterior.
- d. 1º-2º espacio intercostal de la cara posterior.

**Pregunta 10**

Correcta  
Puntúa 1,00  
sobre 1,00

Marcar  
pregunta

En la escala de coma de Glasgow, se procederá a la IOT con una puntuación:

Seleccione una:

- a. = 8 ✓
- b. menor que 7
- c. Entre 7 y 8
- d. mayor que 8

**Pregunta 11**

Correcta  
Puntúa 1,00  
sobre 1,00

Marcar  
pregunta

La infusión de rescate debe realizarse:

Seleccione una:

- a. Con solución coloide/cristaloide en una proporción 3:1 respectivamente.
- b. Con una solución coloide y cristaloide indistintamente.
- c. Con solución cristaloide (1500-2000cc) y si no responde se utilizará solución coloide. ✓
- d. Solución cristaloide (500cc) y si no responde, solución coloide.

**Pregunta 12**

Incorrecta  
Puntúa 0,00  
sobre 1,00

Marcar  
pregunta

La valoración secundaria incluye:

Seleccione una:

- a. Examen físico de cabeza a pies. ✗
- b. Historia clínica.
- c. A y B son correctas.
- d. Ninguna es correcta.

**Pregunta 13**

Correcta  
Puntúa 1,00  
sobre 1,00

Marcar  
pregunta

Los signos clínicos para evaluar el estado de perfusión tisular de un paciente son:

Seleccione una:

- a. Pulso, coloración de la piel, humedad, temperatura y relleno capilar. ✓
- b. Pulso, relleno capilar, PA y temperatura.
- c. Pulso, coloración de la piel, humedad y temperatura.
- d. Relleno capilar, estado de la piel y valoración de edemas.

**Pregunta 14**

Correcta  
Puntúa 1,00  
sobre 1,00

Marcar  
pregunta

El collarín debe cumplir tres requisitos:

Seleccione una:

- a. Ser semirrígido, tener apoyo mentoniano y orificio en la parte anterior.
- b. Ser rígido, tener apoyo mentoniano y orificio solo en la parte posterior.
- c. Ser rígido, tener apoyo mentoniano y orificio en la parte anterior. ✓
- d. Ser rígido, tener apoyo mentoniano y sin orificio en la parte anterior.

**Pregunta 15**

Correcta  
Puntúa 1,00  
sobre 1,00

Marcar  
pregunta

Al valorar el relleno capilar, nos indicará mala perfusión si:

Seleccione una:

- a. mayor que 3seg.
- b. menor que 2seg.

- c. mayor que 2seg. ✓  
 d. mayor que 4seg.

**Pregunta 16**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00 Marcar  
pregunta

Es conocido que la mortalidad del paciente politraumatizado responde a una distribución trimodal. Señala la respuesta incorrecta:

Seleccione una:

- a. El primer pico ocurre en los primeros minutos tras el accidente, aproximadamente en el 50% de los casos.  
 b. El segundo pico ocurre durante las primeras horas tras el traumatismo, aproximadamente en el 40% de los casos. ✓  
 c. El segundo pico ocurre durante las primeras horas tras el traumatismo, aproximadamente el 30% de los casos.  
 d. El tercer pico ocurre en los primeros días o semanas de ingreso en UCC, aproximadamente en el 20% de los casos.

**Pregunta 17**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00 Marcar  
pregunta

La mortalidad en el paciente politraumatizado responde a una distribución trimodal, el tercer pico suele deberse a:

Seleccione una:

- a. Rotura hepática.  
 b. Shock séptico y/o fracaso multiorgánico. ✓  
 c. Hemorragia intracraneal.  
 d. Todas son correctas.

**Pregunta 18**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00 Marcar  
pregunta

Existe una relación entre los cuadrantes y posibles órganos afectados. Al valorar la zona del mesogastrio valoraremos una afectación en:

Seleccione una:

- a. Intestino delgado. ✓  
 b. Colon ascendente.  
 c. Vejiga.  
 d. Colon descendente.

**Pregunta 19**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00 Marcar  
pregunta

Que estado mental tendrá un paciente que tiene una pérdida sanguínea de más de 2000ml. una TAs disminuida. FC mayor que 140lpm. y FR mayor que 35rpm.

Seleccione una:

- a. Agitado.  
 b. Confundido.  
 c. Somnoliento.  
 d. Letárgico. ✓

**Pregunta 20**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00 Marcar  
pregunta

En la clasificación de las hemorragias en función de la pérdida de sangre, cuando la TAs se ve disminuida y la FC mayor que 120lpm, la pérdida sanguínea corresponde a:

Seleccione una:

- a. mayor que 40%  
 b. Entre 750-1500ml  
 c. 30-40% ✓  
 d. mayor que 2000ml

**Pregunta 21**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00 Marcar  
pregunta

Señala la respuesta correcta:

Seleccione una:

- a. Hay que buscar el origen de las hemorragias y realizar compresión directa o indirecta sobre el punto de sangrado, elevar la extremidad afectada o realiza vendaje compresivo o colocar férulas neumáticas hasta controlar la hemorragia. ✓  
 b. Nunca se debe realiza un torniquete.  
 c. El uso de torniquetes no está indicado en amputaciones traumáticas, miembros catastróficos o hemorragias graves no controladas.  
 d. Ninguna respuesta es correcta.

**Pregunta 22**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00 Marcar  
pregunta

Si palpamos el pulso radial, esto nos indica una TAs:

Seleccione una:

- a. mayor que 90mmHg.  
 b. mayor que 70mmHg.  
 c. mayor que 60mmHg.  
 d. mayor que 80mmHg. ✓

**Pregunta 23**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00 Marcar  
pregunta

Si palpamos el pulso carotideo:

Seleccione una:

- a. Tas mayor que 60mmHg. ✓  
 b. TAs mayor que 70mmHg.  
 c. Tas mayor que 80mmHg.

d. Ninguna respuesta es correcta.

**Pregunta 24**

Correcta  
Puntúa 1,00  
sobre 1,00

🚩 Marcar  
pregunta

Un paciente que tiene problemas de oxigenación o de mala perfusión tisular, ¿Qué zonas se ven primero afectadas?:

Seleccione una:

- a. Las zonas de presión.
- b. Los miembros superiores.
- c. Los miembros inferiores.
- d. Las mucosas, labios, encías y lechos ungueales. ✓

**Pregunta 25**

Correcta  
Puntúa 1,00  
sobre 1,00

🚩 Marcar  
pregunta

La evaluación inicial se suele dividir en dos fases, durante el reconocimiento primario:

Seleccione una:

- a. Se establece un balance global de las lesiones existentes.
- b. Consiste en la identificación de lesiones leves y el inicio de medidas terapéuticas.
- c. Identifica las lesiones por aparatos.
- d. Consiste en la identificación de lesiones graves y el inicio de medidas terapéuticas. ✓

**Pregunta 26**

Incorrecta  
Puntúa 0,00  
sobre 1,00

🚩 Marcar  
pregunta

Señala la respuesta correcta:

Seleccione una:

- a. Con una perfusión y volemia adecuada el color de la piel es azulado.
- b. En un paciente politraumatizado siempre se colocará SNG y SV.
- c. Abrigaremos al paciente tapándole con una manta, pero nunca administraremos sueros calientes. ✗
- d. Una consecuencia directa de la exposición del paciente es la hipotermia.

**Pregunta 27**

Correcta  
Puntúa 1,00  
sobre 1,00

🚩 Marcar  
pregunta

Al valorar las pupilas nos fijaremos en:

Seleccione una:

- a. Si son reactivas y en su tamaño.
- b. El tamaño, reactividad y forma. ✓
- c. Su forma, reactividad y si son anisocóricas.
- d. Si son reactivas.

**Pregunta 28**

Incorrecta  
Puntúa 0,00  
sobre 1,00

🚩 Marcar  
pregunta

Para asegurar el adecuado intercambio gaseoso a nivel alveolo-capilar, hay que mantener:

Seleccione una:

- a. PaO2 mayor que 60mmHg y SatO2 mayor que 90%
- b. PaO2 mayor que 55mmHg y SatO2 mayor que 90%
- c. PaO2 mayor que 60mmHg y SatO2 mayor que 93% ✗
- d. PaO2 menor que 60mmHg y SatO2 mayor que 90%

**Pregunta 29**

Correcta  
Puntúa 1,00  
sobre 1,00

🚩 Marcar  
pregunta

Señala la respuesta incorrecta:

Seleccione una:

- a. Las luxaciones no se deben traccionar ya que podremos producir o aumentar lesiones vasculo-nerviosas.
- b. El tratamiento de la fractura consiste en traccionar en el eje y posteriormente inmovilizar con férula.
- c. Es importante comprobar el pulso solo tras la inmovilización de la fractura. ✓
- d. La fractura abierta, fractura bilateral de fémur, de pelvis o secciones arteriales implican traslado urgente.

**Pregunta 30**

Correcta  
Puntúa 1,00  
sobre 1,00

🚩 Marcar  
pregunta

Si queremos valorar una posible afectación del bazo, nos fijaremos en el siguiente cuadrante:

Seleccione una:

- a. Hipocondrio derecho.
- b. Hipocondrio izquierdo. ✓
- c. Flanco derecho.
- d. Epigastrio.

[Finalizar revisión](#)