

Supuesto Práctico

Pregunta 1

Complete los siguientes enunciados:

La causa más frecuente de shock en los niños es el **HIPOVOLÉMICO**. Una de las causas de este shock es la **PERITONITIS**.

El shock **CARDIOGENICO** se debe a disfunción miocárdica PRIMARIA o fallo cardíaco secundario a HIPOXEMIA, que produce una menor contractilidad cardíaca.

Pregunta 2

Relacione la imagen con cada concepto

1. Barlow
2. Cefalohematoma
3. Reflejo de Moro

Pregunta 3

Relacione los siguientes conceptos

Reflejo de Moro: Arcaico
Hidronefrosis: Asimetría abdominal
Prueba de Hirschberg: Pupilas
Reflejo oral: Puntos cardinales
Perlas de Ebstein: Paladar

Pregunta 4

Complete los siguientes enunciados:

El reflejo oral se explora estimulando con un objeto como la piel de la región **PERIBUCAL** lo que provoca un reflejo de **SUCCIÓN**.

El reflejo de la marcha se explora manteniendo al niño en posición **VERTICAL**, ligeramente inclinado hacia **ADELANTE** y con los pies apoyados sobre un plano.

Pregunta 5

Relacione las características de cada tipo de shock:

Disociativo: Carboxihemoglobina elevada
Cardiogénico: hepatomegalia
Obstructivo: Hipoxemia profunda
Séptico: Precarga reducida
Hipovolémico: Taquicardia sin insuficiencia cardíaca