

**Pregunta 1**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

▼ Marcar pregunta

A la hora de calcular la TAS, dentro de la valoración secundaria a un paciente pediátrico mayor de 2 años, utilizaremos la fórmula:

Seleccione una:

- a.  $6 + (2 \times \text{edad en años})$
- b.  $7 + (2 \times \text{edad en años})$
- c.  $8 + (2 \times \text{edad en años})$  ✓
- d.  $9 + (2 \times \text{edad en años})$

La respuesta correcta es:  $8 + (2 \times \text{edad en años})$ **Pregunta 2**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

▼ Marcar pregunta

Entre los signos y síntomas circulatorios, ¿Cuáles no son indicadores fiables en los pacientes geriátricos?

Seleccione una:

- a. Relleno capilar
- b. Frecuencia cardíaca
- c. Tensión arterial
- d. Todas las respuestas son correctas ✓

La respuesta correcta es: Todas las respuestas son correctas

**Pregunta 3**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

▼ Marcar pregunta

En el caso de tener que colocar una Sonda Vesical a un paciente de 6-12 meses de edad, ¿Qué calibre utilizaría?

Seleccione una:

- a. 6-8
- b. 8 ✓
- c. 10

**Pregunta 1**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

A la hora de calcular la TAS, dentro de la valoración secundaria a un paciente pediátrico mayor de 2 años, utilizaremos la fórmula:

Seleccione una:

- a.  $6 + (2 \times \text{edad en años})$
- b.  $7 + (2 \times \text{edad en años})$
- c.  $8 + (2 \times \text{edad en años})$  ✓
- d.  $9 + (2 \times \text{edad en años})$

La respuesta correcta es:  $8 + (2 \times \text{edad en años})$

**Pregunta 2**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Entre los signos y síntomas circulatorios, ¿Cuáles no son indicadores fiables en los pacientes geriátricos?

Seleccione una:

- a. Relleno capilar
- b. Frecuencia cardíaca
- c. Tensión arterial
- d. Todas las respuestas son correctas ✓

La respuesta correcta es: Todas las respuestas son correctas

**Pregunta 3**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

En el caso de tener que colocar una Sonda Vesical a un paciente de 6-12 meses de edad, ¿Qué calibre utilizaría?

Seleccione una:

- a. 6-8
- b. 8 ✓
- c. 10
- d. 12

La respuesta correcta es: 8

Pregunta 4

Correcta

Puntuación 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

A la hora de valorar el estado neurológico de un paciente, utilizaremos:

Seleccione una:

- a. El cuestionario de Lobo
- b. El cuestionario de Pfeiffer
- c. La escala de coma Glasgow ✓
- d. Escala CRIES

La respuesta correcta es: La escala de coma Glasgow

Pregunta 5

Correcta

Puntuación 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

En una valoración primaria de un paciente, que orden se debe llevar:

Seleccione una:

- a. Circulación mayor que Ventilación mayor que Evaluación neurológica mayor que Vía aérea mayor que Exposición
- b. Vía aérea mayor que Ventilación mayor que Circulación mayor que Evaluación neurológica mayor que Exposición ✓
- c. Evaluación neurológica mayor que Ventilación mayor que Vía aérea mayor que Exposición mayor que Circulación
- d. Circulación mayor que Vía aérea mayor que Evaluación neurológica mayor que Exposición mayor que Ventilación

La respuesta correcta es: Vía aérea mayor que Ventilación mayor que Circulación mayor que Evaluación neurológica mayor que Exposición

**Pregunta 6**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Si un neonato tiene un llanto inconsolable, con una FiO2 para SatO2 mayor a 95% mayor que 0,3, con una FC y TAS menor al 20% de lo establecido como basal, con gemidos y despertar frecuente, ¿dentro de la escala de dolor para neonatos CRIES, que puntuación tendrá?

Seleccione una:

- a. 5
- b. 6
- c. 7
- d. 8 ✓

La respuesta correcta es: 8

**Pregunta 7**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Dentro del Índice de trauma pediátrico, que parámetros se deben valorar:

Seleccione una:

- a. Peso, TAS, SNC, heridas, fracturas y vía aérea ✓
- b. Llantos, SNC, TAS, heridas, fracturas y vía aérea
- c. Peso, TAS, coloración de la piel, heridas, fracturas y vía aérea
- d. Todas las respuestas son incorrectas

La respuesta correcta es: Peso, TAS, SNC, heridas, fracturas y vía aérea

**Pregunta 8**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

A la hora de intubar a un paciente pediátrico, ¿Qué dosis utilizaremos de Propofol?

Seleccione una:

- a. 0,3-0,5 mg/kg
- b. 2-3 mg/kg ✓
- c. 0,1-1 mg/kg
- d. 1-5 mc/kg

La respuesta correcta es: 2-3 mg/kg

**Pregunta 9**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

▼ Marcar pregunta

En una persona mayor a la hora de atender a un paciente geriátrico que ha sufrido un traumatismo, hay que tener presente como consideraciones especiales:

Seleccione una:

- a. El deterioro de los órganos sensoriales
- b. La variabilidad en el umbral al dolor
- c. El posible maltrato al mayor
- d. Todas las respuestas son correctas ✓

La respuesta correcta es: Todas las respuestas son correctas

**Pregunta 10**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

▼ Marcar pregunta

Se encuentra a un paciente de 2 años, que iba sentado en un asiento elevado (inapropiado), que ha sufrido un accidente de tráfico. Observa sangre en el asiento que está frente al niño. Está pálido y aparentemente tranquilo y con la mirada perdida. Tiene una FC de 180ppm y un Fr de 18rpp ligeramente irregular. ¿Cuáles serían las acciones prioritarias en este caso?

Seleccione una:

- a. Asegurar columna cervical y administrar oxígeno
- b. Realizar la extracción rápida del vehículo para tranquilizarle
- c. Buscar a la madre para averiguar el mecanismo de lesión y los antecedentes personales del niño
- d. Colocar cánula orofaríngea y administrar oxígeno a alto flujo ✗

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Asegurar columna cervical y administrar oxígeno

**Pregunta 11**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Entre los cambios anatófisiológicos que nos podemos encontrar en la vía aérea de un paciente geriátrico, se encuentran:

Seleccione una:

- a. La flacidez, tanto cervical como temporomandibular, puede ocasionar dificultades para mantener la vía permeable.
- b. La cavidad bucal puede verse comprometida por una microglosia o una microstomía.
- c. La cavidad bucal puede verse comprometida por una macroglosia o una macrostomía.
- d. La cavidad bucal puede verse comprometida por una macroglosia o una microstomía. ✓

La respuesta correcta es: La cavidad bucal puede verse comprometida por una macroglosia o una microstomía.

**Pregunta 12**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

¿Qué lesiones específicas pueden padecer una gestante tras un traumatismo?

Seleccione una:

- a. Embolismo del líquido amniótico
- b. Desprendimiento de placenta
- c. Rotura uterina
- d. Todas las respuestas son correctas ✓

La respuesta correcta es: Todas las respuestas son correctas

**Pregunta 13**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

El inmovilizador de cabeza, con respecto a su función y al collarín cervical:

Seleccione una:

- a. Se debe poner con complemento del collarín cervical y limita los movimientos laterales de la cabeza ✓
- b. Nunca se debe poner con el collarín cervical y limita los movimientos laterales de la cabeza
- c. Se debe poner con complemento del collarín cervical y limita los movimientos de flexo-extensión de la cabeza
- d. Nunca se debe poner con el collarín cervical y limita los movimientos de flexo-extensión

Pregunta 14

Correcta

Puntuaje 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Dentro de los fármacos utilizados en la secuencia de intubación rápida en un paciente pediátrico, la Atropina se considera un fármaco:

Seleccione una:

- a. Anticolinérgico ✓
- b. Relajante muscular
- c. Sedante
- d. Relajante muscular

La respuesta correcta es: Anticolinérgico

Pregunta 15

Correcta

Puntuaje 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Dentro del síndrome de la vena cava que puede afectar a la paciente gestante, aunque la presión arterial se mantenga, la disminución del gasto cardiaco puede llegar hasta:

Seleccione una:

- a. 30-40% ✓
- b. 40-50%
- c. 50-60%
- d. 60-70%

La respuesta correcta es: 30-40%

**Pregunta 16**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

⚑ Marcar pregunta

En los tratamientos con sueroterapia en un paciente geriátrico, hay que tener en cuenta:

Seleccione una:

- a. Una sobrecarga puede provocar un Edema Agudo de Pulmón, debido a la pérdida de distensibilidad del sistema cardiocirculatorio y la frecuente rigidez del ventrículo izquierdo
- b. Una sobrecarga puede provocar un Edema Agudo de Pulmón, debido a la pérdida de distensibilidad del sistema cardiocirculatorio y la frecuente rigidez del ventrículo derecho
- c. Una sobrecarga no puede provocar un Edema Agudo de Pulmón, debido a la pérdida de distensibilidad del sistema cardiocirculatorio y la frecuente rigidez del ventrículo izquierdo ✖
- d. Una sobrecarga no puede provocar un Edema Agudo de Pulmón, debido a la pérdida de distensibilidad del sistema cardiocirculatorio y la frecuente rigidez de la aurícula izquierda

La respuesta correcta es: Una sobrecarga puede provocar un Edema Agudo de Pulmón, debido a la pérdida de distensibilidad del sistema cardiocirculatorio y la frecuente rigidez del ventrículo izquierdo

**Pregunta 17**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

⚑ Marcar pregunta

En la actuación a una gestante, para evitar el síndrome de la vena cava, a partir de la semana 20 de gestación, se debe colocar en posición:

Seleccione una:

- a. Decúbito lateral izquierdo ✔
- b. Decúbito lateral derecho
- c. Decúbito prono
- d. Decúbito supino en flexión

La respuesta correcta es: Decúbito lateral izquierdo

**Pregunta 18**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

⚑ Marcar pregunta

A la hora de colocar el collarín de trauma, ¿cuál será la primera parte del mismo que fijará al cuello?:

Seleccione una:

- a. La parte del collarín destinado a la nuca
- b. La parte del collarín destinado a la oreja
- c. La parte del collarín destinado a la barbilla ✔
- d. Ninguna de ellas

### Pregunta 19

Correcta

Puntuaje: 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Una vez, colocado las piezas laterales del inmovilizador de cabeza, en qué orden y sobre qué zonas anatómicas de la cabeza, se ponen las cintas que unen sendas piezas:

Seleccione una:

- a. Primero la cinta que se coloca en el mentón del paciente y después la cinta que pasa sobre la frente del paciente.
- b. Primero la cinta que se coloca en la boca del paciente y después la cinta que pasa sobre la frente del paciente.
- c. Primero la cinta que pasa sobre la frente del paciente y después la cinta que se coloca en el mentón del paciente. ✓
- d. Ninguna de ellas

La respuesta correcta es: Primero la cinta que pasa sobre la frente del paciente y después la cinta que se coloca en el mentón del paciente.

### Pregunta 20

Correcta

Puntuaje: 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Si tenemos a una gestante que ha sufrido un traumatismo y vemos que sufre un sangrado vaginal, podemos sospechar que tiene en principio:

Seleccione una:

- a. Embolismo del líquido amniótico
- b. Desprendimiento de placenta ✓
- c. Hemorragia fetomaterna
- d. Rotura uterina

La respuesta correcta es: Desprendimiento de placenta