

Para superarlo, debe obtener una puntuación igual a superior al 70%. Dispone únicamente de un intento.  
Cuando esté preparado/a, pulse sobre el botón empezar.

¡Adelante!

---

1 **El cáncer anal más frecuente relacionado con la infección por el VPH es:**

- ☐ Adenocarcinoma
- ☒ Carcinoma escamoso
- ☐ Tumor neuroendocrino
- ☐ Melanoma
- ☐ Todas las anteriores

---

2 **¿Existen programas de detección, tratamiento de la displasia anal como el existente en la displasia cervical, con impacto en la incidencia de cáncer?**

- ☐ Si, en el momento actual especialmente para pacientes inmunodeprimidos o con infección por el VIH
- ☒ No existen todavía
- ☐ Si, únicamente para pacientes con quimioterapia
- ☐ No tiene base científica y por ese motivo no existen
- ☐ Todas las anteriores

---

3 **El tratamiento del cáncer anal es:**

- ☐ Únicamente con cirugía.
- ☐ En la mayoría de casos quimioterapia únicamente
- ☒ En la mayoría de casos quimioterapia y radioterapia
- ☐ Radioterapia únicamente
- ☐ Todas las anteriores

---

4 **Los efectos esperables de la vacunación por VPH en adolescentes en el futuro:**

- ☐ Solo producirá una disminución de verrugas genitales
- ☐ Solo producirá una disminución de verrugas anales
- ☒ Es esperable, una disminución de toda la patología relacionada con el VPH incluido el cáncer relacionado con el virus (por ejemplo el cáncer de cérvix y anal)
- ☐ Solo tendrá efecto en el cáncer de cérvix
- ☐ Todas las anteriores

---

5 **Los tumores de orofaringe asociados al VPH:**

- ☐ Presentan lesiones precancerosas
  - ☐ Se estadifican igual que los clásicos
  - ☐ Son menos quimiosensibles
  - ☒ Son más frecuentes las variantes epidermoides papilar, basaloide y linfoepiteliales
  - ☐ El carcinoma basaloide presenta menor agresividad
-