

Comenzado el	domingo, 22 de octubre de 2023, 10:24
Estado	Finalizado
Finalizado en	domingo, 22 de octubre de 2023, 11:35
Tiempo empleado	1 hora 11 minutos
Puntos	20,00/20,00
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)
Comentario -	Apto

Pregunta

1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los parámetros para considerar eficaz el lenguaje verbal, son (**señale la opción incorrecta**):

Seleccione una:

- a. La oportunidad.
- b. La pertinencia.
- c. La sencillez.
- d. La Kinésica. ✓

Pregunta

2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de estos diagnósticos enfermeros no relacionamos con el PVC "0162_ Actividad física insuficiente, sedentarismo":

Seleccione una:

- a. Mantenimiento inefectivo de la salud (00099).
- b. Deterioro del patrón del sueño (00095).
- c. Manejo inefectivo del régimen terapéutico (00078).
- d. B y C son correctas. ✓

Pregunta

3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Señale la respuesta verdadera de las opciones que figuran a continuación respecto a la TA:

Seleccione una:

- a. La mayoría de los factores implicados en la HTA se pueden lograr modificar a través de medidas de educación sanitaria.
- b. A mayor nivel de HTA, más importante es la morbilidad atribuible a la misma.
- c. Pequeños descenso de la TA con medidas higiénico-dietéticas pueden bajar la mortalidad coronaria.
- d. Todas son ciertas. ✓

Pregunta

4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En las recomendaciones/cuidados al paciente hipertenso con insuficiencia cardiaca:

Seleccione una:

- a. Se debe enseñar al cuidador principal/familia a mantener en estado óptimo el equipo de oxigenoterapia domiciliario. ✓
- b. No se debe vigilar frecuencia, ritmo, profundidad y esfuerzo de las respiraciones.
- c. No es importante controlar el equilibrio de líquidos.
- d. Ninguna es correcta.

Pregunta

5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Dentro de las estrategias para lograr una buena comunicación terapéutica con el paciente:

Seleccione una:

- a. Reconducción.
 - b. Clarificación y resumen.
 - c. Interpretar el lenguaje no verbal.
 - d. todas son ciertas. ✓
-

Pregunta

6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El diagnóstico de enfermería "00162_Disposición para mejorar la gestión de la propia salud", en qué fase del Proceso Educativo del paciente lo podemos encontrar:

Seleccione una:

- a. Fase de Ampliación. ✓
 - b. Fase de Incumplimiento.
 - c. Fase Inmediata.
 - d. Fase de Reconocimiento.
-

Pregunta

7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuando hablamos del PVC "Cambio vital", ¿qué diagnóstico enfermero podemos desarrollar?:

Seleccione una:

- a. Mantenimiento infeccioso del régimen terapéutico.
 - b. Ansiedad.
 - c. Deterioro del patrón de sueño.
 - d. B y C son correctas. ✓
-

Pregunta

8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Dentro del tratamiento no farmacológico de la gestante hipertensa, se encuentra:

Seleccione una:

- a. Reposo en cama.
 - b. Aumento de peso.
 - c. Restricción de sodio. ✓
 - d. Suplemento de calcio.
-

Pregunta

9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Entre las estrategias para la toma de la PA, ¿Cómo se denomina la automedida de la PA?

Seleccione una:

- a. Medida en la Consulta.
- b. MAPA.
- c. AMPA. ✓
- d. PAMA.

Pregunta

10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La clasificación de la HTA de grado I, según las repercusiones orgánicas significa:

Seleccione una:

- a. Ausencia de lesiones demostrables en los órganos diana. ✓
- b. Hipertrofia ventricular izquierda.
- c. Encefalopatía.
- d. Insuficiencia ventricular izquierda.

Pregunta

11

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Dependiendo de la actitud que tengamos hacia el paciente realizamos un estilo diferente de relación de ayuda, ¿Cuál es el modelo más correcto?:

Seleccione una:

- a. Modelo autoritario.
 - b. Modelo empático. ✓
 - c. Modelo democrático.
 - d. Modelo cooperativo.
-

Pregunta

12

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Respecto a la preparación del paciente para la toma de PA:

Seleccione una:

- a. No se requiere de preparación previa especial para realizar la toma de la PA. ✓
- b. El paciente deberá acudir después de realizar una comida copiosa, pero no puede haber tomado café o té 30 minutos antes de la toma de la PA.
- c. Se recomienda al paciente realizar ejercicio 30 minutos antes de la toma de la PA.
- d. El paciente no puede fumar 10 horas antes de controlarse la PA.

Pregunta

13

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Dentro de las indicaciones potenciales para realizar el control de la TA en domicilio, se encuentra:

Seleccione una:

- a. HTA en ancianos.
- b. Diabetes tipo 2.
- c. Guía para el tratamiento antihipertensivo.
- d. A y C son correctas. ✓

Pregunta

14

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué se entiende por "paciente incumplidor" ?:

Seleccione una:

- a. El que cumple menos del 80% del tratamiento.
 - b. El que cumple más del 110% del tratamiento.
 - c. El que cumple el 80-110% del tratamiento.
 - d. A y B son correctas ✓
-

Pregunta

15

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Son estrategias motivacionales en la "Fase de Ampliación":

Seleccione una:

- a. Universalizar.
- b. Negociar.
- c. Verbalizar el compromiso del cambio. ✓
- d. Fatigar.

Pregunta

16

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En la HTA no son factores causales:

Seleccione una:

- a. Factores ambientales.
- b. Sobrepeso.
- c. Factores gestacionales y perinatales.
- d. Edad. ✓

Pregunta

17

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Con el envejecimiento de la población, se estima que en el 2025 la HTA afectará a:

Seleccione una:

- a. 950 millones de personas.
 - b. 1500 millones de personas. ✓
 - c. 2000 millones de personas.
 - d. 2500 millones de personas.
-

Pregunta

18

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Se considera TA elevada según los últimos criterios de la AHA:

Seleccione una:

- a. PAS menor que 120 y PAD menor que 80 mmHg.
- b. PAS 130-125 o PAD menor que 85 mmHg.
- c. PAS 120-129 y PAD menor que 80 mmHg. ✓
- d. PAS 120-129 y PAD menor que 89 mmHg.

Pregunta

19

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué factores de riesgo se deben tener en cuenta en la visita prenatal?:

Seleccione una:

- a. Nuliparidad. ✓
- b. Embarazo único.
- c. Intervalo entre dos embarazos de más de 7 años.
- d. Intervalo entre dos embarazos de más de 9 años.

Pregunta

20

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Dentro de las intervenciones enfermeras en el paciente diabético e hipertenso, no se encuentra:

Seleccione una:

- a. Enseñanza: dieta prescrita.
- b. Aconsejar aumentar el ejercicio físico en diabetes descontrolada. ✓
- c. Ayuda para disminuir el peso.
- d. Ayuda para dejar de fumar.

Actividad previa

◀ "Ejemplo de Comunicación No Terapéutica" (3:38 minutos)

Ir a...

Siguiente actividad

Encuesta de satisfacción del alumnado ▶

Fundación para el Desarrollo de la Enfermería

 <https://www.fuden.es>