

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Ante la sospecha de una OVACE grave en la que el paciente está inconsciente, cuál será su actuación

Seleccione una:

- a. Golpes interescapulares
- b. Iniciaremos maniobras de RCP.
- c. Maniobra de Heimlich.
- d. Animarle a toser.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Iniciaremos maniobras de RCP.

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Ante un paciente inconsciente, en el que ha comprobado que no presenta pulso ni respiración, cuál será su primera actuación

Seleccione una:

- a. Buscar un DEA.
- b. Confirmaremos que la escena es segura.
- c. Todas son incorrectas.
- d. Pedir ayuda al 112

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Confirmaremos que la escena es segura.

Pregunta 3

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Ante una PCR cuando está indicado el uso de un DEA

Seleccione una:

- a. Ante PCR presenciadas.

- b. Únicamente ante PCR con un ritmo desfibrilable
- c. Ante PCR de adultos mayores de 25 años.
- d. Siempre que disponga de un DEA.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Siempre que disponga de un DEA.

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Antes de colocar los parches pueden existir una serie de circunstancias que precisen una serie de acciones previas a la colocación de los parches, cuál de las siguientes no es una de ellas

Seleccione una:

- a. El paciente esté mojado o con sudoración excesiva
- b. El paciente esté en tratamiento con antihipertensivos.
- c. Exceso de vello en el pecho del paciente.
- d. El paciente presente un desfibrilador o marcapasos implantado.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: El paciente esté en tratamiento con antihipertensivos.

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál de las siguientes no es causa de PCR

Seleccione una:

- a. Hipovolemia.
- b. Hiperglucemia.
- c. Hipotermia.
- d. Hipoxia.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Hiperglucemia.

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál de las siguientes no es causa de PCR

Seleccione una:

- a. Intoxicación.
- b. Neumotórax a tensión.
- c. Taponamiento cardiaco.
- d. Tensión arterial elevada.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Tensión arterial elevada.

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál de los siguientes es un ritmo desfibrilable

Seleccione una:

- a. Opción 1: Asistolia
- b. Las opciones 2 y 3 son correctos.
- c. Opción 2: FV
- d. Opción 3: Taquicardia ventricular sin pulso

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Las opciones 2 y 3 son correctos.

Pregunta 8

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál de los siguientes no es un eslabón de la cadena de supervivencia de la PCR en el ámbito intrahospitalario

Seleccione una:

- a. Vigilancia, prevención y tratamiento de los procesos previos a la parada cardiaca.
- b. Desfibrilación rápida
- c. Ventilación precoz.
- d. Reconocimiento inmediato de la parada cardiaca y activación del equipo de reanimación.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Ventilación precoz.

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál de los siguientes no es un objetivo de los cuidados postresucitación

Seleccione una:

- a. Mantenimiento de una presión de perfusión tisular adecuada.
- b. Conseguir una oxigenación y ventilación óptima.
- c. Prevenir y tratar las causas de la PCR.
- d. Todas son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál es el método idóneo para el aislamiento de la vía aérea

Seleccione una:

- a. Intubación endotraqueal.
- b. Cánula orofaríngea.
- c. Mascarilla laríngea.
- d. Combitube.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Intubación endotraqueal.

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál es la vía de acceso venoso de elección

Seleccione una:

- a. Opción 1: La vía venosa periférica.

- b. Opción 3: Vía endotraqueal.
- c. Opción 2: La vía intraósea si no conseguimos la canalización de una vía venosa periférica en 90 segundos.
- d. Las opciones 1 y 2 son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Las opciones 1 y 2 son correctas.

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuáles son los eslabones que forman la cadena de supervivencia extrahospitalaria en el caso de PCR

Seleccione una:

- a. Todas son correctas
- b. RCP precoz con compresiones de calidad.
- c. Reconocimiento de la parada cardiaca y activación del SEM.
- d. Desfibrilación rápida con DEA.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuáles son los signos para identificar que nos encontramos ante una obstrucción de la vía aérea grave

Seleccione una:

- a. Todos son correctos.
- b. No puede hablar y/o ausencia de ruidos respiratorios.
- c. Ausencia de tos o tos inefectiva.
- d. La víctima se lleva las manos al cuello.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todos son correctos.

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En cuanto a la comprobación de la respiración, indique lo incorrecto:

Seleccione una:

- a. Valoramos movimientos del tórax de la víctima.
- b. Podremos valorar la ventilación y el pulso a la vez.
- c. Todas son correctas.
- d. Nos tomaremos el tiempo necesario, no menos de 10 segundos.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Nos tomaremos el tiempo necesario, no menos de 10 segundos.

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En el caso de una PCR con una arritmia mantenida a pesar de administrar varias descargas, cuál es la medicación de elección

Seleccione una:

- a. Amiodarona, una primera dosis de 300mg y una segunda dosis de 150mg
- b. Amiodarona, una primera dosis de 500mg y una segunda dosis de 350mg
- c. Lidocaína.
- d. Adrenalina

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Amiodarona, una primera dosis de 300mg y una segunda dosis de 150mg

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En relación a la ventilación con bolsa-mascarilla, indique lo correcto

Seleccione una:

- a. Colocaremos la máscara sobre la cara del paciente con la parte estrecha sobre el puente de la nariz.

- b. Nos situaremos a la cabeza del paciente mirando hacia los pies del mismo.
- c. Utilice los dedos índice y pulgar formando una C y colóquelos a un lado de la mascarilla alrededor de la misma. Presione hacia abajo.
- d. Todas son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Para conseguir compresiones de alta calidad, debemos:

Seleccione una:

- a. Debe conseguir que el tórax se comprima 5 cm como mínimo.
- b. Todas son correctas.
- c. La frecuencia de las compresiones sea de 100-120 cpm. y minimizar las interrupciones de las compresiones.
- d. Permita que el tórax recupere su expansión después de cada compresión. Una expansión incompleta reduce el llenado del corazón entre las compresiones, y por lo tanto, se reduce el flujo sanguíneo.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué precauciones debemos tener cuando utilizamos un DEA

Seleccione una:

- a. Debemos asegurarnos que ni nosotros ni nadie toca al paciente durante la descarga.
- b. Debemos asegurarnos que nosotros no estemos en contacto con el paciente durante la descarga.
- c. Debemos asegurarnos que nadie toca al paciente durante la descarga.
- d. Ninguna, es un sistema totalmente seguro.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Debemos asegurarnos que ni nosotros ni nadie toca al paciente durante la descarga.

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Si el DEA no aconseja descarga, que debemos hacer a continuación:

Seleccione una:

- a. Continuar con la RCP iniciando por las compresiones torácicas.
- b. Continuar con la RCP iniciando por las ventilaciones.
- c. Nada, seguramente el paciente haya recuperado circulación espontánea
- d. Comprobar pulso.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Continuar con la RCP iniciando por las compresiones torácicas.

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Si la víctima no respira pero si tiene pulso que debemos hacer

Seleccione una:

- a. Todas son correctas.
- b. Iniciaremos ventilaciones de rescate, ya que nos encontramos ante una parada respiratoria.
- c. Comprobar pulso cada 2 minutos.
- d. Ante la sospecha de intoxicación por opiáceos, nos plantearemos el uso de naloxona como antídoto.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.