

Pregunta 1

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Las características de las células tumorales son:

Seleccione una:

- ☐ a. Pérdida de la regulación de la tasa de mitosis.
- ☐ b. Angiogénesis
- ☐ c. Pérdida de la capacidad de apoptosis.
- ☒ d. Todas son correctas

Pregunta 2

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

pregunta

Para utilizar la escalera analgésica de la OMS existen seis puntos importantes.¿Cuál de los siguientes no se encuentra entre ellos?:

Seleccione una:

- ☒ a. Administrar los analgésicos sólo a demanda del paciente.
- ☐ b. Administrar los analgésicos con pauta horaria
- ☐ c. Usar preferentemente la vía oral
- ☐ d. Evitar el dolor irruptivo

Pregunta 3

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Dentro del tratamiento sistémico antineoplásico , la inmunoterapia consiste en administrar medicamentos que:

Seleccione una:

- ☒ a. Estimulan el sistema inmunológico del paciente.
- ☐ b. Tienen un efecto antagonista sobre las hormonas del paciente
- ☐ c. Tienen efecto sobre las células tumorales por interferencia con el ciclo celular
- ☐ d. Ninguna es correcta.

Pregunta 4

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

El dolor que empeora con las maniobras de Valsalva es característico de

Seleccione una:

- ☐ a. Síndrome de Vena Cava superior
- ☒ b. Compresión medular.
- ☐ c. Cáncer de Páncreas.
- ☐ d. Cáncer de orofaringe.

Pregunta 5

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

En la atención al paciente terminal el sondaje vesical está recomendado:

Seleccione una:

- ☐ a. En casos de retención urinaria que produzca incomodidad o agitación al paciente
- ☐ b. En caso de anuria para valorar estrictamente la diuresis.
- ☐ c. Si el paciente tiene dificultades para comunicarse
- ☐ d. Cuando el cuidador principal está agotado.

Pregunta 6

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Entre las actividades de enfermería indicadas durante el proceso de agonía No se encuentra:

Seleccione una:

- ☐ a. Reducir fluidoterapia.
- ☐ b. Administrar enemas para impedir impactación fecal.
- ☐ c. Colocación de sonda vesical por anuria
- ☒ d. B y C son correctas.

Pregunta 7

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

La hipodermoclisis consiste en:

Seleccione una:

- ☐ a. La administración de analgésicos transdérmicos.
- ☒ b. La administración de sueroterapia por vía subcutánea.
- ☐ c. La administración intermitente de analgesia subcutánea.
- ☐ d. La administración de analgesia epidural

Pregunta 8

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son ciertas respecto a la escalera analgésica?

Seleccione una:

- ☐ a. Los fármacos del segundo escalón presentan techo analgésico.
- ☐ b. Los fármacos del segundo escalón pueden asociarse con los del primer escalón.
- ☐ c. Los fármacos del tercer escalón presentan techo analgésico.
- ☒ d. A y b son ciertas

Pregunta 9

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

En la neutropenia febril, son intervenciones enfermeras:

Seleccione una:

- ☐ a. Medidas posturales con elevación del cabecero.
- ☐ b. Regulación de la temperatura.
- ☐ c. Control del balance hídrico
- ☒ d. C y B son correctas

Pregunta 10

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

El Metamizol es un:

Seleccione una:



a. Analgésico del primer escalón.



b. Tiene propiedades espasmolíticas



c. es muy efectivo en los dolores viscerales.



d. Todas son ciertas.

Pregunta 11

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Cuando lavamos un catéter central de larga duración, hemos de utilizar la técnica flus que consiste en:

Seleccione una:



a. Terminar el lavado pinzando el catéter a la vez que se infunde el último mililitro de suero.



b. Lavar el catéter con 20 cc. de solución salina.



c. Lavado del catéter mediante flujos con la jeringa, que ejerce unas turbulencias dentro del catéter que permiten la limpieza correcta de las paredes de los mismos.



d. Lavar siempre realizando gran presión.

Pregunta 12

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Llamamos tratamientos de soporte a aquellos que nos permiten dar respuesta a los efectos derivados de los tratamientos antineoplásicos. Cuál de los siguientes tratamientos no se consideraría de soporte.

Seleccione una:



a. Antibióticos.



b. Hormonoterapia



c. Antieméticos.



d. Hemoderivados.

Pregunta 13

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Es dado de alta en nuestra Unidad tras recibir el primer ciclo de quimioterapia un paciente ha recibido además dos sesiones de Radioterapia en planta y continuará recibiendo tratamiento con radioterapia. ¿Cuál de las siguientes recomendaciones no estaría indicada:?

Seleccione una:



a. Lavar la zona con jabón neutro.



b. Acudir al servicio de radioterapia con la piel bien hidratada con crema.



c. Retirar de la zona objetos metálicos.



d. No borrar las marcas de simulación.

Pregunta 14

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

El dolor de las metástasis óseas, dolor bien definido y sin cortejo sintomático, es un dolor:

Seleccione una:

- ☒ a. Dolor nociceptivo
- ☐ b. Dolor irruptivo.
- ☐ c. Dolor neuropático.
- ☐ d. Dolor visceral

Pregunta 15

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

La función del manguito de Dacron en el Hickman es:

Seleccione una:

- ☐ a. Favorecer la sujeción del catéter.
- ☐ b. Actuar como barrera antimicrobiana.
- ☐ c. Disminuir los eventos trombóticos relacionados con el catéter.
- ☒ d. A y B son correctas.

Pregunta 16

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

J. de 37 años de edad diagnosticado de Sarcoma en el fémur izquierdo ingresa en nuestra Unidad para control de dolor al evaluar dicho dolor qué tenemos que tener en cuenta:?

Seleccione una:

- ☐ a. Valoración de dolor mediante escalas.
- ☐ b. Factores que desencadenan el dolor.
- ☐ c. Factores da alivio del dolor.
- ☒ d. Todas son correctas.

Pregunta 17

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

El dolor neuropático se caracteriza por:

Seleccione una:

- ☒ a. Percibirse como una sensación de ardor o quemazón, o bien en forma de pinchazos o entumecimiento y hormigueo.
- ☐ b. Ser un dolor difuso y mal localizado
- ☐ c. Estar relacionado con la farmacocinética, el dolor basal se agudiza antes de la siguiente dosis de analgésico
- ☐ d. Estar relacionado con actividades físicas determinadas

Pregunta 18

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

De entre los siete avisos de peligro de cáncer se encuentra:

Seleccione una:

- ☐ a. Lesión que no cicatriza.
- ☐ b. Ronquera persistente.



c. Tos persistente.



d. Todas son correctas.

Pregunta 19

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Los tratamientos neoadyuvantes se administran

Seleccione una:



a. Después de la cirugía para prevenir recidivas



b. A la vez que otro tratamiento para aumentar el poder de curación.



c. Antes de la cirugía para reducir masa tumoral.



d. Para aliviar algún síntoma producido por el tumor

Pregunta 20

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Se define como síntoma refractario

Seleccione una:



a. Aquel que no responde a un tratamiento paliativo correcto e intensivo sin comprometer el estado de conciencia, aplicado por profesionales bien entrenados y capacitados en un periodo razonable de tiempo



b. Aquel que responde a un tratamiento paliativo correcto e intensivo sin comprometer el estado de conciencia, aplicado por profesionales bien entrenados y capacitados en un periodo razonable de tiempo



c. Aquel que responde a un tratamiento activo intensivo en un periodo razonable de tiempo



d. Ninguna es correcta.

Información

Texto informativo

Mujer de 44 años de edad diagnosticada de Ca. de ovario en tratamiento con quimioterapia (Bevacizumab en monoterapia), que acude a urgencias por un cuadro y vómitos. Ingresa en planta para rehidratación y estudio del cuadro digestivo. de epigastralgia, náuseas Antecedentes Personales Ca de ovario diagnosticado en 2016 tratado con cirugía + quimioterapia. HTA en tto con Enalapril. No alergias conocidas. Exploración física: TA: 156/87. FC: 88. SatO2: 96% Despierta consciente y orientada. Abdomen discretamente doloroso a la palpación y timpánico Portadora de una vía venosa en MSD. (La paciente tiene implantado un CVC tipo reservorio) Discreta palidez de piel y mucosas. La paciente ingresa acompañada por su marido.

Pregunta 1

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Tras ingreso, la paciente avisa por dolor en zona de vía venosa periférica, a la exploración se observa flebitis en el trayecto venoso. Dado que la paciente tiene implantado un CVC tipo reservorio, Ud. decide utilizarlo para la sueroterapia y administración de tratamiento intravenoso. ¿Cuál de los siguientes materiales no necesitaría para acceder al puerto subcutáneo?

Seleccione una:



a. Palomilla nº22



b. Gasas estériles



c. Jeringas de 10cc.



d. Aguja tipo Gripper

Pregunta 2

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Cada cuánto tiempo programará en los cuidados de enfermería el cambio de aguja?:

Seleccione una:



a. Cada 24 h.



b. Cada siete días.



c. Cada 48h.



d. Cada vez que el paciente se duche.

Pregunta 3

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Al acceder al puerto subcutáneo del catéter, podemos infundir suero pero no refluye sangre. ¿Qué maniobras podemos realizar para intentar solucionar el problema?:

Seleccione una:



a. Hacer que el paciente tosa.



b. Irrigar el catéter con suero salino utilizando presión negativa.



c. Hacer que el paciente inspire profundamente.



d. Todas son correctas

Pregunta 4

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

De las siguientes afirmaciones cuál es cierta en relación al Paracetamol?:

Seleccione una:



a. Es un analgésico del tercer escalón.



b. Tiene techo analgésico.



c. No tiene techo analgésico.



d. Produce estreñimiento.

Pregunta 5

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

Antes de retirar la aguja hemos de lavar y sellar el catéter siguiendo los protocolos del centro. Para realizar el lavado utilizaremos:

Seleccione una:



a. Técnica de presión negativa.



b. Técnica de presión positiva.



c. Técnica flus.



d. B y C son correctas.

[Siguiente](#)