



Javier Rodríguez García | Pe

Navegación por el cuestionario



**Comenzado el** lunes, 25 de junio de 2018, 17:27  
**Estado** Finalizado  
**Finalizado en** lunes, 25 de junio de 2018, 18:28  
**Tiempo empleado** 1 hora 1 minutos  
**Puntos** 19,00/20,00  
**Calificación** 9,50 de un máximo de 10,00 (95%)  
**Comentario - APTO**

**Pregunta 1**

Correcta  
 Puntúa 1,00 sobre 1,00

⚑ Marcar pregunta

¿Cuáles serían los síntomas característicos para reconocer el sarampión en un paciente?

Seleccione una:

- ☐ a. Enfermedad vírica aguda, con síntomas de diarrea, vómitos en escopeta y abundantes nauseas.
- ☐ b. Enfermedad bacteriana, con aparición de vesículas prominentes en extremidades.
- ☒ c. Enfermedad vírica aguda, muy contagiosa con periodos prodrómicos de fiebre, conjuntivitis, coriza, tos y pequeñas manchas con aspecto blanquecino o azulado sobre base eritematosa en mucosa interna de la mejilla. ✓
- ☐ d. Enfermedad bacteriana, con presencia de tos seca y abundantes secreciones.

Los síntomas definitorios para el sarampión son fiebre, conjuntivitis, coriza, tos y pequeñas manchas con aspecto blanquecino o azulado sobre base eritematosa en mucosa interna de la mejilla.

La respuesta correcta es: Enfermedad vírica aguda, muy contagiosa con periodos prodrómicos de fiebre, conjuntivitis, coriza, tos y pequeñas manchas con aspecto blanquecino o azulado sobre base eritematosa en mucosa interna de la

**Pregunta 2**

Correcta  
 Puntúa 1,00 sobre 1,00

⚑ Marcar pregunta

¿Qué tipo de higiene de manos realizarías al manipular a un paciente encamado al que no estás expuesto a sangre o fluidos corporales?

Seleccione una:

- ☐ a. Lavado de manos con agua y jabón.
- ☒ b. Lavado de manos con solución hidroalcohólica. ✓
- ☐ c. Realizaría las dos técnicas primero con agua y jabón y luego con lejía diluida 1/10.
- ☐ d. Ninguna es correcta.

El lavado de manos indicado en esta situación es lavado con solución hidroalcohólica, ya que no me he manchado de sangre o fluidos corporales

La respuesta correcta es: Lavado de manos con solución hidroalcohólica.

**Pregunta 3**

Correcta  
 Puntúa 1,00 sobre 1,00

⚑ Marcar pregunta

¿Cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta respecto al aislamiento aéreo y el tamaño que tienen las partículas responsables de su transmisión?

Seleccione una:

- ☐ a. Tamaño inferior o igual a cinco micras.
- ☐ b. Permanecen en el aire durante largos periodos de tiempo conteniendo microorganismos.
- ☐ c. Se pueden extender ampliamente con las corrientes de aire.
- ☒ d. Reciben el nombre de gotas de Flugge. ✓

El nombre que reciben estas partículas son gotas de Wells

La respuesta correcta es: Reciben el nombre de gotas de Flugge

**Pregunta 4**

Correcta  
 Puntúa 1,00 sobre 1,00

⚑ Marcar pregunta

¿Cuál fue la aportación principal de Semmelweis?

Seleccione una:

- ☒ a. Descubridor de la asepsia en área de paritorio, mediante el lavado de manos con agua y jabón antes de entrar en sala, consiguiendo reducir un 10% las infecciones de las pacientes ingresadas. ✓
- ☐ b. Descubridor del uso correcto de guantes.
- ☐ c. Descubridor de la solución hidroalcohólica.
- ☐ d. Principal responsable de la creación de los cinco momentos para realizar la higiene de manos.

Consiguió descubrir en la sala de paritorio que realizando una higiene de manos previa a su actuación conseguiría reducir las tasas de infección de las pacientes ingresadas

La respuesta correcta es: Descubridor de la asepsia en área de paritorio, mediante el lavado de manos con agua y jabón antes de entrar en sala, consiguiendo reducir un 10% las infecciones de las pacientes ingresadas.

**Pregunta 5**

Correcta  
 Puntúa 1,00 sobre 1,00

⚑ Marcar pregunta

¿Cuáles son los dos tipos de aislamiento que no requieren gradiente de presión en la habitación?

Seleccione una:

- ☐ a. Aislamiento aéreo y protector.
- ☐ b. Aislamiento protector y contacto.
- ☒ c. Aislamiento contacto y gotas. ✓
- ☐ d. Aislamiento aéreo y contacto.

El aislamiento de contacto y gotas no requieren una habitación con gradiente de presión

La respuesta correcta es: Aislamiento contacto y gotas.

**Pregunta 6**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00
 Marcar  
pregunta

¿Qué tipo de mascarilla sería necesaria para el personal sanitario y familiares, al entrar en la habitación de un paciente diagnóstico de tuberculosis pulmonar bacilífera?

Seleccione una:

- ☐ a. Mascarilla FFP1.
- ☐ b. Mascarilla quirúrgica.
- ☒ c. Mascarilla a partir de FFP2. ✓
- ☐ d. Únicamente quirúrgica a menos de un metro del paciente.

La mascarilla a utilizar para esta patología es la mascarilla a partir de FFP2, al ser una enfermedad que requiere aislamiento aéreo

La respuesta correcta es: Mascarilla a partir de FFP2.

**Pregunta 7**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00
 Marcar  
pregunta

En un paciente en aislamiento de contacto, ante riesgo de salpicaduras ¿Utilizarías mascarilla? ¿De qué tipo?

Seleccione una:

- ☐ a. Si utilizaría, sería mascarilla a partir de FFP2.
- ☐ b. No.
- ☒ c. Si, sería mascarilla quirúrgica y si fuese necesario protector ocular. ✓
- ☐ d. Si en este tipo de aislamiento y por el riesgo de que las partículas queden suspendidas en el aire (tamaño inferior a 5 micras), sería mascarilla FFP3.

En este caso en el que existe riesgo de salpicaduras utilizaría una mascarilla quirúrgica para evitar el riesgo de salpicar protector ocular para evitar pueda salpicarme fluidos del paciente en la cara o en los ojos

La respuesta correcta es: Si, sería mascarilla quirúrgica y si fuese necesario protector ocular.

**Pregunta 8**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00
 Marcar  
pregunta

¿En qué tipo de aislamiento se requiere realizar la limpieza de la habitación en primer lugar?

Seleccione una:

- ☐ a. Aislamiento aéreo.
- ☐ b. Aislamiento de gotas.
- ☒ c. Aislamiento protector. ✓
- ☐ d. Aislamiento de contacto

La primera habitación en limpiar por el personal de limpieza sería la habitación en aislamiento protector

La respuesta correcta es: Aislamiento protector.

**Pregunta 9**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00
 Marcar  
pregunta

Consecuencia de una infección relacionada con la asistencia sanitaria (IRAS), ¿Cuáles son algunos de los efectos sobre el paciente?

Seleccione una:

- ☒ a. Mayor estancia hospitalaria, mayor riesgo de complicaciones, aumento de costes, es una de las principales causas de muerte y de incremento de la morbilidad en pacientes hospitalizados representan una carga considerable tanto para el paciente y su familia como para la salud pública. ✓
- ☐ b. Al estar más tiempo en el hospital ingresado se curará mucho mejor.
- ☐ c. No tiene ningún tipo de consecuencias sobre el paciente.
- ☐ d. Ninguna es correcta.

Aumenta el tiempo de estancia en los hospitales, aumentando por ello el riesgo de complicaciones y otras complicaciones aumentando el coste y siendo una carga considerable para el paciente y familiares que le acompañan

La respuesta correcta es: Mayor estancia hospitalaria, mayor riesgo de complicaciones, aumento de costes, es una de las principales causas de muerte y de incremento de la morbilidad en pacientes hospitalizados representan una carga considerable tanto para el paciente y su familia como para la salud pública.

**Pregunta 10**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00
 Marcar  
pregunta

¿Cuál de las siguientes no se considera una complicación de la varicela?

Seleccione una:

- ☐ a. Infecciones cutáneas bacterianas.
- ☐ b. Ceguera.
- ☐ c. Síndrome de Ramsay Hunt
- ☒ d. Ulceras genitales. ✓

El porcentaje de reactivación de la varicela es de un 15%

La respuesta correcta es: Ulceras genitales

**Pregunta 11**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00
 Marcar  
pregunta

¿Qué tipo de aislamiento necesitaríamos para el sarampión?

Seleccione una:

- ☐ a. Aislamiento estricto.
- ☐ b. Aislamiento protector.
- ☒ c. Aislamiento aéreo. ✓
- ☐ d. Aislamiento contacto

El aislamiento que deberíamos poner para esta patología es aislamiento aéreo

La respuesta correcta es: Aislamiento aéreo.

**Pregunta 12**

Correcta

En cuanto al aislamiento estricto, ¿Qué equipo de protección sería necesario?

Puntúa 1,00  
sobre 1,00
 Marcar  
pregunta

Seleccione una:

- ☐ a. Traje buzo, gorro, calzas y guantes.
- ☒ b. Guantes, traje buzo, verdugo, gorro, calzas, gafas y mascarilla. ✓
- ☐ c. Mascarilla, bata sellada y gafas.
- ☐ d. Ninguna es correcta.

El aislamiento estricto requiere guantes, traje buzo, verdugo, gorro, calzas, gafas y mascarilla.

La respuesta correcta es: Guantes, traje buzo, verdugo, gorro, calzas, gafas y mascarilla.

**Pregunta 13**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00
 Marcar  
pregunta

En un paciente que pulsa el avisador de llamada, acudimos a la habitación, es un paciente dependiente, se encuentre encamado y necesita que le aproximemos la mesa con la bandeja para poder comer, no teniendo ningún tipo de con con el paciente ¿Qué momentos para el lavado de manos observa según la OMS?

Seleccione una:

- ☐ a. Momento 1, antes del contacto con el paciente.
- ☒ b. Momento 5, después del contacto con el entorno de paciente. ✓
- ☐ c. Momento 3 únicamente.
- ☐ d. Momento 1, antes del contacto con el paciente, momento 4, después de contacto con el paciente, momento 5 d de contacto con el entorno del paciente.

Para este caso se observan un único momento para realizar higiene de manos: después del contacto con el entorno paciente al tocar la mesa para que pueda comer (momento 5 contacto con el entorno del paciente)

La respuesta correcta es: Momento 5, después del contacto con el entorno de paciente.

**Pregunta 14**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00
 Marcar  
pregunta

¿Cuál es el tiempo mínimo necesario para realizar de manera adecuada la higiene de manos con agua y jabón?

Seleccione una:

- ☐ a. 20 - 30 segundos.
- ☐ b. Más de 1 minuto.
- ☒ c. De 40 a 60 segundos. ✓
- ☐ d. 15 segundos.

Para realizar una correcta higiene de manos con agua y jabón será necesario un tiempo mínimo de lavado de 40 a 60 segundos

La respuesta correcta es: De 40 a 60 segundos.

**Pregunta 15**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00
 Marcar  
pregunta

Señale la respuesta correcta. Según la OMS establece 5 momentos para realizar la higiene de manos:

Seleccione una:

- ☒ a. Antes del contacto con el paciente, después de contacto con paciente, después de contacto con entorno, antes realizar tarea aséptica, después de riesgo de exposición a fluidos corporales. ✓
- ☐ b. Antes del contacto con el paciente, después de contacto con paciente, antes de contacto con entorno, antes de tarea aséptica, después de riesgo a exposición a fluidos corporales.
- ☐ c. Antes del contacto con el paciente, después de contacto con paciente, antes de contacto con entorno, después realizar tarea aséptica, después de riesgo a exposición a fluidos corporales.
- ☐ d. Ninguna es correcta.

Los cinco momentos que indica la OMS para realizar la higiene de manos son los siguientes: Antes del contacto con el paciente, después de contacto con paciente, después de contacto con entorno, antes de realizar tarea aséptica, después de riesgo a exposición a fluidos corporales.

La respuesta correcta es: Antes del contacto con el paciente, después de contacto con paciente, después de contacto con entorno, antes de realizar tarea aséptica, después de riesgo de exposición a fluidos corporales.

**Pregunta 16**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00
 Marcar  
pregunta

Tras confirmar el virus de la varicela por prueba diagnóstica ¿Qué tipo de mascarilla utilizarías?

Seleccione una:

- ☐ a. Mascarilla quirúrgica.
- ☐ b. No es necesario si estoy a menos de un metro.
- ☒ c. Mascarilla a partir de FFP2. ✓
- ☐ d. Solo es necesaria si existe riesgo de salpicaduras y en este caso es quirúrgica

La mascarilla a utilizar para el virus de la varicela es mascarilla a partir de FFP2, al ser una patología que requiere aislamiento aéreo

La respuesta correcta es: Mascarilla a partir de FFP2.

**Pregunta 17**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00
 Marcar  
pregunta

¿Cuál es el modo de transmisión de la fiebre tifoidea?

Seleccione una:

- ☐ a. Animales salvajes.
- ☐ b. Contacto directo con sangre y fluidos corporales.
- ☒ c. Ingestión de agua y alimentos contaminados con heces u orina de enfermos portadores. ✓
- ☐ d. Por el aire o diseminación por gotitas.

El medio de transmisión de esta enfermedad es a través de alimentos y agua contaminados por este germen.

La respuesta correcta es: Ingestión de agua y alimentos contaminados con heces u orina de enfermos portadores.

**Pregunta 18**

Correcta

¿Cuál es el periodo de incubación para la tuberculosis?

Seleccione una:

- ☐ a. 2-10 días.

Puntúa 1,00  
sobre 1,00

⚑ Marcar  
pregunta

- ☐ a. Tres semanas.
- ☐ b. Cinco días.
- ☒ c. De dos a diez semanas. ✓
- ☐ d. 48-72 horas.

La respuesta correcta es: De dos a diez semanas.

**Pregunta 19**

Incorrecta

Puntúa 0,00  
sobre 1,00

⚑ Marcar  
pregunta

¿Cuánto tiempo dura el periodo de transmisibilidad de la tuberculosis?

Seleccione una:

- ☐ a. Mientras expulse bacilos tuberculosos, con el tratamiento adecuado la transmisibilidad se elimina de dos a cuatro semanas.
- ☐ b. Desde el momento que se pone tratamiento 1 semana.
- ☐ c. Desde el inicio de síntomas hasta seis semanas que es cuando deja de producir bacilos tuberculosos.
- ☒ d. Ninguna es correcta ✗

El paciente será potencialmente transmisor de enfermedad mientras expulse bacilos de dicha enfermedad, con un tratamiento médico el periodo suele ser de unas dos a cuatro semanas

La respuesta correcta es: Mientras expulse bacilos tuberculosos, con el tratamiento adecuado la transmisibilidad se elimina de dos a cuatro semanas.

**Pregunta 20**

Correcta

Puntúa 1,00  
sobre 1,00

⚑ Marcar  
pregunta

En caso de que un paciente sufra una reactivación de una tuberculosis bacilífera pasada ¿Qué tipo de aislamiento se necesita?

Seleccione una:

- ☐ a. Ninguno porque ya ha pasado la enfermedad y no necesitaría aislamiento.
- ☐ b. Aislamiento gotas.
- ☒ c. Aislamiento aéreo. ✓
- ☐ d. Aislamiento estricto.

El aislamiento que debemos cumplir para una tuberculosis bacilífera es aislamiento aéreo

La respuesta correcta es: Aislamiento aéreo.

[Finalizar revisión](#)