

?



Curso online de actualización en urgencias pediátricas para enfermería

Área personal

- / Mis cursos
- / AS-DC-AUPE
- / Módulo 3: Motivos de consulta más frecuente
- / Examen módulo 3 parte II

| | |
|-----------------|--|
| Comenzado el | miércoles, 29 de agosto de 2018, 13:06 |
| Estado | Finalizado |
| Finalizado en | jueves, 30 de agosto de 2018, 12:36 |
| Tiempo empleado | 23 horas 30 minutos |
| Puntos | 13,00/20,00 |
| Calificación | 6,50 de 10,00 (65%) |
| Comentario - | Ha superado el examen, pero recuerde que es necesaria una nota media final superior al 80% para superar el curso |

Pregunta 1

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Ante una otalgia, cuál es la principal patología a descartar

Seleccione una:

a. Faringoamigdalitis

b. Ninguna de las opciones es correcta. ?

c. Mastoiditis


d. Otitis media aguda

La respuesta correcta es: Mastoiditis

Pregunta **2**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

 Marcar pregunta

Cómo realizaríamos la tolerancia oral en un niño de 2 años que llega a urgencias y es diagnosticado de gastroenteritis aguda

Seleccione una:


- a. Ninguna de las opciones es correcta
- b. procederemos a iniciar la tolerancia oral de forma progresiva, iremos administrando al paciente pequeñas cantidades cada 5-10 minutos de una solución oral electrolítica ?
- c. procederemos a iniciar la tolerancia oral de forma progresiva, iremos administrando al paciente pequeñas cantidades cada 30 minutos de una solución oral electrolítica
- d. procederemos a iniciar la tolerancia oral de forma progresiva, iremos administrando al paciente grandes cantidades cada 5-10 minutos de una solución oral electrolítica.

La respuesta correcta es: procederemos a iniciar la tolerancia oral de forma progresiva, iremos administrando al paciente pequeñas cantidades cada 5-10 minutos de una solución oral electrolítica

Pregunta **3**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

 Marcar pregunta

Cuál es el principal criterio de riesgo cuando acude un niño a urgencias con disuria o hematuria

Seleccione una:


- a. Ninguna de las opciones es correcta ?
- b. Edad del paciente
- c. Picor intenso
- d. Deshidratación

La respuesta correcta es: Edad del paciente

Pregunta **4**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

 Marcar pregunta

Cuál es el rango de edad en el que hay mayor incidencia de convulsión febril

Seleccione una:


- a. Entre 5 - 6 meses
- b. Ninguna de las opciones es correcta ?
- c. Entre 18 - 24 meses
- d. Entre 0 - 6 meses

La respuesta correcta es: Entre 18 - 24 meses

Pregunta **5**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

 Marcar pregunta

Cuál es la causa más frecuente de convulsión en la infancia

Seleccione una:


- a. Fiebre ?
- b. Tumor cerebral
- c. Ninguna de las opciones es correcta.
- d. Epilepsia

La respuesta correcta es: Fiebre

Pregunta **6**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

 Marcar pregunta

Cuál es la causa más frecuente de dysuria

Seleccione una:


- a. Síndrome nefrótico
- b. Síndrome nefrítico
- c. ITU
- d. Ninguna de las opciones es correcta ?

La respuesta correcta es: ITU

Pregunta **7**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

 Marcar pregunta

Cuál es la patología endocrina más frecuente en la edad pediátrica

Seleccione una:


- a. Hipotiroidismo
- b. Diabetes Mellitus tipo I ?
- c. Enfermedad de Cushing
- d. Ninguna de las opciones es correcta.

La respuesta correcta es: Diabetes Mellitus tipo I

Pregunta **8**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

 Marcar pregunta

Cuáles son las causas de origen infeccioso, más frecuentes que producen vómitos en la etapa pediátrica

Seleccione una:


- a. Invaginación intestinal
- b. Ninguna de las opciones es correcta
- c. Gastroenteritis aguda ?
- d. Reflujo gastroesofágico

La respuesta correcta es: Gastroenteritis aguda

Pregunta **9**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

 Marcar pregunta

Cuáles son las tres fases de la fiebre

Seleccione una:


- a. Ninguna de las opciones es correcta
- b. Elevación, descenso y mantenimiento
- c. Elevación, estabilización y descenso
- d. Elevación, estabilización y mantenimiento ?

La respuesta correcta es: Elevación, estabilización y descenso

Pregunta **10**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

 Marcar pregunta

Cuáles son los principales síntomas de la diabetes mellitus tipo I

Seleccione una:


- a. Poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso ?
- b. Ninguna de las opciones es correcta
- c. Fiebre y malestar general
- d. Pérdida de apetito y ganancia de peso

La respuesta correcta es: Poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso

Pregunta **11**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

 Marcar pregunta

Cuando un niño agitado llega a la urgencia pediátrica, qué debemos hacer

Seleccione una:


- a. Inmovilización terapéutica
- b. Administración de medicación
- c. Ninguna de las opciones es correcta.
- d. Dirigirnos a ellos con expresiones de apoyo y entendimiento, intentando que se tranquilice y recupere el autocontrol ?

La respuesta correcta es: Dirigirnos a ellos con expresiones de apoyo y entendimiento, intentando que se tranquilice y recupere el autocontrol

Pregunta **12**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

 Marcar pregunta

En el caso de un niño que acude a urgencias con disuria y hematuria, qué actuaciones podríamos hacer en el triaje

Seleccione una:


- a. Sondaje vesical
- b. Ninguna de las opciones es correcta
- c. Analítica de sangre
- d. Recogida de muestra de orina ?

La respuesta correcta es: Recogida de muestra de orina

Pregunta **13**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

 Marcar pregunta

En qué etapa de la edad pediátrica es más frecuente la OMA

Seleccione una:


- a. Menores de tres meses
- b. Ninguna de las opciones es correcta.
- c. Entre tres meses y tres años ?
- d. Mayores de tres años

La respuesta correcta es: Entre tres meses y tres años

Pregunta **14**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

 Marcar pregunta

Los fármacos más utilizados en pediatría para la fiebre son

Seleccione una:


- a. Metamizol
- b. Salbutamol
- c. Paracetamol e ibuprofeno ?
- d. Ninguna de las opciones es correcta

La respuesta correcta es: Paracetamol e ibuprofeno

Pregunta **15**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

 Marcar pregunta

Qué signos no nos indicarían gravedad al valorar a un niño en triaje que acude a urgencias por cefalea

Seleccione una:


- a. Ninguna de las opciones es correcta ?
- b. Somnolencia
- c. Puntuación de 4 en la escala de valoración del dolor
- d. Vómitos en escopeta

La respuesta correcta es: Puntuación de 4 en la escala de valoración del dolor

Pregunta **16**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

 Marcar pregunta

Si un niño llega a urgencias con diarrea, qué signo de riesgo debemos tener en cuenta durante la valoración en triaje

Seleccione una:


- a. Alteraciones neurológicas
- b. Compromiso de la vía respiratoria
- c. Deshidratación ?
- d. Ninguna de las opciones es correcta.

La respuesta correcta es: Deshidratación

Pregunta **17**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

 Marcar pregunta

Un lactante llega a urgencia con un TCE tras una caída del cambiador, presenta una puntuación de 15 en la escala de Glasgow, cuál sería nuestra actuación Señale la falsa.

Seleccione una:


- a. Control de las constantes vitales.
- b. Comenzar tolerancia oral
- c. Ingreso en la unidad de hospitalización porque es un lactante
- d. Observación durante 6 - 12 horas ?

La respuesta correcta es: Ingreso en la unidad de hospitalización porque es un lactante

Pregunta **18**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

 Marcar pregunta

Un niño de 5 años acude a urgencias con otalgia, qué signos debemos valorar Señale la falsa

Seleccione una:


- a. Vértigos
- b. Cefalea ?
- c. Otorrea
- d. Fiebre

La respuesta correcta es: Cefalea

Pregunta **19**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

 Marcar pregunta

Un niño de 5 años llega a urgencias con un dolor abdominal intenso, qué actuaciones realizaríamos

Seleccione una:


- a. Valorar la frecuencia respiratoria
- b. Iniciar tolerancia oral de forma progresiva
- c. Control de la coloración de la piel
- d. Control hemodinámico y valoración del dolor ?

La respuesta correcta es: Control hemodinámico y valoración del dolor

Pregunta **20**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

 Marcar pregunta

Un paciente de 2 años acude a urgencias y sus padres nos cuentan que ha convulsionado en casa durante un minuto, cuál de las siguientes actuaciones no es prioritaria

Seleccione una:

- a. Colaborar en la realización de una punción lumbar ?
- b. Valoración del nivel de conciencia
- c. Valoración de la vía aérea
- d. Ninguna de las opciones es correcta

La respuesta correcta es: Colaborar en la realización de una punción lumbar


Finalizar revisión

◀ Examen módulo 3 parte I

Ir a...

Módulo 4: Accidentes en la edad pediátrica ▶

Navegación por el cuestionario



Finalizar revisión

Usted se ha identificado como PABLO SALA SEDEÑO (Salir)
AS-DC-AUPE

- Español - Internacional (es)
- English (en)
- Español - Internacional (es_old)
- Español - Internacional (es)