

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Si la descarga está indicada en un DESA, señale la falsa:

Seleccione una:

- a. No debe haber nadie en contacto con la víctima.
- b. Pulse el botón de descarga, cuando se lo indique el DESA. Cuando son completamente automáticos el aparato libera la energía por si solo.
- c. Continúe según indique el DESA con sus señales visuales y acústicas.
- d. Debe haber alguien en contacto con la víctima. ✓

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Una vez colocado el marcapasos endocavitario provisional transvenoso, ¿cuánto aumentaremos la intensidad por encima del umbral de captura?:

Seleccione una:

- a. Un 20% por encima.
- b. Un 10% por encima. ✓
- c. Un 30% por encima.
- d. Un 40% por encima.

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

La amplitud de la curva pletismográfica depende de:

Seleccione una:

- a. Los cambios en la concentración de oxihemoglobina.
- b. El flujo sanguíneo de los capilares. ✓
- c. A y b son correctas.
- d. Ninguna respuesta es correcta.

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Respecto a la valoración y tratamiento del dolor de las quemaduras durante la fase aguda: Señala la respuesta correcta.

Seleccione una:

- a. Todas duelen más o menos por igual y debe administrarse una pauta fija de analgesia (x miligramos por kilo de peso).
- b. Todas las quemaduras pueden ser dolorosas, tanto las superficiales como las profundas. Debe individualizarse la pauta de analgesia y adaptarla a las necesidades de cada paciente. ✓
- c. Sólo duelen las quemaduras superficiales. Las quemaduras profundas no duelen.
- d. La pauta de analgesia debe administrarse siempre de forma regular e independientemente de si el paciente manifiesta dolor o no.

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Cual de los siguientes signos no indica la sospecha de una fractura de base de craneo:

Seleccione una:

- a. Signo de Battle o hematoma retro mastoideo
- b. Sangre en cavidad oral con piezas dentaria móviles ✓
- c. Ojos de mapache o hematoma periauricular
- d. Otorrea o licuorrea

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Señale la respuesta correcta en la atención de PCR en la embarazada.

Seleccione una:

- a. Antes de las 24 semanas de gestación: La actuación de los SES debe ir encaminada en salvar la vida de la gestante como prioridad absoluta, ya que esta tiene más posibilidades de sobrevivir que el feto, aplicando con normalidad los procedimientos de RCP básica descritos con anterioridad. ✓
- b. Después de las 22 semanas de gestación: Se debe considerar la posibilidad de reanimación viable tanto de la gestante como la del feto.

- c. Después de las 20 semanas de gestación: Se debe considerar la posibilidad de reanimación viable tanto de la gestante como la del feto.
- d. Antes de las 38 semanas de gestación: La actuación de los SES debe ir encaminada en salvar la vida de la gestante como prioridad absoluta, ya que esta tiene mas posibilidades de sobrevivir que el feto, aplicando con normalidad los procedimientos de RCP básica descritos con anterioridad.

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Señale la respuesta incorrecta respecto a las técnicas de movilización en bloque tipo puente:

Seleccione una:

- a. En el puente holandés se realiza un movimiento basculante y lateral hasta alojar al paciente sobre el dispositivo de inmovilización. No es necesario elevar sino desplazar a la víctima evitando bamboleos, con un movimiento suave y progresivo. Los brazos de los reanimadores deben permanecer siempre estirados, mientras que las piernas deben estar flexionadas de un lado y la espalda recta; el cambio de flexión de una pierna a otra de los reanimadores es la que produce el movimiento lateral de la víctima.
- b. En el puente simple o compuesto, un reanimador se encarga de tener preparado y listo el dispositivo de inmovilización para que pueda progresar bajo el paciente, entre las piernas de los reanimadores, que deben permanecer siempre abiertas, ya sea su introducción por la cabeza o por los pies de la víctima.
- c. En el puente simple o compuesto se eleva al paciente al unísono, todo lo alto que sea posible, evitando bamboleos, con movimientos suaves y progresivos (movimiento vertical). Los brazos de los reanimadores deben permanecer siempre estirados, mientras que las piernas deben estar flexionadas y la espalda recta. Al elevar al paciente la fuerza debe ejercerse con las piernas que deben permanecer rectas con el paciente elevado. ✓
- d. La diferencia entre el puente simple y el puente compuesto es el número de reanimadores intervinientes, siendo esta última la técnica más completa y segura para movilizar lesionados, principalmente si son graves o tienen un riesgo especial.

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Señale la respuesta incorrecta sobre las técnicas básicas de movilización para la asistencia del paciente politraumatizado durante la valoración primaria:

Seleccione una:

- a. Los volteos y la retirada del casco deben ser realizadas por cualquier interviniente en la zona, previa a la llegada de equipos de emergencia. ✓

- b. Durante el volteo en pacientes con bajo nivel de consciencia se obviará la movilización integrada con tabla espinal larga, la prioridad es la asistencia.
- c. El volteo a decúbito supino en pacientes graves ocasiona en muchas situaciones profusión de la lengua y mayor riesgo de aspiración debiendo intervenir rápidamente sobre la vía aérea.
- d. El volteo de pacientes en decúbito prono se realizará siempre que sea posible en sentido contrario a la dirección de la cara del paciente.

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Una mascarilla es de tamaño adecuado cuando cubre:

Seleccione una:

- a. Boca y nariz ✓
- b. La boca
- c. Boca, nariz y parte interna de los ojos
- d. La nariz.

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Paciente que sufre una fractura abierta de miembros inferiores, con sangrado profuso, hipotensión, alteración del nivel de consciencia y estridor laríngeo: ¿Cuál es la prioridad?

Seleccione una:

- a. Estridor laríngeo. ✓
- b. Fractura abierta
- c. Sangrado profuso e hipotensión.
- d. Alteración del nivel de consciencia.

Pregunta 11

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

La madre nos dice que pesa poco más de 10 kg. El bebé precisa tratamiento eléctrico, pues está:

Seleccione una:

- a. En AESP. Se le dará un primer choque eléctrico de 40 J. Si precisa un segundo choque será el doble, 80 J.
- b. Está en Fibrilación Ventricular o Taquicardia Ventricular con pulso. Se le dará un primer choque de 40 J. Si precisa otros, serán igual. ✘
- c. Está en Fibrilación Ventricular o Taquicardia Ventricular sin pulso. Se le dará un primer choque de 20 J. Si persiste, la segunda descarga será a 40J.
- d. Está en Fibrilación Ventricular o Taquicardia Ventricular sin pulso, se dará el primer choque a 60J y los siguientes a 120J.

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Señale la respuesta incorrecta respecto a las movilizaciones en bloque:

Seleccione una:

- a. Las movilizaciones controladas son desplazamientos del paciente con las manos de los reanimadores, sin la utilización de dispositivos de movilización/inmovilización, éstas permiten arrastrar, elevar o lateralizar con seguridad, hasta una zona lo más estable posible donde aplicar las técnicas habituales.
- b. El puente holandés consiste en un desplazamiento lateral en bloque para trasladar a la víctima a un dispositivo integrado de inmovilización.
- c. El puente simple y el puente compuesto consiste en una mínima elevación del paciente desde el suelo de la víctima, tal que permita introducir por debajo de ella un dispositivo integral de inmovilización.
- d. La técnica de volteo no se considera una movilización en bloque puesto que debe utilizarse durante la asistencia primaria del paciente politraumatizado. ✔

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

La salida masiva de plasma del espacio intravascular hacia el espacio intersticial que se produce cuando hay lesiones hísticas importantes se denomina:

Seleccione una:

- a. Plasmorragia. ✔
- b. Hemorragia intraintersticial.
- c. Liberación plasmática masiva.
- d. Ninguna de las anteriores.

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

El pulso en pediatría:

Seleccione una:

- a. En lactantes, se busca el pulso braquial.
- b. En lactantes, se busca el pulso femoral.
- c. En niños mayores de un año, se localiza el pulso carotídeo.
- d. Las respuestas a y c son correctas. ✓

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En niños, a la hora de la realización de una radiografía ósea articular, se tendrá en cuenta:

Seleccione una:

- a. Obtener imagen de ambas articulaciones en caso de ser ésta bilateral. ✓
- b. Obtener imágenes mediante dos proyecciones: anteroposterior y lateral.
- c. Obtener imagen, además de la articulación afectada, de las dos más cercanas, en el caso de las extremidades.
- d. Ninguna respuesta es correcta.

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Qué valores de TA durante la RCE aumentan la mortalidad y empeoran la calidad de vida de los pacientes al alta?

Seleccione una:

- a. TAS < 90 mmHg y TAM < 65 mmHg ✓
- b. TAS > 90 mmHg y TAM > 65 mmHg
- c. TAD < 90 mmHg y TAS < 65 mmHg
- d. TAM > 90 mmHg y TAS > 65 mmHg

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

A un paciente que muestra en su registro de EKG una Asistolia, está indicado la terapia de eléctrica de:

Seleccione una:

- a. Estimulación intermitente con marcapasos transcutáneo
- b. Choque eléctrico asincrónico
- c. Choque eléctrico sincronizado
- d. Ningún tratamiento eléctrico ✓

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Cuándo debe realizarse una cricotiroidotomía de emergencia?

Seleccione una:

- a. En ahogamientos en agua salada.
- b. Siempre que no se tenga experiencia en la intubación orotraqueal.
- c. Para poder retirar la mascarilla laríngea.
- d. Ante una obstrucción insalvable de la vía aérea. ✓

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Dentro de las indicaciones de la intubación orotraqueal, encontramos:

Seleccione una:

- a. Saturación de oxígeno mayor de 90%.
- b. Glasgow mayor o igual a 8 puntos.
- c. Paciente incapaz de proteger la vía aérea por si mismo. ✓
- d. Paciente con obstrucción de la vía aérea.

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Señale la respuesta incorrecta respecto al drenaje pleural de emergencia:

Seleccione una:

- a. Su indicación directa es el tratamiento del neumotórax a tensión cuya sospecha se corrobora con control radiográfico. ✓
- b. Ésta se puede realizar con una cánula intravenosa de 14 gauges (G) ajustada a un dedo de guante roto o con sondas pleurales de pequeño calibre que se comercializan en kit preparados.
- c. La utilización de la válvula de Heimlich está muy extendida. Consiste en un tubo de goma aplanado en un extremo, que actúa como válvula unidireccional dejando pasar el aire o líquido y evita que estos vuelvan a introducirse en el tórax.
- d. La zona a puncionar es la línea medio clavicular en segundo espacio intercostal por encima del borde superior de la tercera costilla (evitando el paquete vasculonervioso que se encuentra por debajo de las costillas).

Pregunta 21

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Para el tratamiento de una bradicardia sintomática que no responde a la administración de Atropina IV, se optará por:

Seleccione una:

- a. Administrar Atropina 3 mg IV en bolo directo.
- b. Administrar Adrenalina 1mg cada 3/5 min
- c. Iniciar perfusión de Dobutamina.
- d. La infusión de Dopamina o Adrenalina o la estimulación eléctrica a través del marcapasos transcutáneo. ✓

Pregunta 22

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Usted es el enfermero de un equipo de emergencias. Cuando valora el nivel de conciencia de un paciente que ha sufrido un traumatismo craneoencefálico determina que abre los ojos al hablarle, está irritable y realiza una flexión anormal de decorticación. ¿Qué puntuación resulta en la escala de coma de Glasgow?:

Seleccione una:

- a. 7
- b. 10

c. 9 ✓

d. 8

Pregunta 23

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Los valores fisiológicos de la saturación de oxígeno y de la presión parcial de oxígeno son:

Seleccione una:

- a. PaO₂ superior a 95 mmHg y SatO₂ entre 95-100%. ✓
- b. PaO₂ entre 95-100 mmHg y SatO₂ superior al 95%.
- c. PaO₂ superior al 95% y SatO₂ entre 95-100 mmHg.
- d. PaO₂ entre 95-100% y SatO₂ superior a 95 mmHg.

Pregunta 24

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En cuanto a la aspiración gástrica previa intubación podemos afirmar:

Seleccione una:

- a. Toda embarazada se considerará «con estómago lleno» de cara a la intubación.
- b. Se debe al enlentecimiento del vaciado gástrico.
- c. No sufre variaciones con la paciente no gestante.
- d. A y b son correctas. ✓

Pregunta 25

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Señale la respuesta incorrecta respecto al colchón de vacío:

Seleccione una:

- a. El colchón de vacío es el sistema más completo y sencillo de inmovilización integral, siendo de los más cómodos de almacenamiento y utilización. ✓
- b. Alojada la víctima sobre el dispositivo, la extracción del vacío permite inmovilizar en bloque la posición corporal, tal y como se encuentre, siendo muy versátil, especialmente en pacientes empalados o con deformidades no se puedan alinear.

- c. Su superficie permite proteger térmicamente al paciente y el único dispositivo de inmovilización al que debe ir asociado es un collarín cervical, puesto que el resto de dispositivos, tales como la férula tetracameral, pueden ser sustituidos con la adaptación de la zona pericraneal del colchón.
- d. Está especialmente indicado para pacientes con fracturas vertebrales, pelvis o extremidades inferiores catastróficas o bilaterales; siendo el dispositivo ideal para los traslados de larga distancia dentro de una ambulancia por comodidad y seguridad para el paciente.

Pregunta 26

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Respecto a la fractura de pelvis, señale la incorrecta:

Seleccione una:

- a. Puede perder hasta 3L de volumen circulante siendo su tratamiento definitivo quirúrgico
- b. Para inmovilizarlo se puede utilizar un body espinal al revés, una correa de inmovilización ajustada y principalmente un colchón de vacío.
- c. Su presencia debe hacernos sospechar que el paciente no utilizaba cinturón de seguridad ✓
- d. Ante una pelvis rota se debe sospecha la existencia de lesión en órganos pélvicos (genitourinarios)

Pregunta 27

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Respecto al TCE grave ¿cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta?

Seleccione una:

- a. Los corticoides no deben emplearse en el manejo inicial
- b. La fluidoterapia se realiza con Suero Glucosado 5% ✓
- c. En la Escala de Glasgow siempre se utiliza la mejor respuesta motora
- d. Debe considerarse que la lesión cerebral NO es la causante de hipotensión

Pregunta 28

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿La primera medida a tomar con un politraumatizado durante la valoración primaria práctica, que se ha precipitado desde la segunda planta de un edificio será?

Seleccione una:

- a. Apertura de la vía aérea y control cervical. ✓
- b. Reanimar a la víctima puesto que posiblemente este en PCR
- c. Palpar pulso el carótideo para diagnosticar una actividad eléctrica sin pulso
- d. Evaluar estado de conciencia

Pregunta 29

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

La presencia de oligoamnios se considera:

Seleccione una:

- a. Indica que el feto es mayor de 37 semanas
- b. Siempre indica infección materna
- c. Factor de riesgo prenatal ✓
- d. Indica buen pronóstico.

Pregunta 30

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Cuál de los siguientes parámetros es el indicador más fiable a la hora de valorar si un gran quemado está recibiendo un volumen adecuado de líquido durante la emergencia y la urgencia?

Seleccione una:

- a. La PVC
- b. La diuresis horaria ✓
- c. El gasto cardíaco
- d. La TA y la FC

Pregunta 31

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Respecto a los condicionantes que afectan al éxito de la cesárea, es falso:

Seleccione una:

- a. Es independiente la edad gestacional. ✓
- b. Tiempo transcurrido desde el inicio del paro y la misma.
- c. Eficacia de las maniobras de RCP durante la cesárea, ya que no deben interrumpirse.
- d. Etiología de la PCR

Pregunta 32

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Ante un paciente con shock hipovolémico, señale la incorrecta:

Seleccione una:

- a. La reposición de líquidos se realizará agresivamente ante cualquier signo precoz de hipovolemia ✓
- b. Administraremos sueroterapia agresiva a razón de 30ml/Kg
- c. La proporción será de 3 partes de cristaloides (Fisiológico o Ringer) por cada parte de sangre perdida, es decir, 300 ml de cristaloides por cada 100 ml de sangre perdida.
- d. La frecuencia cardíaca monitorizará la respuesta a la administración de líquido y su repercusión hemodinámica

Pregunta 33

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Entre las complicaciones más frecuentes en la canalización de una vía central, no se encuentra:

Seleccione una:

- a. Embolia gaseosa.
- b. Neumotórax.
- c. Arritmias cardíacas.
- d. Todas son posibles. ✓

Pregunta 34

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Con mayor probabilidad a qué se atribuye una hipotensión en el contexto de un trauma torácico penetrante por arma?

Seleccione una:

- a. Al sangrado
- b. Taponamiento cardíaco.
- c. Al dolor
- d. A y b son correctas ✓

Pregunta 35

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En relación a un recién nacido de pocos minutos de vida que precisa expansores de volumen:

Seleccione una:

- a. La vía de elección para su administración, mientras se canaliza la vena umbilical, es la vía oral.
- b. La dosis habitual es de 10 mL/kg en 5-10 minutos. ✓
- c. Si se sospecha de anemia aguda se transfunde sangre del grupo 0 y Rh(+)
- d. Los más utilizados son los sueros glucosados.

Pregunta 36

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

El valor fisiológico de la hemoglobina en mujeres es:

Seleccione una:

- a. 8-12 gr/dl.
- b. 10-14 gr/dl.
- c. 12-16 gr/dl. ✓
- d. 14-18 gr/dl.

Pregunta 37

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En relación a un recién nacido de pocos minutos de vida, la administración de naloxona:

Seleccione una:

- a. Está indicada en caso de drogadicción materna
- b. La vía de elección para su administración en el RN intubado es la endotraqueal
- c. Puede administrarse sin diluir a 0,25 mL/kg por vía intramuscular ✓
- d. Si sospechamos depresión respiratoria por narcóticos administrados 4 horas antes del parto, en un recién nacido la primera medida a tomar es su administración subcutánea.

Pregunta 38

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

El control de hemorragias se realiza por, señale la respuesta más completa:

Seleccione una:

- a. Una presión firme y fuerte del lugar de sangrado, ayudándonos de telas, pañuelos, vendas, compresas etc.
- b. Una presión fuerte y prolongada del lugar de sangrado, ayudándonos de telas, pañuelos, vendas, compresas etc.
- c. Una presión firme, fuerte y prolongada del lugar de sangrado, ayudándonos de telas, pañuelos, vendas, compresas etc. ✓
- d. Una presión firme, fuerte y prolongada del lugar de sangrado, ayudándonos de telas, pañuelos, vendas, compresas, torniquetes etc.

Pregunta 39

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Paciente quemado en un incendio doméstico, con quemaduras profundas y extensas (gran quemado). A su llegada a urgencias presenta indicios y signos de inhalación de humo, aunque el paciente no muestra síntomas de insuficiencia respiratoria. Lleva mascarilla con oxígeno al 50%. Al monitorizar la saturación de oxígeno aparece una saturación del 100% ¿Cuál de las siguientes actuaciones o decisiones es correcta?

Seleccione una:

- a. No retirar ni disminuir el aporte de oxígeno hasta tener el resultado de la gasometría y carboxihemoglobinemia. El valor de saturación mostrado por el pulsioxímetro no es siempre real en estos casos. ✓
- b. Retirar o disminuir el aporte de oxígeno por el riesgo de provocar una alcalosis respiratoria.
- c. Administrar broncodilatadores de forma profiláctica para prevenir el edema de glotis.
- d. Avisar al médico para intubar al paciente. Se debe intubar a todos los pacientes que hayan podido inhalar humos durante un incendio.

Pregunta 40

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Entre los puntos a visualizar durante la ecografía de emergencia según el protocolo FAST, no se encuentra el:

Seleccione una:

- a. Fondo de saco de Douglas.

- b. Espacio de Morrison.
- c. Espacio esplenorenal.
- d. Conducto de Silvio. ✓

Pregunta 41

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Respecto a la instauración de una vía para administración de fármacos:

Seleccione una:

- a. Se tratará de canalizar una vía venosa. Si no se puede tras tres intentos o 90 segundos, se tratará de instaurar una vía intraósea en el maleolo tibial externo, pues es menor de 8 años.
- b. Se tratará de canalizar una vía venosa. Si no se puede tras tres intentos o 90 segundos, se tratará de instaurar una vía intraósea en el maleolo tibial interno, pues es menor de 8 años.
- c. Se tratará de canalizar una vía venosa. Si no se puede tras tres intentos o 90 segundos, se tratará de instaurar una vía intraósea a 1 ó 2 centímetros por debajo de la extremidad proximal de la tibia, pues es menor de 8 años. ✓
- d. Se tratará de canalizar una vía venosa. Si no se puede tras dos intentos o 60 segundos, se tratará de instaurar una vía intraósea a 1 o 2 centímetros por debajo de la extremidad proximal de la tibia, pues es menor de 8 años.

Pregunta 42

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Un bebé sufre un colapso delante nuestro, la madre está muy nerviosa y no es capaz de reaccionar con rapidez. Como estamos en el parking de un centro comercial sin cobertura de telefonía:

Seleccione una:

- a. Colocamos al niño en posición de seguridad, dejamos a la madre que vigile al niño, y vamos a buscar ayuda.
- b. Pedimos a la madre que coja al niño en brazos, y que nos siga, yendo nosotros por delante más deprisa para buscar ayuda.
- c. Cogemos al niño en nuestros brazos y vamos a buscar ayuda mientras intentamos reanimarle por el camino. ✓
- d. Dejamos al niño en posición de seguridad, tranquilizamos a la madre y vamos los dos a buscar ayuda, cada uno por un lado para aumentar las posibilidades de conseguirlo más rápidamente.

Pregunta 43

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Señala la opción que es incoherente con sus alternativas:

Seleccione una:

- a. Hipotermia
- b. Neumotórax a tensión
- c. Hipovolemia
- d. Traumatismo ✓

Pregunta 44

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿qué precauciones tendremos en cuenta a la hora de emplear un desfibrilador?

Seleccione una:

- a. Retirar la fuente de O2 del paciente.
- b. Nadie deberá tocar al paciente mientras se da la descarga eléctrica.
- c. Se debe aplicar gel conductor entre las palas y el paciente para evitar quemaduras en el paciente.
- d. Todas las anteriores son correctas. ✓

Pregunta 45

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Un paciente explica que le ha caído un líquido encima del cual no conoce su naturaleza pero le produce mucho dolor en forma de escozor intenso y presenta un eritema. Qué actuación de las siguientes es la más correcta:

Seleccione una:

- a. Aplicarle una compresa empapada con ácido acético al 2%.
- b. Aplicarle una compresa empapada con bicarbonato sódico al 1%.
- c. Lavar la zona afectada con agua a chorro durante al menos 15-20 minutos. ✓
- d. Aplicarle gasas empapadas con suero fisiológico y derivarle lo antes posible a un hospital con unidad de quemados.

Pregunta 46

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Si un recién nacido tras 30 segundos de ventilación con presión positiva y masaje cardiaco presenta una frecuencia cardiaca de 80 lpm se debe:

Seleccione una:

- a. Suspender el masaje cardiaco y seguir ventilando ✓
- b. Seguir masaje cardiaco hasta que la frecuencia cardiaca sea >100 lpm
- c. Administrar oxígeno libre
- d. Administrar una dosis de adrenalina

Pregunta 47

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Cual es la causa más frecuente de PCR en adultos?

Seleccione una:

- a. Cardiaca ✓
- b. Respiratoria
- c. Por hipovolemia
- d. ICTUS isquémico

Pregunta 48

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En los lactantes:

Seleccione una:

- a. La relación compresiones-ventilaciones es como para los niños, 30:2 para reanimadores legos. ✓
- b. La relación compresiones-ventilaciones es como para los niños, 15:1 para personal sanitario y 30:2 para reanimadores legos.
- c. Se diferencia entre lactantes, niños y neonatos para la relación compresiones- ventilaciones.
- d. El ritmo del masaje cardiaco externo debe ser a 150 compresiones por minuto (pues la frecuencia cardiaca basal de los lactantes es mayor que la de los niños).

Pregunta 49

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

El resultado de una gasometría arterial muestra un descenso de pH acompañado de aumento de PaCO₂ y con una cifra normal de CO₃H⁻, sugiere:

Seleccione una:

- a. Acidosis respiratoria aguda. ✓
- b. Acidosis respiratoria crónica.
- c. Alcalosis metabólica aguda.
- d. Alcalosis metabólica crónica.

Pregunta 50

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿A partir de cuánto tiempo de compresión, se estima que existe un elevado riesgo de sufrir el síndrome de aplastamiento?

Seleccione una:

- a. 1 hora.
- b. 12 horas.
- c. 8 horas.
- d. 4 horas. ✓

Pregunta 51

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En España es cierto que:

Seleccione una:

- a. Los accidentes son la primera causa de muerte en niños mayores de un año.
- b. El SMSL tiene mayor incidencia entre los 2 a 4 meses de vida.
- c. Las causas más frecuentes en los menores de un año de muerte son las anomalías congénitas y la prematuridad.
- d. Todas las respuestas son correctas. ✓

Pregunta 52

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

La ratio compresión-ventilación en el paciente adulto es de, señale la correcta.

Seleccione una:

- a. 30:2 ✓
- b. 15:2
- c. 5:1
- d. 30:1

Pregunta 53

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

No es cierto que la enfermera en Pediatría, ante el SMSL:

Seleccione una:

- a. Sólo puede colaborar con el médico en las revisiones del niño. ✓
- b. Debe identificar los factores de riesgo existentes de SMSL.
- c. Tiene una importante labor educativa, tanto para disminuir factores de riesgo de SMSL, como para apoyar a los familiares en el uso de dispositivos de monitorización domiciliaria (monitores, pulsioxímetros)
- d. Actualmente existe un diagnóstico enfermero de Riesgo de Síndrome de Muerte Súbita del Lactante.

Pregunta 54

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Como causas fundamentales que derivan en una PCR de una mujer gestante podemos encontrar las siguientes excepto:

Seleccione una:

- a. Embolismo pulmonar.
- b. Hemorragias digestivas. ✓
- c. Insuficiencia cardiaca congestiva.
- d. Hemorragia intracraneal de origen toxémico.

Pregunta 55

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿En caso de parada respiratoria con pulso cada cuanto hay que comprobar el pulso del paciente?

Seleccione una:

- a. Solo una vez al principio.
- b. Cada 10 segundos.
- c. Cada 2 minutos. ✓
- d. Comprobar pulso radial si la situación del paciente cambia.

Pregunta 56

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

La rama izquierda y derecha del algoritmo de paro cardiaco, además de diferenciarse en el tipo de ritmo, desfibrilable o no desfibrilable, se diferencia esencialmente en:

Seleccione una:

- a. Los minutos de RCP entre cada reevaluación del ritmo
- b. La dosis de Adrenalina
- c. La medicación protocolizada y las descargas eléctricas ✓
- d. La única diferencia es la necesidad o no de masaje cardíaco

Pregunta 57

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

La colocación de la cánula nasofaríngea:

Seleccione una:

- a. Está contraindicada en pacientes con sospecha de fractura de la base del cráneo.
- b. Se puede colocar en pacientes conscientes.
- c. No protege contra la broncoaspiración.
- d. Todas son correctas. ✓

Pregunta 58

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Cuál de las siguientes medidas puede ayudar a prevenir la muerte súbita del lactante?

Seleccione una:

- a. Colocarle en decúbito prono para dormir.
- b. Emplear colchones blandos y muy acolchados.
- c. Evitar el tabaquismo durante la gestación. ✓
- d. La lactancia artificial.

Pregunta 59

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

El tiempo máximo recomendable de un intento de intubación endotraqueal es de:

Seleccione una:

- a. 60 segundos
- b. 90 segundos
- c. 30 segundos ✓
- d. El necesario para conseguir la intubación

Pregunta 60

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Identifica cuál de los siguientes elementos es un dispositivo integrado de inmovilización:

Seleccione una:

- a. Un collarín cervical o una férula tetracameral.
- b. Una tabla espinal larga. ✓
- c. Una camilla de cuchara.
- d. Un inmovilizar espinal, tipo férula de Kendrick.

Pregunta 61

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Qué tipo de analgesia y por qué vía es la más adecuada durante la emergencia de un gran quemado (SCTQ mayor del 15-20%)?

Seleccione una:

- a. Metamizol o paracetamol por vía oral.
- b. Meperidina por vía subcutánea.

c. Morfina por vía endovenosa. ✓

d. No debe administrarse analgésicos hasta que haya sido valorado en un centro especializado.

Pregunta 62

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Con respecto al paciente politraumatizado pediátrico señale la respuesta incorrecta:

Seleccione una:

a. Para la reposición de volumen es de elección la vía periférica y si esta no es posible se puede utilizar una vía intraósea

b. La hipotermia no es un factor esencial en la inestabilidad hemodinámica aunque si la hipoxia y la hipovolemia ✓

c. Las fracturas costales de la 5ª a la 8ª costilla hacen sospechar lesiones abdominales altas (hígado y bazo)

d. La diuresis normal del lactante es de 2ml/Kg/h

Pregunta 63

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Señale la respuesta incorrecta respecto a la utilización de una férula tetracameral o dama de Elche:

Seleccione una:

a. La base debe ser fijada sobre una tabla espinal larga, tanto en su parte superior como lateral por un sistema de velcros, recomendándose estar siempre previamente preparada.

b. La colocación de las almohadillas laterales deben quedar ajuntadas a la cabeza lateralmente y apoyada sobre el hombro del paciente, la parte oblicua debe quedar hacia el exterior y en la posición correcta debe permitir visualizar el pabellón auricular.

c. Colocadas las almohadillas, se colocarán las cintas o barbuquejos, para fijar lo antes posible el movimiento se utiliza primero la de la frente y posteriormente el mentoniano (éste debe recaer sobre el barbuquejo del collarín cervical), si es posible se dispondrán en cruzado para mejorar la inmovilización.

d. La utilización de una férula tetracameral puede realizarse con otros dispositivos, tales como la camilla de cuchara o el colchón de vacío, siempre que se utilicen al revés las almohadillas laterales (parte oblicua hacia el paciente), ya que están diseñadas para ello. ✓

Pregunta 64

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En relación al tipo de traumatismo, podemos afirmar:

Seleccione una:

- a. La mayoría de los traumatismos que sufren las embarazadas son menores.
- b. A partir del tercer trimestre (32 semanas) la gestante es más susceptible a las caídas.
- c. El traumatismo mayor se asocia con politrauma y afectación sistémica de la embarazada
- d. Todas las anteriores son correctas. ✓

Pregunta 65

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En cuanto a la cesárea de urgencia es cierto:

Seleccione una:

- a. Un aspecto controvertido es el momento de realizar la cesárea en una gestante.
- b. Incluye sólo los casos de cesárea postmortem.
- c. Provoca gran mejora del estado circulatorio
- d. A y c son correctas. ✓

Pregunta 66

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Qué nombres reciben los rudos percibidos durante la toma de tensión arterial?

Seleccione una:

- a. Stamirnoff.
- b. Korotkoff. ✓
- c. Strogoff.
- d. Kotrokoz.

Pregunta 67

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

A la hora de canalizar una vía umbilical es importante que tengamos en cuenta que:

Seleccione una:

- a. La vena umbilical se encuentra situada de forma tangencial a la arteria umbilical y es de menor calibre.
- b. La vena umbilical se encuentra situada en el centro del cordón umbilical y es de mayor calibre que las arterias. ✓
- c. Las venas umbilicales tienen las paredes más gruesas que las arterias.
- d. Las venas umbilicales se localizan alrededor de la arteria umbilical, que se encuentra a su vez en el centro del cordón.

Pregunta 68

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Señale la respuesta incorrecta respecto a la camilla de cuchara:

Seleccione una:

- a. Se podría denominar «dispositivo puramente de movilización», puesto que se utiliza para movilizaciones cortas en caminos poco accidentados, hasta un lugar más adecuado para asistir al paciente o para alojarlo sobre otro dispositivo de inmovilización; para su utilización el paciente debe presentarse en decúbito supino.
- b. También se denomina de palas o de cuchara. Ortodoxamente se utilizan para cualquier tipo de movilización, sea cual sea su dificultad, ya que existen técnicas de inmovilización en dicho dispositivo, garantizando la seguridad del paciente. ✓
- c. La técnica de colocación se sustenta en un mínimo volteo lateral por ambos lados (que podría ser una pequeña elevación lateral, de unos 20-30° máximo) que abra un pequeño espacio por donde se facilite la introducción de la mitad de la camilla.
- d. Es una camilla telescópica (ajustable en longitud) que se separan en dos mitades longitudinales compuestas por cuñas cóncavas. Para su colocación adecuada hacen falta al menos tres rescatadores y que el paciente se encuentre en decúbito supino, previa utilización de un collarín cervical.

Pregunta 69

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Respecto a las recomendaciones a la extracción en un accidente de tráfico, señale la incorrecta

Seleccione una:

- a. La rotación permitida para la extracción no debe superar los 90° para giros laterales
- b. Mientras sea posible todos los pacientes serán extraídos con movilizaciones lineales a través del maletero
- c. Tras la movilización es urgente la analgesia de la víctima extraída ✓
- d. Las movilizaciones laterales en paciente sentado deben realizarse siempre con un inmovilizador espinal

Pregunta 70

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En cuanto al recuento de glóbulos blancos durante el embarazo, podemos afirmar:

Seleccione una:

- a. Los leucocitos tienden a aumentar siendo la media de 10.000 a 12.000 al final del embarazo.
- b. Tienden a disminuir durante una situación de estrés.
- c. Pueden aumentar con facilidad a 25.000 en respuesta a una situación de estrés.
- d. A y c son correctas. ✓

Pregunta 71

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Del material de reanimación neonatal expuesto en las siguientes respuestas, ¿cuál consideras más adecuado para tener preparado?

Seleccione una:

- a. Catéter umbilical de 10 Fr.
- b. Sondas de aspiración nº 5, 6, 8, 10, 12 y 14 Fr ✓
- c. Laringoscopio de pala curva nº 1 y 2
- d. Bolsa autoinflable de 1200 ml.

Pregunta 72

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

El fármaco de primera elección en la rama de Asistolia y AESP del protocolo de PCR es:

Seleccione una:

- a. Adrenalina ✓
- b. Atropina
- c. Amiodarona
- d. Adenosina

Pregunta 73

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Un niño con líquido amniótico teñido de meconio tiene al nacer llanto enérgico y buen tono muscular. Señala la acción correcta:

Seleccione una:

- a. Dárselo a la madre **X**
- b. Colocar bajo fuente de calor radiante y aspirar boca-nariz con una sonda
- c. Con ayuda de laringoscopio intubar y aspirar tráquea
- d. Dar oxígeno al 100%

Pregunta 74

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En un paciente atrapado, al cual solo podemos acceder por un espacio alejado y de unos 5 cm², ¿cuál sería el fármaco de elección para su sedoanalgesia, mientras los equipos de rescate abren un acceso hasta él?:

Seleccione una:

- a. Fentanilo IV
- b. Midazolam IV
- c. Ketamina IV
- d. Ketamina IM **✓**

Pregunta 75

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En cual de las siguientes situaciones se debe aplicar la RCP, aunque la parada cardiorespiratoria lleve más de 20 minutos de evolución:

Seleccione una:

- a. Hipotermia.
- b. Ahogamiento por inmersión.
- c. En parada cardiorespiratoria por IAM.
- d. A y B **✓**

Pregunta 76

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Señale la respuesta incorrecta respecto al inmovilizador espinal:

Seleccione una:

- a. Consisten en un chaleco o arnés de lona reforzado con varias varillas metálicas transversales que van desde la cabeza al sacro, se divide entre tres partes (craneal, cervical y toracolumbar) y no hace falta que vaya asociado a ningún otro dispositivo de inmovilización. ✓
- b. El dispositivo se fija al cuerpo del paciente por un sistema de correas de colores: dos cintas craneales ajustables con velcros (para evitar los movimiento laterales de la cabeza), tres correas toracoabdominales para fijar el paciente al dispositivo (tórax, abdomen superior y abdomen inferior) y dos correas o perneras inguinales (para evitar los desplazamientos superiores e inferiores del dispositivo).
- c. Los inmovilizadores espinales son los únicos dispositivos diseñados para la extracción lateral de pacientes con seguridad, es decir, para realizar movilizaciones de giros laterales en pacientes sentados.
- d. Tras la extracción de la víctima deben retirarse rápidamente los anclajes inguinales, en decúbito supino provocan dolor y flexión de las piernas. Nunca se debe trasladar a un paciente con un dispositivo de inmovilización espinal, con lo que debe retirarse por completo cuando sea posible, manteniendo al paciente sobre una tabla espinal larga.

Pregunta 77

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

La presencia de líquido amniótico en vagina se puede comprobar:

Seleccione una:

- a. Midiendo el Ph vaginal entre 7-7.5 sería indicativo de rotura de membranas. ✓
- b. Midiendo el Ph vaginal entre 4-4.5 sería indicativo de rotura de membranas.
- c. Midiendo el Ph vaginal entre 11-12.5 sería indicativo de rotura de membranas.
- d. Sólo mediante ecografía.

Pregunta 78

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

La visualización de una imagen oscura con forma de semiluna bajo sendas cúpulas diafragmáticas en la radiografía de abdomen es compatible con:

Seleccione una:

- a. Masa tumoral abdominal.
- b. Neumoperitoneo. ✓

- c. Peritonitis.
- d. Ascitis.

Pregunta 79

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Cual de los siguientes no es un eslabón de la cadena de supervivencia intrahospitalaria?

Seleccione una:

- a. Desfibrilación rápida.
- b. Vigilancia y prevención.
- c. Hipotermia inducida. ✓
- d. RCP de calidad.

Pregunta 80

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Las quemaduras dérmicas superficiales (o de segundo grado superficial) se caracterizan por:

Seleccione una:

- a. El lecho de la quemadura es de color rojo o rosado. ✓
- b. Tener la sensibilidad disminuida (hipoestesia).
- c. El lecho de la quemadura es de color blanquecino.
- d. Ser las menos graves.

Pregunta 81

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Cuál de estos dispositivos no están diseñados para el traslado de un paciente politraumatizado hasta un centro hospitalario?

Seleccione una:

- a. Un inmovilizador espinal
- b. Un colchón de vacío
- c. Una camilla de cuchara
- d. A y c no están diseñados para traslados largos ✓

Pregunta 82

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Para la reanimación neonatal es recomendable disponer de :

Seleccione una:

- a. Catéter umbilical nº 5 y 8 FR
- b. Catéter umbilical nº 8 y 10 Fr
- c. Catéter umbilical nº3,5 y 5 Fr ✓
- d. Catéter umbilical de 10 y 15 Fr

Pregunta 83

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Identifica cuál de los siguientes es un elemento de inmovilización:

Seleccione una:

- a. Un collarín cervical.
- b. Un dispositivo araña o unas correas de inmovilización. ✓
- c. Un colchón de vacío.
- d. Una tabla espinal larga.

Pregunta 84

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

La dosis inicial de adrenalina que se da en lactantes es:

Seleccione una:

- a. Todas son correctas. ✓
- b. 0,01 mgr/kg si se administra por vía intravenosa.
- c. 0,1 mgr/kg peso si se administra por vía endotraqueal.
- d. La dosis para vía intraósea es igual que para vía intravenosa.

Pregunta 85

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

La Gestión Integral del Accidente de Tráfico (GIAT), indique la incorrecta:

Seleccione una:

- a. Pretende sustituir a otras sistemáticas de atención de emergencias extrahospitalarias ✓
- b. Es un conjunto de acciones sistemáticas, secuenciadas, lógicas y definidas en la atención de un accidente de tráfico
- c. Incluye temáticas relacionadas con: seguridad de la escena, organización del escenario, asistencia y extracción de las víctimas hasta su traslado a un centro útil
- d. Se sustenta en un Protocolo Asistencial al Accidente de Tráfico (PRASAT)

Pregunta 86

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Respecto al colchón de vacío, indica la respuesta incorrecta:

Seleccione una:

- a. Para que realice perfectamente su función debe cubrir 2/3 de la superficie corporal del paciente.
- b. Para que realice perfectamente su función debe cubrir 1/3 de la superficie corporal del paciente. ✓
- c. Por las características del material con el que está confeccionado, es ideal para evitar la hipotermia
- d. Ninguna de las anteriores

Pregunta 87

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Respecto a la aproximación a un accidente de tráfico, señale la incorrecta:

Seleccione una:

- a. Debe realizarse con precaución dando una vuelta al coche accidentado en busca de riesgos de incendios o orografía ✓
- b. Se deben tomar precauciones de seguridad individual (equipos de protección individual EPIs), doble guante, casco, ropa reflectantes y botas de protección
- c. Se deben tomar medidas de seguridad global del escenario, siendo primordial la colocación adecuada del vehículo asistencial como señalización, protección ante accidentes, iluminación y material logístico sanitario
- d. Debe ser la más segura, rápida y corta posible

Pregunta 88

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

El traumatismo abdominal cerrado se caracteriza:

Seleccione una:

- a. Golpes directos al abdomen sin heridas externas como consecuencia de accidentes con vehículos motorizados, caídas y agresiones. ✓
- b. Ocasionado por armas de fuego o armas blancas.
- c. Las contusiones pulmonares son las más frecuentes.
- d. Todas las anteriores son correctas.

Pregunta 89

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En cuanto a la edad gestacional podemos afirmar:

Seleccione una:

- a. El riesgo de aborto por traumatismo aumenta conforme avanza la edad gestacional.
- b. El riesgo de aborto por traumatismo disminuye conforme avanza la edad gestacional.
- c. Con menos de 16 semanas el riesgo de aborto es menor.
- d. A y c son correctas. ✓

Pregunta 90

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

El principal problema potencial durante la fase aguda de una quemadura profunda por llama, que afecte toda la cara y el cuello (7% de SCTQ) de un paciente adulto es:

Seleccione una:

- a. Riesgo de inestabilidad hemodinámica.
- b. Riesgo de secuelas estéticas.
- c. Riesgo de infección por la dificultad para sujetar los apósitos.
- d. Riesgo de dificultad respiratoria por obstrucción de vía aérea. ✓

Pregunta 91

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Qué entidades sospecharemos ante un paciente con ingurgitación yugular, herida abierta en vértice derecho y silencio auscultatorio en hemitorax derecho?:

Seleccione una:

- a. Hemotórax masivo y/o neumotórax a tensión
- b. Volet costal y neumotórax a tensión
- c. Neumotórax abierto, neumotórax a tensión y/o hemotórax masivo ✓
- d. Neumotórax abierto por herida en tórax

Pregunta 92

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Cuando la curva del capnograma comienza a mostrar hendiduras en la meseta espiratoria, es indicativo de:

Seleccione una:

- a. Disminución de la frecuencia respiratoria.
- b. Aumento brusco de la temperatura corporal.
- c. Broncoespasmos.
- d. Cese de la acción de los relajantes musculares, acompañado de esfuerzos inspiratorios del paciente. ✓

Pregunta 93

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Con respecto al sondaje vesical es falso que:

Seleccione una:

- a. Se debe fijar la sonda vesical al muslo del paciente con esparadrapo para evitar retiradas traumáticas.
- b. Si no se dispone de bolsas antirreflujo, no se deberá colocar la bolsa por encima del paciente.
- c. Una vez colocada se hinchará el globo con 10 ml de suero fisiológico. ✓
- d. La postura para el sondaje femenino es en decúbito supino con rodillas flexionadas.

Pregunta 94

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Como criterio general ¿Cómo hay que actuar al limpiar y aseptizar una quemadura en la urgencia?
Seleccione una:

- a. Retirar de forma enérgica todos los restos de tejido orgánico desvitalizado y lavarla con un antiséptico de amplio espectro.
- b. Sólo hay que retirar la suciedad visible y respetar al máximo las flictenas y restos de epidermis desvitalizada que cubra zonas cruentas.
- c. Lavarla con agua y jabón, frotando hasta que sangre, lo cual indica que se ha eliminado todo el tejido desvitalizado.
- d. Retirar los restos de suciedad y de tejido desvitalizado, de forma suave pero exhaustiva, desbridar flictenas si las hay e irrigar la zona cruenta con suero fisiológico. ✓

Pregunta 95

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Los cuidados postresucitación:

Seleccione una:

- a. Se iniciarán en el mismo momento en que el paciente recupera la circulación espontánea ✓
- b. Se iniciarán en el nivel hospitalario
- c. Se iniciarán en el nivel hospitalario, en la unidad de urgencias
- d. Se iniciarán en el nivel hospitalario, en la unidad de cuidados intensivos

Pregunta 96

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Las repercusiones de los cambios fisiológicos durante el embarazo pueden influir:

Seleccione una:

- a. El resultado de las pruebas diagnósticas complementarias no se ve afectado.
- b. Altera los signos y síntomas de las lesiones
- c. En la valoración de la embarazada que ha sufrido traumatismo.
- d. B y c son correctas. ✓

Pregunta 97

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

La hipotermia se define como toda aquella situación en la que la víctima se encuentra a una temperatura central inferior a, señale la correcta:

Seleccione una:

- a. 35,5°C en ausencia de cualquier otra patología desencadenante como pudiera ser la enfermedad hipotalámica.
- b. 35°C en ausencia de cualquier otra patología desencadenante como pudiera ser la enfermedad hipotalámica. ✓
- c. 36°C en ausencia de cualquier otra patología desencadenante como pudiera ser la enfermedad hipotalámica.
- d. 34,5°C en ausencia de cualquier otra patología desencadenante como pudiera ser la enfermedad hipotalámica.

Pregunta 98

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a las complicaciones de las cánulas orofaríngeas?

Seleccione una:

- a. Un tamaño inadecuado puede producir obstrucción de la vía aérea.
- b. La lengua puede desplazarse hacia atrás a colocar una cánula de tamaño mayor y colapsar las vías aéreas.
- c. Si el paciente no está inconsciente puede provocar el vómito.
- d. Todas las respuestas anteriores son correctas. ✓

Pregunta 99

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

El protocolo FAST se basa:

Seleccione una:

- a. En el diagnóstico precoz de roturas viscerales.
- b. En la detección de líquido libre intraabdominal. ✓
- c. En la visualización de órganos afectados.
- d. En la identificación de alteraciones vasculares a nivel abdominal.

Pregunta 100

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Respecto a la oxigenoterapia en pacientes pediátricos politraumatizados, señale la correcta:

Seleccione una:

- a. Es suficiente administrar oxígeno al 50% de FiO₂ para no causar retinopatías
- b. Es necesario oxígeno al 100% con mascarilla reservorio a 15 l/min ✓
- c. Es necesario oxígeno al 85% con mascarilla reservorio a 10l/min
- d. Ninguna es correcta