

[Página Principal](#) / [Mis cursos](#) / [AS-DC-APAPC](#) / [Módulo Introductorio](#) / [PRETEST](#)

Comenzado el jueves, 15 de marzo de 2018, 13:52

Estado Finalizado

Finalizado en jueves, 15 de marzo de 2018, 13:55

Tiempo empleado 3 minutos 5 segundos

Calificación 9,00 de 10,00 (90%)

Comentario - Buen trabajo - Continuar con el curso

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Ante un accidentado con pérdida de la consciencia y ausencia de respiración

Seleccione una:

- ☐ a. 30 Ventilaciones en 5 minutos
- ☐ b. Ninguna son correcta
- ☒ c. Llamada al 112 e inicio RCP ✓
- ☐ d. Colocación al accidentado en PLS, reevaluación hasta llegada del equipo de emergencias

La respuesta correcta es: Llamada al 112 e inicio RCP

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

De las afirmaciones que se exponen a continuación, señala la incorrecta

Seleccione una:

- ☒ a. El 061 es el número de emergencias de primera elección en todas las comunidades autónomas de España ✓
- ☐ b. El 112 es el número de emergencias utilizado en Europa
- ☐ c. El 112 es el gratuito
- ☐ d. Implica la activación del sistema integral de emergencias

La respuesta correcta es: El 061 es el número de emergencias de primera elección en todas las comunidades autónomas de España

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

En las pautas generales de actuación (P-A-S), proteger tiene el objetivo de

Seleccione una:

- ☒ a. Todas son correctas ✓
- ☐ b. Ninguna son correctas
- ☐ c. Reducir el riesgo de nuevos accidentes
- ☐ d. Evitar agravar las lesiones de los accidentados

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La actividad prioritaria del primer interviniente ante un accidente es

Seleccione una:

- ☐ a. Ninguna es correcta
- ☐ b. Valoración secundaria
- ☐ c. RCP
- ☒ d. Evaluación de la escena ✓

La respuesta correcta es: Evaluación de la escena

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

La evaluación neurológica del paciente traumatizado puede realizarse mediante la escala de Glasgow. Ante un accidentado que presenta sonido incomprensibles, localiza el dolor cuando se le estimula y abre los ojos al realizarle estímulos dolorosos, tiene una puntuación de

Seleccione una:

- ☐ a. 15
- ☐ b. 10
- ☒ c. 9 ✓
- ☐ d. 13

La respuesta correcta es: 9

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

La palpación de pulso femoral nos permite determinar que el paciente tiene una PAS aproximada de

Seleccione una:

- ☐ a. 80 mmHg
- ☐ b. 90 mmHg
- ☐ c. 60 mmHg
- ☒ d. 70 mmHg ✓

La respuesta correcta es: 70 mmHg

Pregunta 7

Incorrecta

Puntúa 0,00
sobre 1,00

La regla nemotécnica para valorar la consciencia de un accidentado se conoce como

Seleccione una:

- ☐ a. Ninguna es correcta
- ☒ b. VOS ✗
- ☐ c. OPUMA
- ☐ d. AVDN

La respuesta correcta es: AVDN

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Respecto a las ventilaciones en la RCPb, señala la afirmación correcta

Seleccione una:

- ☒ a. Todas son correctas ✓
- ☐ b. La no elevación del tórax durante la insuflación puede relacionarse a una apertura de la vía aérea incorrecta
- ☐ c. Se administrará el volumen necesario que permita la elevación del tórax
- ☐ d. La duración de la insuflación es de alrededor 1 segundo

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Señala la afirmación incorrecta en relación a la RCP

Seleccione una:

- ☐ a. Los tiempos de compresión y expansión torácicas deberían ser aproximadamente iguales
- ☒ b. La equivalencia entre la RCP sólo con compresiones torácicas y la RCP estándar, es suficiente para cambiar la práctica actual. ✓
- ☐ c. La RCP realizada a un paciente que respira puede provocarle daños irreversibles
- ☐ d. Se hace hincapié en minimizar las interrupciones en las compresiones

La respuesta correcta es: La equivalencia entre la RCP sólo con compresiones torácicas y la RCP estándar, es suficiente para cambiar la práctica actual.

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Señala la afirmación incorrecta en relación al patrón respiratorio de Cheyne Stokes

Seleccione una:

- ☐ a. Se producen apneas de segundos de duración hasta repetir el ciclo
- ☐ b. Presenta periodos de respiración lenta que crecen de amplitud progresivamente
- ☒ c. Presente en pacientes con acidosis metabólica ✓
- ☐ d. Se conoce como respiración en escalera

La respuesta correcta es: Presente en pacientes con acidosis metabólica