

PREGUNTA 1

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

 Marcar pregunta

Se considera una máxima en la canalización de catéter venoso periférico (CVP), señale la respuesta correcta:

Seleccione una:

- a. Siempre canalizar el CVP de mayor calibre posible. **✘**
- b. Siempre canalizar el CVP de menor calibre posible.
- c. Siempre canalizar una vía central.
- d. Utilizar el menor acceso venoso para la terapia intravenosa que precise el paciente.

La respuesta correcta es: Utilizar el menor acceso venoso para la terapia intravenosa que precise el paciente.

PREGUNTA 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

 Marcar pregunta

¿Cuál de las situaciones siguientes favorecen la infección de los reservorios subcutáneos?

Seleccione una:

- a. Alteración de las defensas de los pacientes.
- b. Técnica poco aséptica.
- c. Infusión de nutrición parenteral.
- d. Todos los anteriores. **✔**

La respuesta correcta es: Todos los anteriores.

PREGUNTA 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

 Marcar pregunta

¿Cuáles son los síntomas de una trombosis de catéter?

Seleccione una:

- a. Dificultad para infundir líquidos.
- b. Dificultad para extraer sangre.
- c. A y B son correctas. **✔**
- d. A y B son falsas.

La respuesta correcta es: A y B son correctas.

PREGUNTA 4

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

 Marcar pregunta

¿En qué se diferencian los catéteres tunelizados de los reservorios subcutáneos?

Seleccione una:

- a. Los tunelizados tienen un acceso central, pero inserción periférica y los subcutáneos son centrales.
- b. Los tunelizados tienen recorrido subcutáneo y los subcutáneos tienen un reservorio en tejido subcutáneo.
- c. Los tunelizados son siempre de una luz y los subcutáneos tienen siempre dos luces.
- d. Todas las respuestas son correctas. **✘**

La respuesta correcta es: Los tunelizados tienen recorrido subcutáneo y los subcutáneos tienen un reservorio en tejido subcutáneo.

PREGUNTA 5

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

 Marcar pregunta

¿Cuándo se puede retirar el punto de sujeción del catéter tunelizado?

Seleccione una:

- a. A los 21 días tras la inserción.
- b. Cuando el paciente esté sin inmunosupresión. **✘**
- c. Cuando el dacrón esté formado y fije el catéter.
- d. No se retira en ningún caso.

La respuesta correcta es: Cuando el dacrón esté formado y fije el catéter.

PREGUNTA 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

 Marcar pregunta

¿Qué luz del catéter tunelizado tipo Hickman® usaremos preferentemente para extracción sanguínea?

Seleccione una:

- a. La luz blanca.
- b. La luz roja. **✔**
- c. Cualquiera de las anteriores.
- d. Ninguna de las anteriores, canalizaremos un CVP.

La respuesta correcta es: La luz roja.

PREGUNTA 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

 Marcar pregunta

¿En cuál de las siguientes ocasiones está indicado insertar un catéter tunelizado en los pacientes oncológicos?

Seleccione una:

- a. Cuando esté previsto trasplante de médula ósea.

PREGUNTA 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

▼ Marcar pregunta

¿en cuál de las siguientes ocasiones está indicado insertar un catéter tunelizado en los pacientes oncológicos?

Seleccione una:

- a. Cuando esté previsto trasplante de médula ósea.
- b. Para administración de quimioterapia.
- c. Cuando son precisas múltiples extracciones sanguíneas.
- d. En todas las situaciones anteriores. ✓

La respuesta correcta es: En todas las situaciones anteriores.

PREGUNTA 8

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

▼ Marcar pregunta

Para la infusión de medicación en bolos en los catéteres centrales son necesarias jeringas de 10cc siempre. ¿Cuál es la razón?

Seleccione una:

- a. Para que llegue hasta el torrente sanguíneo. ✗
- b. Para evitar sobrepresión.
- c. Se puede usar cualquier jeringa.
- d. Con estos catéteres no se puede poner medicación en bolo.

La respuesta correcta es: Para evitar sobrepresión.

PREGUNTA 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

▼ Marcar pregunta

¿Cuál de los siguientes son cuidados que debemos enseñar a los pacientes que porten catéter tunelizado?

Seleccione una:

- a. Evitar tirones.
- b. Mientras esté canalizado, no se pueden duchar.
- c. Lavar una vez al día con agua y jabón y secar al aire.
- d. Las respuestas A y C son correctas. ✓

La respuesta correcta es: Las respuestas A y C son correctas.

PREGUNTA 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

▼ Marcar pregunta

¿Qué se debe hacer si nos percatamos de que el dacrón se ha salido de la piel?

Seleccione una:

- a. Lo reintroduciremos porque debe sujetarse siempre con este dispositivo.
- b. Lo fijaremos a la piel con punto de sutura o steri-strip. ✓
- c. Retiraremos el catéter.
- d. El dacrón no se sale nunca.

La respuesta correcta es: Lo fijaremos a la piel con punto de sutura o steri-strip.

PREGUNTA 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

▼ Marcar pregunta

¿Cuál de las siguientes vías se pueden canalizar por las enfermeras?

Seleccione una:

- a. Catéter venoso periférico.
- b. Catéter tunelizado.
- c. Catéter venoso central de inserción periférica.
- d. A y C son correctas. ✓

La respuesta correcta es: A y C son correctas.

PREGUNTA 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

▼ Marcar pregunta

¿Cuál de los siguientes se considera acceso central?

Seleccione una:

- a. Catéter venoso central de acceso periférico (PICC).
- b. Catéter de Hickmann.
- c. Reservorio subcutáneo totalmente implantable.
- d. Todos los anteriores. ✓

La respuesta correcta es: Todos los anteriores.

PREGUNTA 13

PREGUNTA 13

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

 Marcar pregunta

¿Cuál de las siguientes NO son zonas habituales de inserción para el PICC?

Seleccione una:

- a. Vena subclavia.
- b. Vena cefálica. 
- c. Vena basílica.
- d. Vena antecubital.

La respuesta correcta es: Vena subclavia.

PREGUNTA 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

 Marcar pregunta

¿Cuál es la vía de elección para pacientes oncológicos en estado terminal?

Seleccione una:

- a. Vía subcutánea. 
- b. Vía intravenosa periférica.
- c. Catéter tunelizado.
- d. Reservorio subcutáneo.

La respuesta correcta es: Vía subcutánea.

PREGUNTA 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

 Marcar pregunta

¿Cuál de las siguientes son indicaciones de inserción de catéter subcutáneo en paciente terminal?

Seleccione una:

- a. Disfagia.
- b. Control del dolor sin acceso venoso.
- c. Manejo sintomático domiciliario.
- d. Todas las anteriores son indicaciones. 

La respuesta correcta es: Todas las anteriores son indicaciones.

PREGUNTA 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

 Marcar pregunta

¿De cuál de las siguientes maneras se puede administrar medicación por vía subcutánea?

Seleccione una:

- a. En bolos.
- b. En perfusión continua.
- c. A y B son falsas.
- d. A y B son verdaderas. 

La respuesta correcta es: A y B son verdaderas.

PREGUNTA 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

 Marcar pregunta

¿Qué dispositivo usamos para el control de síntomas en domicilio?

Seleccione una:

- a. Bomba de jeringa.
- b. Bomba volumétrica.
- c. Elastómero. 
- d. En domicilio no se pueden usar dispositivos.

La respuesta correcta es: Elastómero.

PREGUNTA 18

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

 Marcar pregunta

¿A partir de qué valor en la escala de Maddox debemos retirar un catéter?

Seleccione una:

- a. A partir del 4, estado avanzado de flebitis.
- b. A partir del 2, inicio de flebitis. 
- c. A partir del 1, posible inicio de flebitis.
- d. Siempre a las 72 horas de canalización.

La respuesta correcta es: A partir del 1, posible inicio de flebitis.

PREGUNTA 19

PREGUNTA 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

 Marcar pregunta

¿Cuál es el mejor antiséptico para canalizar un CVP?

Seleccione una:

- a. Povidona yodada.
- b. Clorhexidina. ✓
- c. Alcohol del 70°.
- d. Peróxido de hidrógeno.

La respuesta correcta es: Clorhexidina.

PREGUNTA 20

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

 Marcar pregunta

¿Qué tipo de catéter es el de elección cuando vamos a tener un tratamiento de más de 6 días de duración y con una osmolaridad de más de 500 mOsm/l?

Seleccione una:

- a. Catéter venoso periférico. ✗
- b. Catéter venoso central de inserción periférica.
- c. Reservorio subcutáneo.
- d. B y C son ciertas.

La respuesta correcta es: B y C son ciertas.

PREGUNTA 21

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

 Marcar pregunta

¿Cuándo se comenzó a utilizar el reservorio totalmente implantable, Port-a-Cath®?

Seleccione una:

- a. Se usa desde el siglo XVII.
- b. Desde principios del siglo XX. ✗
- c. En 1982, y lo inventó Neiderhuber.
- d. Es invento de Hickman en los años 70.

La respuesta correcta es: En 1982, y lo inventó Neiderhuber.

PREGUNTA 22

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

 Marcar pregunta

¿En cuál de las partes del reservorio subcutáneo pincharemos la aguja para la infusión y la extracción?

Seleccione una:

- a. Membrana o septum. ✓
- b. Portal o cámara.
- c. Conexión.
- d. La aguja está previamente insertada.

La respuesta correcta es: Membrana o septum.

PREGUNTA 23

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

 Marcar pregunta

¿Qué indican los colores de los catéteres venosos periférico?

Seleccione una:

- a. Cumplen una norma ISO de correspondencia entre calibre y color. ✓
- b. Sigue el criterio establecido por cada casa comercial.
- c. Depende únicamente de las modas actuales.
- d. Todas son falsas.

La respuesta correcta es: Cumplen una norma ISO de correspondencia entre calibre y color.

PREGUNTA 24

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

 Marcar pregunta

¿Cuál es el acceso para un reservorio subcutáneo más habitual?

Seleccione una:

- a. Abdominal.
- b. Femoral.
- c. Torácica. ✓
- d. Cualquiera de las anteriores son habituales.

La respuesta correcta es: Torácica.

PREGUNTA 25

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

 Marcar pregunta

PREGUNTA 25

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

 Marcar pregunta

En un enfermo oncológico que va a recibir ciclo de quimioterapia por vía periférica, ¿qué recomendaciones seguiremos?

Seleccione una:

- a. Evitar venas de los miembros inferiores, zonas de flebitis, hematomas o edemas previos.
- b. No utilizar una vía ya existente, ya que el riesgo de extravasación es mayor.
- c. Evitar usar venas principales.
- d. Todas las respuestas anteriores son correctas. 

La respuesta correcta es: Todas las respuestas anteriores son correctas.

PREGUNTA 26

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

 Marcar pregunta

¿Cuál es la complicación más importante que se puede dar en los pacientes oncológicos con terapia intravenosa?

Seleccione una:

- a. Flebitis.
- b. Extravasación de citostático. 
- c. Extravasación de analgesia.
- d. Pérdida accidental del catéter.

La respuesta correcta es: Extravasación de citostático.

PREGUNTA 27

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

 Marcar pregunta

¿Cómo se clasifican los citostáticos en función de su capacidad de irritación?

Seleccione una:

- a. Vesicantes y no irritantes.
- b. Irritantes y no vesicantes.
- c. Vesicantes.
- d. La respuesta B y C son correctas. 

La respuesta correcta es: La respuesta B y C son correctas.

PREGUNTA 28

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

 Marcar pregunta

¿Qué acción no debemos realizar NUNCA en caso de extravasación de citostático?

Seleccione una:

- a. Continuar la infusión hasta que termine, la importancia del tratamiento es mayor que el riesgo de la extravasación. 
- b. Retirar el sistema, pero no el CVP.
- c. Extraer de 5 a 10 cc de líquido y pinchar las ampollas si las hubiera.
- d. Mantener el miembro elevado.

La respuesta correcta es: Continuar la infusión hasta que termine, la importancia del tratamiento es mayor que el riesgo de la extravasación.

PREGUNTA 29

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

 Marcar pregunta

De los siguientes accesos centrales, ¿cuál se considera subcutáneo totalmente implantable?

Seleccione una:

- a. Catéter Broviac®.
- b. Catéter Hickman®.
- c. Porth-a-Cath®. 
- d. Todos los anteriores.

La respuesta correcta es: Porth-a-Cath®.

PREGUNTA 30

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

 Marcar pregunta

¿Cuál de las siguientes recomendaciones son indispensables en el cuidado de los reservorios subcutáneos?

Seleccione una:

- a. Lavado de manos antes de cada manipulación.
- b. Desinfección de los tapones previo a cada manipulación.
- c. Cambio del apósito transparente cada 7 días y siempre que sea necesario.
- d. Todas las anteriores.

La respuesta correcta es: Todas las anteriores.