

# Curso online en Dolor Crónico – Generalidades y Tratamientos

ciación: Pendiente. Acreditación de actividad solicitada a SEAFORMEC | Dirigido a: Médicos, enfermería y enfermería

 ... Quiero acceder al curso 

Dirigido a:

- Médicos: Anestesiólogos, traumatólogos, reumatólogos, rehabilitadores, oncólogos, atención primaria y otros especialistas médicos interesados en el tratamiento del dolor
- Enfermería y Auxiliar de enfermería



Se puntúa 0,00 sobre 1,00

➤ Marcar pregunta

¿Cuál de las siguientes características no es propia de los nociceptores?

- ☐ a. Distinguen entre estímulos nocivos e inocuos
- ☐ b. Tienen capacidad para liberar neurotransmisores
- ☒ c. Tienden a sensibilizarse ante un estímulo repetitivo
- ☐ d. Tienen actividad espontánea en ausencia de estímulo



Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Tienen actividad espontánea en ausencia de estímulo



Pregunta 2





Pregunta 2

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

¿Cuáles son los canales iónicos más implicados en la transducción nociceptiva?


- ☐ a. Canales iónicos receptores de potencial transitorio
- ☐ b. Detectores de ácido
- ☒ c. Canales de calcio dependientes de voltaje ✗
- ☐ d. Canales de sodio dependientes de voltaje

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Canales de sodio dependientes de voltaje



¿Cuál es el principal neurotransmisor excitatorio del sistema nociceptivo?

- ☐ a. Serotonina
- ☐ b. Noradrenalina
- ☒ c. Glutamato 
- ☐ d. Ácido gamma-amino butírico (GABA)

Respuesta correcta






Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

## Respecto a las vías moduladoras descendentes:

- ☐ a. Actúan fundamentalmente a nivel del asta dorsal de la médula espinal
- ☐ b. Pueden inhibir la transmisión de la información nociceptiva
- ☐ c. Pueden facilitar la transmisión de la información nociceptiva
- ☒ d. Todas las anteriores son ciertas 

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Todas las anteriores son ciertas






Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Respecto a la sensibilización central, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?

- ☐ a. Tienen lugar cambios funcionales en las neuronas espinales que se vuelven más excitables
- ☐ b. Hay una disminución de la modulación inhibitoria
- ☐ c. Los canales iónicos N-metil-D-aspartato (NMDA) son los más implicados
- ☒ d. Es un proceso irreversible 

Respuesta correcta



La respuesta correcta es: Es un proceso irreversible




## Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

¿Cuál de estas afirmaciones no es la correcta?

- ☐ a. Debemos definir las visitas a la unidad del dolor en función de las prioridades médicas
- ☒ b. El dolor crónico es el que perdura más de un mes 
- ☐ c. El dolor nociceptivo es el más común en la población general
- ☐ d. Las clínicas del dolor deben tener sus procedimientos codificados



Respuesta correcta

La respuesta correcta es: El dolor crónico es el que perdura más de un mes



perdura más de un mes

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Referente al dolor crónico  
primario:

- ☐ a. Es una nomenclatura que ya no se utiliza
- ☐ b. Es el que define el dolor crónico neuropático
- ☒ c. Engloba cuadros de dolor de etiología desconocida
- ☐ d. Es el primer dolor descrito por el paciente



Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Engloba cuadros de dolor de etiología desconocida






## Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

¿Cómo definiríamos una clínica del dolor de un hospital de tercer nivel?

- ☐ a. Un centro de investigación en dolor agudo y crónico
- ☒ b. Un centro donde se realice una atención integral especializada desde un abordaje biopsicosocial del paciente que presenta dolor 
- ☐ c. Un centro de dolor agudo postoperatorio
- ☐ d. Un centro sanitario de bloqueos para tratar el dolor



Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Un centro donde se realice una atención integral especializada desde un abordaje



una atención integral especializada desde un abordaje biopsicosocial del paciente que presenta dolor



### Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

De los objetivos que debe tener una clínica del dolor, ¿cuál no es correcto?

- ☐ a. La priorización de las visitas y procedimientos, con listas de espera adecuadas
- ☒ b. Realizar tantos procedimientos invasivos como sea posible 
- ☐ c. El enfoque de su asistencia debe estar siempre centrada en el paciente
- ☐ d. El proceso asistencial debe realizarse mediante una serie de flujos de trabajo de calidad que contribuyan a obtener el mejor resultado de forma eficiente 



## Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Para una asistencia basada en la buena práctica clínica, es necesario:

- ☐ a. La implicación de los profesionales no es estrictamente necesaria
- ☐ b. Los indicadores pueden realizarse cada dos años
- ☐ c. Disponer de una larga lista de espera
- ☒ d. Disponer de un sistema de evaluación continuada



Respuesta correcta



La respuesta correcta es: Disponer de un sistema de evaluación continuada



Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Disponer de un sistema de evaluación continuada

### Pregunta 11

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

¿Qué tipo de dolor tiene una función adaptativa?

- ☒ a. Dolor agudo
- ☐ b. Dolor crónico
- ☐ c. A y B son correctas
- ☐ d. Ninguna es correcta



Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Dolor agudo





Pregunta **12**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

¿Qué tiene siempre más relevancia en el dolor crónico a nivel psicológico?

- ☒ a. Ninguna es correcta
- ☐ b. Las emociones
- ☐ c. Las conductas
- ☐ d. Las cogniciones



Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Ninguna es correcta







### Pregunta 13

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

El tratamiento psicológico del dolor crónico:

- ☐ a. Se realiza utilizando protocolos concretos para cada tipo de dolor
- ☐ b. Se realiza de forma estandarizada
- ☒ c. Se realiza de forma personalizada
- ☐ d. Ninguna de las anteriores



Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Se realiza de forma personalizada





## Pregunta 14

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

El cuestionario de vicisitudes sociales (VS) puede ser útil para evaluar:

- ☒ a. La satisfacción
- ☐ b. La calidad de vida
- ☐ c. El estado de ánimo
- ☐ d. El grado de vida social



Respuesta correcta

La respuesta correcta es: La satisfacción





## Pregunta 15

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Según la propuesta presentada de psicoterapia cognitivo-conductual de grupo basada en el tratamiento psicológico desarrollado por Philips en el *Shaughnessy Hospital* de Vancouver (Canadá), ¿cuál de estos números sería el más adecuado para formar un grupo terapéutico?

- ☐ a. 4 personas
- ☒ b. 6 personas
- ☐ c. 8 personas
- ☐ d. 10 personas





cognitivo-conductual de grupo basada en el tratamiento psicológico desarrollado por Philips en el *Shaughnessy Hospital* de Vancouver (Canadá), ¿cuál de estos números sería el más adecuado para formar un grupo terapéutico?

- ☐ a. 4 personas
- ☒ b. 6 personas
- ☐ c. 8 personas
- ☐ d. 10 personas



Respuesta correcta

La respuesta correcta es: 6 personas



Pregunta **16**



## Pregunta 16

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa en relación con los antiinflamatorios no esteroideos (AINE)?

- ☐ a. La respuesta clínica de los AINE es muy variable de un individuo a otro
- ☐ b. Ningún AINE ha demostrado ser más eficaz que otro
- ☐ c. Se han descrito dos isoenzimas de la enzima ciclooxygenasa (COX)
- ☒ d. La activación de la COX por parte de los AINE es responsable de sus efectos adversos ✓



Respuesta correcta





### Pregunta 17

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

¿Cuál de estas respuestas es verdadera sobre los efectos indeseables de los antiinflamatorios no esteroideos (AINE)?


- ☐ a. Usar con precaución en pacientes con un filtrado glomerular  $< 30 \text{ ml/min/1,73 m}^2$
- ☐ b. El uso de dos o más AINE de forma simultánea incrementa la eficacia analgésica
- ☒ c. Los AINE con menor riesgo cardiovascular son el ibuprofeno y el naproxeno
- ☐ d. Los inhibidores de la ciclooxigenasa 2 (COXIB) tienen menor riesgo cardiovascular que los AINE





🚩 Marcar pregunta

Sobre el mecanismo de acción de los opioides, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?

- ☐ a. Los efectos analgésicos de los opioides se deben a la activación del sistema opioide endógeno
- ☐ b. Los receptores opioides están ampliamente distribuidos tanto en el sistema nervioso central como en el periférico
- ☐ c. Todos ellos son receptores de membrana acoplados a la proteína Gi/o (inhibidoras)
- ☒ d. La inhibición de la adenilciclase  provoca la apertura de los canales de calcio por la neurona presináptica y el cierre de los canales de potasio en la postsináptica, lo que resulta en una disminución de la excitabilidad



Respuesta correcta




## Pregunta 19

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?

- ☐ a. El efecto secundario más frecuente de los opioides es la depresión respiratoria
- ☒ b. La acción dual del tramadol y el tapentadol les confiere capacidad analgésica para el dolor nociceptivo y neuropático 
- ☐ c. Los antagonistas opioides no tienen afinidad por los receptores, pero sí actividad intrínseca
- ☐ d. La morfina, tras ser metabolizada por el hígado, produce el glucorónido-6-morfina, que no tienen capacidad analgésica



Respuesta correcta



🚩 Marcar pregunta

Sobre el buen uso de opioides, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?

- ☐ a. Para las dosis de rescate podemos utilizar opioides de liberación ultrarrápida o prolongada
- ☒ b. Las dosis iniciales basales no deben superar los 40 mg DEM diarios ✓
- ☐ c. Pacientes con fibromialgia, que no responden a ningún tratamiento, podrían ser candidatos para iniciar tratamiento con opioides
- ☐ d. Cuando se constata que un paciente es respondedor en la visita de control al mes, se pueden seguir manteniendo las mismas dosis y hacer visitas de seguimiento cada seis meses



Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Las dosis iniciales basales no





## Pregunta 21

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

En lo referente a los  
coadyuvantes, es cierto que:

- ☐ a. Su indicación en el tratamiento del dolor es aliviar el dolor visceral
- ☐ b. Es aconsejable superar los 3.600 mg de gabapentina y los 600 mg de pregabalina al día en el tratamiento del dolor
- ☐ c. La amitriptilina tiene un ligero efecto sobre la inhibición de la recaptación de dopamina
- ☒ d. La amitriptilina es de primera elección en el tratamiento del dolor neuropático 
- ☐ e. El topiramato y la lamotrigina son los anticonvulsivantes más utilizados 

Respuesta correcta





🚩 Marcar pregunta

## Señale la aseveración cierta:

- ☐ a. La ketamina no tiene efectos secundarios
- ☐ b. El baclofeno es un agonista del ácido gamma-aminobutírico cuya principal indicación es su uso en el dolor neuropático
- ☒ c. Los anticonvulsivantes más utilizados en el tratamiento del dolor son la gabapentina y la pregabalina, y disponen de indicación autorizada para el tratamiento del dolor neuropático central y periférico ✓
- ☐ d. La betametasona y la triamcinolona, corticosteroides en forma depot de suspensión, están aprobados por la European Medicines Agency (EMA) y la Food and Drug Administration (FDA) para su uso epidural
- ☐ e. Se recomienda el uso de la triamcinolona como corticosteroide nivel epidural





## Pregunta 23

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

### En el tratamiento tópico del dolor:

- ☐ a. Si un paciente no responde a un parche de lidocaína durante un mes de tratamiento, hemos de seguir prescribiéndolo al menos durante tres meses
- ☐ b. Se puede prescribir apósitos de lidocaína a todos los pacientes que sufren de dolor neuropático localizado
- ☐ c. Según la evidencia científica, los antiinflamatorios no esteroideos (AINE) tópicos generan una calidad analgésica superior a la que generan los AINE orales
- ☒ d. Los pacientes con dolor neuropático localizado o con múltiples comorbilidades se ven beneficiados de los tratamientos tópicos del dolor
- ☐ e. En la actualidad, el uso de la crema Emla® ha dejado de lado la utilización







Pregunta **24**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Señale la respuesta que no es cierta:



- ☐ a. Los tratamientos tópicos para el dolor ofrecen comodidad a los pacientes que están politratados
- ☒ b. El tratamiento con apósitos de lidocaína al 5% consiste en su aplicación las horas diarias que sean necesarias 
- ☐ c. La indicación de los apósitos de lidocaína al 5% es en adultos con neuralgia postherpética que sufren de dolor neuropático localizado, asociado a una infección por herpes zóster
- ☐ d. En el 2018 entró en España un visado para la dispensación del apósito de lidocaína a cargo del Sistema Nacional de Salud 
- ☐ e. El apósito de lidocaína actúa sobre los nociceptores cutáneos hiperactivos y



Se puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

## La capsaicina:



- ☐ a. La capsaicina en parche se autoadministra por el propio paciente cada tres meses
- ☒ b. La capsaicina 179 mg actúa inactivando los canales del sodio, con la consecuente disfunción de las fibras C nociceptivas a nivel intracelular (mitocondrias y retículo endoplasmático) 
- ☐ c. En el algoritmo de tratamiento del dolor neuropático periférico, si la respuesta al tratamiento es parcial, con una disminución  $< 30\%$  del área dolorosa o de la intensidad del dolor, se aconseja continuar con el tratamiento un mes más
- ☐ d. Es un derivado del pimiento verde y su formulación en crema se comercializó para el uso del tratamiento de quemaduras 
- ☐ e. La capsaicina en crema, así como el parche de capsaicina, se aplican cada 12 semanas



Se puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Acude a consulta de enfermería de la unidad del dolor un paciente para realizar estimulación eléctrica transcutánea (TENS) en la unidad. Durante la entrevista la paciente explica estar muy contenta porque se acaba de enterar que está embarazada de cuatro semanas. Señala la correcta:

- ☒ a. No es posible realizar dicho tratamiento, derivaremos a su doctora de referencia para valorar otro tratamiento 
- ☐ b. Realizaremos formación referente a cómo aplicar los electrodos y duración del tratamiento 
- ☐ c. Explicaremos que puede realizar TENS






## Pregunta 27

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Referente a la iontoforesis.  
Señala la respuesta correcta:

- ☐ a. Las dosis conseguidas a nivel local son superiores a las de la administración sistémica y las de una pomada
- ☐ b. Consiste en la capacidad de introducir iones fisiológicamente activos a través de la epidermis facilitados por una corriente o carga eléctrica
- ☒ c. Todas son correctas 
- ☐ d. Está contraindicado en pacientes portadores de marcapasos y neuroestimuladores



Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Todas son correctas



## Pregunta 28

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



🚩 Marcar pregunta

Referente al tratamiento mediante la aplicación de parche de capsaicina, señala la respuesta correcta:

- ☐ a. Ninguna respuesta es correcta
- ☐ b. Una vez colocado el parche de capsaicina en la unidad del dolor, el paciente marcha al domicilio con él puesto y se autoretira a las 24 horas; tendremos que explicar las precauciones que seguir al retirar al parche
- ☒ c. La aplicación del parche de capsaicina se realiza por profesionales y en centros hospitalarios. Requiere realizar el mapeado de la zona de alodinia, recortar el parche en la zona del mapeado y se dejar actuar durante 30 minutos en el pie y 60 minutos en



Un paciente que inicia en nuestra unidad un tratamiento de iontoforesis con dexametasona. Al iniciarlo colocamos la dexametasona y programamos la intensidad a 4 mA y el tiempo de 20 minutos. El paciente refiere que le hace daño:

- ☐ a. Le bajamos la intensidad a 1 mA para valorar si lo tolera mejor
- ☒ b. Le bajamos la intensidad a 1 mA y  aumentamos el tiempo a 80 minutos, probando poco a poco si tolera más intensidad y ajustando el tiempo
- ☐ c. Retiramos el tratamiento y buscamos otras opciones terapéuticas, ya que es un efecto secundario del tratamiento
- ☐ d. Le decimos que aguante 20 minutos  posteriormente evaluamos la piel para ver si ha hecho alguna reacción

Paciente de 65 años programada para realizar técnica intervencionista (infiltración nervio supraescapular). Enfermería realiza acogida del paciente en la unidad y valoración inicial (*checklist*). Al finalizar el procedimiento el paciente comenta que ese hombro no es el que le molestaba. Señala la respuesta correcta:

- ☐ a. El *checklist* no es útil para detectar la lateralidad de la infiltración
- ☐ b. No es necesario realizar el *checklist* durante la infiltración, ya que se realizó durante la acogida al paciente
- ☒ c. El *checklist* tiene tres partes que corresponden a todo el equipo: antes de la infiltración, durante la infiltración y al finalizarla
- ☐ d. El *checklist* que se realiza durante la infiltración corresponde al médico que





Pregunta **31**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Diga la respuesta correcta en relación con la inervación de la columna vertebral (vértebras y ligamentos):

- ☐ a. La columna recibe inervación de las tres ramas del nervio raquídeo
- ☒ b. La columna recibe inervación del nervio de Luschka y del ramo posterior del nervio raquídeo ✓
- ☐ c. La columna recibe inervación del plexo lumbosacro
- ☐ d. La columna recibe inervación del nervio ciático



Respuesta correcta

La respuesta correcta es: La columna recibe inervación






### Pregunta 32

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

La etiología más prevalente del dolor lumbar es:

- ☐ a. Patología tumoral
- ☒ b. Patología mecánico-degenerativa 
- ☐ c. Patología infecciosa
- ☐ d. Fractura vertebral

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Patología mecánico-degenerativa




### Pregunta 33

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes afirmaciones tiene más valor para la orientación diagnóstica de una lumbociatalgia?

- ☐ a. El déficit neurológico en la extremidad inferior afectada
- ☐ b. La información de la resonancia magnética
- ☒ c. La correlación entre la clínica (historia + exploración) y las imágenes 
- ☐ d. La descripción que el paciente hace de su dolor

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: La correlación entre la clínica (historia + exploración) y las imágenes





Pregunta **34**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Para orientar una técnica intervencionista en el dolor lumbar, ¿qué dato tiene más interés?

- ☒ a. Diferenciar si el dolor es de tipo radicular neuropático o es un dolor mecánico localizado o referido
- ☐ b. Es suficiente con la información del médico que lo deriva a la unidad del dolor
- ☐ c. Tener un estudio radiológico y de resonancia magnética
- ☐ d. Si el dolor lumbar es importante, siempre indicaremos una infiltración epidural





### Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Diferenciar si el dolor es de tipo radicular neuropático o es un dolor mecánico localizado o referido



### Pregunta 35

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Ante las siguientes afirmaciones, elige la mejor respuesta:

- ☐ a. La infiltración epidural estará indicada en el dolor ciático que llega a los dedos del pie con distribución metamérica
- ☒ b. Las tres indicaciones son ciertas 
- ☐ c. La infiltración facetaria está indicada en el caso de dolor lumbar mecánico 
- ☐ d. La cirugía debe plantearse en casos de dolor intenso acompañado de déficit sensitivo y motor




Pregunta 30

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Según la definición de dolor neuropático más reciente, señale el enunciado correcto:

- ☐ a. Dolor iniciado o causado por una lesión primaria o disfunción del sistema nervioso
- ☐ b. Dolor generado en el sistema nervioso central
- ☐ c. Dolor generado en el sistema nervioso periférico
- ☒ d. Dolor debido a una consecuencia directa de una lesión primaria o enfermedad que afecta al sistema somatosensorial 
- ☐ e. Todas son incorrectas



Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Dolor debido a una





marcar pregunta

Respecto a la etiología del dolor neuropático, señale la correcta:

- ☐ a. La etiología puede ser de origen metabólico o tóxico-medicamentoso; nunca son enfermedades hereditarias
- ☐ b. Todas son incorrectas
- ☐ c. La etiología puede ser de origen metabólico, tóxico-medicamentoso, hereditario, infeccioso o relacionado con proceso oncológico o quirúrgico
- ☐ d. La etiología puede ser de origen metabólico, siempre son enfermedades hereditarias y rara vez infecciosas
- ☒ e. La etiología puede ser de origen metabólico, siempre relacionada con un proceso oncológico o quirúrgico ✗

Respuesta incorrecta.



La respuesta correcta es: La etiología puede ser de origen metabólico, tóxico-medicamentoso, hereditario, infeccioso o relacionado con proceso oncológico o



Correcta.

- ☐ a. La etiología puede ser de origen metabólico o tóxico-medicamentoso; nunca son enfermedades hereditarias
- ☐ b. Todas son incorrectas
- ☐ c. La etiología puede ser de origen metabólico, tóxico-medicamentoso, hereditario, infeccioso o relacionado con proceso oncológico o quirúrgico
- ☐ d. La etiología puede ser de origen metabólico, siempre son enfermedades hereditarias y rara vez infecciosas
- ☒ e. La etiología puede ser de origen metabólico, siempre relacionada con un proceso oncológico o quirúrgico ✗

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: La etiología puede ser de origen metabólico, tóxico-medicamentoso, hereditario, infeccioso o relacionado con proceso oncológico o quirúrgico



Pregunta **38**

Correcta




Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Varios mecanismos contribuyen en la aparición del dolor, conocidos como neurosensibilización. Respecto al fenómeno de sprouting señale la correcta:

- ☐ a. Se refiere a la arborización de fibras  $A\beta$ , por consecuencia, con estímulos de bajo umbral no necesariamente nociceptivos son activadas
- ☐ b. Se refiere a la arborización de fibras  $A\beta$ , por consecuencia, con estímulos de bajo umbral necesariamente nociceptivos son activadas
- ☒ c. Es uno de los mecanismos que más influye en la aparición de alodinia 
- ☐ d. Solo a y c son correctas
- ☐ e. Todas son incorrectas





## Pregunta 39


Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Para llegar a un correcto diagnóstico son necesarios elementos de anamnesis. Sobre la exploración física, qué síntomas de los siguientes no se consideran positivos:

- ☐ a. Dolor lancinante como electricidad
- ☒ b. Hipoestesia en un área de dermatoma ✓
- ☐ c. Disestesia como hormigueo
- ☐ d. Alodinia al roce
- ☐ e. Todas son correctas



Respuesta correcta

La respuesta correcta es la b. Hipoestesia en un área de dermatoma



La respuesta correcta es: Hipoestesia en un área de dermatoma

Pregunta **40**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Sobre los tratamientos orales para el dolor neuropático, mencione el número necesario que tratar (NNT) promedio de la gabapentina

- ☐ a. 3,6
- ☒ b. 7,2
- ☐ c. 6,4
- ☐ d. 1,9



Respuesta correcta





La respuesta correcta es: 7,2

Pregunta **41**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

La interrupción de la transmisión mediante bloqueos se puede dar en todos excepto:

- ☐ a. S.N. Simpático
- ☐ b. S.N. Periférico
- ☐ c. S.N. Central (epidural o subaracnoideo)
- ☒ d. S.N. Central (intraventricular)




Respuesta correcta

La respuesta correcta es: S.N. Central (intraventricular)



Todos los requerimientos son necesarios excepto:

- ☒ a. Tener profundamente dormido al paciente durante la realización de la técnica 
- ☐ b. Conocer las técnicas y sus complicaciones
- ☐ c. Conocer los síndromes y los síntomas
- ☐ d. Informar adecuadamente al paciente y obtener su consentimiento firmado

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Tener profundamente dormido al paciente durante la realización de la técnica

Pregunta **43**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta






Pregunta **43**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Sobre los fármacos que se utilizan en los bloqueos, cuál de las siguientes afirmaciones es falsa:

- ☐ a. El fenol al 6 % es un neurolítico
- ☐ b. El corticoide depot (triamcinolona) se usa en los bloqueos periféricos
- ☒ c. El corticoide depot (trimacinolona)  está indicado en el bloqueo epidural
- ☐ d. La lidocaína al 1 % se utiliza en los bloqueos de corta duración

Respuesta correcta



La respuesta correcta es: El corticoide depot (trimacinolona) está indicado en el bloqueo epidural



Respuesta correcta

La respuesta correcta es: El corticoide depot (trimacinolona) está indicado en el bloqueo epidural

Pregunta **44**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Los bloqueos están indicados en diferentes patologías excepto:

- ☐ a. Radiculalgias
- ☐ b. Neuralgia postherpética
- ☒ c. Síndromes de centralización del dolor
- ☐ d. Cluster headache



Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Síndromes de centralización



La respuesta correcta es: Síndromes de centralización del dolor

### Pregunta 45

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

El bloqueo del plexo celíaco está indicado para:

- ☐ a. Dolor discogénico
- ☒ b. Dolor visceral de abdomen superior ✓
- ☐ c. Síndrome de dolor regional complejo de extremidades superiores
- ☐ d. Dolor musculoesquelético

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Dolor visceral de abdomen superior








Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

¿Cuál de las siguientes afirmaciones respecto de la radiofrecuencia térmica (RFC) es cierta?

- ☐ a. El campo eléctrico solo genera movimiento en los iones de los electrolitos
- ☐ b. El calentamiento ocurre a nivel del electrodo
- ☒ c. El campo eléctrico es el origen de todos los efectos de la radiofrecuencia, tanto de la térmica como de la pulsada 
- ☐ d. El efecto en la RFC solo se produce por el aumento de temperatura



Respuesta correcta

La respuesta correcta es: El campo eléctrico es el origen de todos los efectos de la radiofrecuencia, tanto



Pregunta **47**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

¿Cuál de estos factores afecta al tamaño de la lesión térmica?

- ☒ a. Todos los anteriores
- ☐ b. Tiempo de lesión
- ☐ c. Anchura del *tip*
- ☐ d. Temperatura seleccionada



Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Todos los anteriores



Pregunta **48**



## Pregunta 48

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Respecto de la  
radiofrecuencia térmica (RFC),  
¿cuál de las siguientes  
afirmaciones es falsa?

- ☐ a. Se producen ráfagas de temperatura entre 45-50 °C
- ☐ b. La intensidad del campo eléctrico es mayor en la punta del *tip* y en los límites del aislamiento del *tip*
- ☒ c. La amplitud E es proporcional al voltaje pico. El V es la unidad de dosis en la radiofrecuencia pulsada, el equivalente a la temperatura en la RFC ✗
- ☐ d. El tamaño del campo térmico es igual que en la RFC





- ☐ a. Se producen variaciones de temperatura entre 45-50 °C
- ☐ b. La intensidad del campo eléctrico es mayor en la punta del *tip* y en los límites del aislamiento del *tip*
- ☒ c. La amplitud E es proporcional al voltaje pico. El V es la unidad de dosis en la radiofrecuencia pulsada, el equivalente a la temperatura en la RFC ✗
- ☐ d. El tamaño del campo térmico es igual que en la RFC

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: El tamaño del campo térmico es igual que en la RFC

Pregunta **49**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta



En la radiofrecuencia bipolar,



Se puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

En la radiofrecuencia bipolar,  
¿cuál es falsa?

- ☐ a. Se produce la *strip lesion* en electrodos separados hasta 12 mm
- ☐ b. La RF bipolar entre cánulas paralelas produce que la lesión formada individualmente por cada cánula forme un único volumen de lesión que conecta los *tips* (lesión en tira, *strip lesion*)
- ☒ c. La distancia entre *tips* en la cual la radiofrecuencia (RF) bipolar generará una *strip lesion* no depende de las características del *tip* ✓
- ☐ d. A medida que el espacio entre electrodos es mayor, la lesión es más ancha pero menos larga y profunda

Respuesta correcta



La respuesta correcta es: La distancia entre *tips* en la cual la radiofrecuencia (RF) bipolar generará una *strip lesion* no depende de las características del *tip*





cuando la radiofrecuencia (RF) dipolar generara una *strip* lesion no depende de las características del *tip*

Finalizar revisión

## Navegación por el cuestionario

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	

Mostrar una página cada vez

Finalizar revisión



← Bibliografía

Ir a...

