

Cuidados de soporte para pacientes con tumores de cabeza y cuello - 8ª Edición

Comenzado el	sábado, 6 de marzo de 2021, 16:36
Estado	Finalizado
Finalizado en	sábado, 6 de marzo de 2021, 17:14
Tiempo empleado	38 minutos 12 segundos
Puntos	40,00/40,00
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Respecto a la toxicidad renal de la inmunoterapia. Señale la respuesta **falsa**

Seleccione una:

- a. Es una de las toxicidades más frecuentes
- b. Las toxicidades renales más reportadas han sido la insuficiencia renal y la hiponatremia
- c. Ante la presencia de una insuficiencia renal aguda en un paciente en tratamiento con inmunoterapia, siempre nos tenemos que plantear esta posibilidad, pero no debemos olvidar que debemos realizar el diagnóstico diferencial con otras entidades.
- d. En toxicidades severas, es recomendable la realización de una ecografía, y ,si procede, biopsia y una valoración por el nefrólogo

Retroalimentación

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Es una de las toxicidades más frecuentes

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿En qué caso estaría indicada la extracción de una pieza dental antes del inicio de la radioterapia?

Seleccione una:

- a. Presencia de placa bacteriana.
- b. Diagnóstico de liquen plano.
- c. Presencia de una pequeña caries oclusal en un molar.
- d. Molar con una lesión periapical extensa.

La respuesta es correcta.

Retroalimentación

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Molar con una lesión periapical extensa.

Pregunta **3**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de los siguientes no es un factor de riesgo de desarrollar toxicidad pulmonar de la inmunoterapia? Señale la respuesta **correcta**

Seleccione una:

- a. Neoplasia de pulmón
- b. Patología pulmonar previa
- c. Combinación de inhibidores de puntos de control inmune
- d. Sobreexpresión de PDL1

Retroalimentación

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Sobreexpresión de PDL1

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Son factores de riesgo para la aparición de toxicidad inmunomediada. Señale la respuesta **falsa**

Seleccione una:

- a. Los antecedentes familiares o personales de enfermedades autoinmunes
- b. Diferentes fármacos como los antiarrítmicos y los AINES
- c. Las infecciones por gérmenes oportunistas
- d. La infiltración inmune

Retroalimentación

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Diferentes fármacos como los antiarrítmicos y los AINES

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señala la afirmación que consideras **incorrecta**:

Seleccione una:

- a. La condronecrosis laríngea es una complicación grave que puede requerir una cirugía radical.
- b. Las lesiones de toxicidad aguda laríngeas no suelen responder a los esteroides.
La respuesta es correcta. Las lesiones de toxicidad aguda laríngeas sí suelen responder a los esteroides.
- c. La condronecrosis suele precisar tratamiento con antibióticos.
- d. La radiomucosistis aguda puede cursar con disfagia, disfonía y disnea.

Retroalimentación

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Las lesiones de toxicidad aguda laríngeas no suelen responder a los esteroides.

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de los siguientes no es un signo de alarma para la detección de una disfagia?

Seleccione una:

- a. Pérdida de peso.
- b. Disfonía.

La respuesta es correcta.

- c. Atragantamientos frecuentes y tos durante la deglución.
- d. Sensación de dificultad o dolor en la deglución.

Retroalimentación

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Disfonía.

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál es el rol de la enfermera clínica?

Seleccione una:

- a. Se encarga de la gestión del proceso asistencial.
- b. Es referente para el paciente/ familia.
- c. Tiene tres ámbitos de actuación: la gestión del proceso asistencial, la función organizativa del servicio y una función clínico asistencial.

La respuesta es correcta.

Retroalimentación

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Tiene tres ámbitos de actuación: la gestión del proceso asistencial, la función organizativa del servicio y una función clínico asistencial.

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Indica cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta respecto a la neurotoxicidad periférica por platinos:

Seleccione una:

a. La dosis total acumulada, la intensidad de dosis y los esquemas que combinan diferentes agentes neurotóxicos se consideran factores de riesgo asociados al desarrollo de neuropatía crónica por platinos.

b. La edad es el principal factor de riesgo de la neuropatía por platinos.

La respuesta es correcta. La edad no es el principal factor de riesgo de la neuropatía por platinos.

c. La neurotoxicidad aguda es característica del oxaliplatino.

d. La neurotoxicidad asociada a los platinos se debe principalmente en su acúmulo en el soma de la neurona sensitiva en el ganglio raquídeo posterior.

Retroalimentación

Respuesta correcta

Las respuestas correctas son: La edad es el principal factor de riesgo de la neuropatía por platinos., La neurotoxicidad asociada a los platinos se debe principalmente en su acúmulo en el soma de la neurona sensitiva en el ganglio raquídeo posterior.

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál es patología auditiva más frecuente inducida por la radioterapia?

Seleccione una:

- a. Otitis externa.
- b. Otitis media.

La respuesta es correcta.

- c. Hipoacusia neurosensorial.
- d. Acufeno.

Retroalimentación

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Otitis media.

Pregunta **10**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cómo participa el músculo trapecio en el movimiento del hombro?

Seleccione una:

- a. Rotación externa.
- b. Rotación interna.
- c. Basculación de la escápula a la flexo-abducción del hombro y elevación del hombro.

La respuesta es correcta.

- d. Todas las respuestas son ciertas.

Retroalimentación

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Basculación de la escápula a la flexo-abducción del hombro y elevación del hombro.

Pregunta **11**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Paciente con 67 años con antecedente carcinoma de cavidad oral hace 4 años, tratado con cirugía y radioterapia, que acude a control habitual en consultas externas. Refiere odontalgia esporádica que mejora con tratamiento analgésico pero que desde hace una semana se asocia a mal sabor de boca. ¿Qué deberíamos hacer primero en este caso?

Seleccione una:

- a. Asegurarnos de que el paciente no tenga el diente cariado. Para ello se derivará al paciente de forma preferente a su odontólogo de zona.
- b. Descartar recidiva de su neoplasia, por lo que se pide biopsia urgente.
- c. Realizar una exploración minuciosa en búsqueda de datos compatibles con osteonecrosis.

La respuesta es correcta.

- d. Esta sintomatología es normal en pacientes que han recibido radioterapia.

Retroalimentación

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Realizar una exploración minuciosa en búsqueda de datos compatibles con osteonecrosis.

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Desde el punto de vista de la atención integral al paciente con cáncer, ¿por qué es importante conocer los aspectos relacionados con su estructura y organización familiar?

Seleccione una:

- a. Nos permite estar alerta sobre cambios que puedan darse en cuanto a las dinámicas y roles establecidos en el funcionamiento familiar y que pudiesen repercutir en la atención al paciente o en la sobrecarga del cuidador.
- b. Desde el punto de vista asistencial, este no es un aspecto relevante a tener en cuenta en la atención al paciente oncológico.

c. Desde un punto de vista de atención integral, conocer aquellos aspectos relacionados con la estructura, la organización familiar así como la tipología de familia y el momento de ciclo vital por el cual está atravesando el paciente nos facilitará estar alerta de posibles cambios que puedan darse durante el proceso de la enfermedad y sean determinantes para la aparición de dificultades en el cuidado del paciente.

d. La primera y la tercera respuesta son correctas.

La respuesta es correcta.

Retroalimentación

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: La primera y la tercera respuesta son correctas.

Pregunta **13**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de los siguientes fármacos **NO** está aprobado en el tratamiento de los tumores de cabeza y cuello?

Seleccione una:

a. Cisplatino

b. Cetuximab

c. Nivolumab

d. Bevacizumab

Retroalimentación

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Bevacizumab

Pregunta **14**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de estos es un factor de riesgo de infección añadido en pacientes afectados de cáncer de cabeza y cuello?

Seleccione una:

- a. Malnutrición.
- b. Neutropenia.
- c. Daño de la barrera mucosa de la cavidad oral.
- d. Todas son ciertas.

La respuesta es correcta. Los pacientes con cáncer de cabeza y cuello, a menudo tienen alteraciones de las barreras físicas, dispositivos implantados, y se consideran relativamente inmunocomprometidos (debido a la malnutrición, los déficits en la inmunidad celular y humoral y la deficiente fagocitosis) o claramente inmunodeficientes, en casos de neutropenia establecida.

Tanto la quimioterapia como la radioterapia pueden prolongar la malnutrición, la mielosupresión y el daño de la barrera mucosa. La de la cavidad oral y del tracto digestivo sirve como importante barrera mecánica y su afectación juega un papel central en la fisiopatología de la infección sistémica.

Retroalimentación

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Todas son ciertas.

Pregunta **15**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál es la mejor estrategia para evitar colitis severas por inmunoterapia?

Señale la respuesta **correcta**

Seleccione una:

- a. Loperamida profiláctica
- b. Corticoterapia oral profiláctica
- c. Educación sanitaria
- d. Octreotide profiláctico

Retroalimentación

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Educación sanitaria

Pregunta **16**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La toxicidad cutánea a la inmunoterapia. Señale la respuesta **falsa**

Seleccione una:

- a. Es la toxicidad inmunomediada más frecuente
- b. Generalmente se manifiesta en forma de rash y prurito
- c. El grado de severidad de la misma va a depender más del tipo de lesión que del área de superficie corporal que comprometa
- d. Un punto fundamental en la prevención y el tratamiento es la educación sanitaria

Retroalimentación

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: El grado de severidad de la misma va a depender más del tipo de lesión que del área de superficie corporal que comprometa

Pregunta **17**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de estos **NO** es un punto de control inmune de los linfocitos T?

Seleccione una:

- a. Ligando 1 de muerte programada (PD-L1)
- b. Antígeno 4 de los linfocitos T citotóxicos (CTLA-4)
- c. Receptor de muerte programada tipo 1 (PD-1)
- d. Gen 3 de activación de linfocitos (LAG - 3)

Retroalimentación

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Ligando 1 de muerte programada (PD-L1)

Pregunta **18**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de las siguientes actuaciones no evita la broncoaspiración?

Seleccione una:

- a. Colocar en posición fowler al paciente durante su ingesta con nutrición enteral por sonda nasogástrica.
- b. Si el paciente tiene cánula, no es necesario realizar ninguna actividad de seguridad.

La respuesta es correcta.

- c. Comprobar el correcto emplazamiento de la sonda nasogástrica antes de la ingesta.
- d. Asegurar que el balón de la cánula está correctamente hinchado durante la ingesta.

Retroalimentación

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Si el paciente tiene cánula, no es necesario realizar ninguna actividad de seguridad.

Pregunta **19**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿En qué grado clasificarías la mucositis provocada por quimioterapia que impide la alimentación oral?

Seleccione una:

- a. Grado I.
- b. Grado II.
- c. Grado III.



d. Grado IV.

La respuesta es correcta.

Retroalimentación

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Grado IV.

Pregunta **20**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La rehabilitación de la deglución indirecta no consiste en:

Seleccione una:



a. Favorecer el reflejo deglutorio.



b. Mejorar la coordinación de las distintas fases de la deglución.



c. Acelerar la deglución.

La respuesta es correcta. La rehabilitación de la deglución indirecta no consiste en acelerar la deglución. Favorecer el reflejo deglutorio, mejorar la coordinación de las distintas fases de la deglución y lograr el mejor cierre glótico sí que son objetivos de la rehabilitación de la deglución.



d. Lograr el mejor cierre glótico.

Retroalimentación

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Acelerar la deglución.

Pregunta **21**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En el estudio de la disfagia, debemos realizar la siguiente exploración:

Seleccione una:

- a. Evaluación instrumental.
- b. Evaluación clínica.
- c. Evaluación clínica y evaluación instrumental.
- d. La historia clínica es suficiente.

La respuesta es correcta.

Retroalimentación


Respuesta correcta

La respuesta correcta es: La historia clínica es suficiente.

Pregunta **22**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En el caso de un paciente con alteración de las hormonas tiroideas, cuál de los siguientes patrones es sugestivo de hipotiroidismo de origen central:

Seleccione una:

- 1. TSH elevada 2 veces el límite alto de la normalidad + T4L normal.
- 2. TSH por debajo de la normalidad + T4L elevada.
- 3. TSH elevada 10 veces el límite alto de la normalidad + T4L disminuida.
- 4. TSH disminuida + T4L disminuida.

La respuesta es correcta. Como se ha comentado anteriormente, este es el patrón típico del hipotiroidismo central, en el que al disminuir la secreción de TSH secundariamente también disminuye la de T4L. Ocasionalmente se puede encontrar TSH dentro de la normalidad (“anormalmente normal” dado que una T4L disminuida es un estímulo potente para elevar TSH, como ocurre en el hipotiroidismo primario).

Retroalimentación

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: TSH disminuida + T4L disminuida.

Pregunta **23**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En cuanto a otras toxicidades menos frecuentes. Señale la respuesta **correcta**

Seleccione una:

- a. Las toxicidades oculares inmunomediadas más frecuentes son la episcleritis, la conjuntivitis y la uveítis
- b. Las transfusiones de hemoderivados están contraindicadas en las citopenias inmunomediadas
- c. Los síntomas de presentación son bastante específicos, por lo que su identificación es sencilla
- d. Los pacientes con carcinoma escamoso de cabeza y cuello tratados con nivolumab presentan un mayor porcentaje de efectos secundarios reumatológicos que los pacientes con otro tipo de tumor

Retroalimentación

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Las toxicidades oculares inmunomediadas más frecuentes son la episcleritis, la conjuntivitis y la uveítis

Pregunta **24**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿A partir de qué distancia interincisal se considera que la apertura oral está limitada?

Seleccione una:

- a. <30 mm.
- b. <35 mm.

La respuesta es correcta.

- c. <40 mm.
- d. <45 mm.

Retroalimentación

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: <35 mm.

Pregunta **25**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Palimerfina es un tratamiento con evidencia IA recomendado:

Seleccione una:

- a. Para los pacientes con quimioterapia de cabeza y cuello.
- b. Para los pacientes con radioterapia sola a dosis moderadas.
- c. Para los pacientes que solo reciben 5 Fu como quimioterapia adyuvante a radioterapia.
- d. En la quimioterapia de acondicionamiento para trasplante de progenitores hematopoyéticos en pacientes hematológicos.

La respuesta es correcta.

Retroalimentación

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: En la quimioterapia de acondicionamiento para trasplante de progenitores hematopoyéticos en pacientes hematológicos.

Pregunta **26**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué valoración debemos realizar al paciente de cabeza y cuello en primera visita para intentar mejorar el cumplimiento del tratamiento previsto?

Seleccione una:

- a. Necesitaremos conocer la localización de la enfermedad y si ha perdido de peso.
- b. Valoraremos si dispone de soporte familiar.



c. Realizaremos una valoración holística del paciente que nos permita planificar curas, trabajando desde la prevención y la optimización de recursos.

La respuesta es correcta.

Retroalimentación

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Realizaremos una valoración holística del paciente que nos permita planificar curas, trabajando desde la prevención y la optimización de recursos.

Pregunta **27**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señala cuál de las siguientes afirmaciones es **falsa**:

Seleccione una:



a. La radioterapia asociada a la quimioterapia de forma concurrente no aumenta la toxicidad a nivel laríngeo.

La respuesta es correcta. La radioterapia asociada a la quimioterapia de forma concurrente sí aumenta la toxicidad a nivel laríngeo.



b. La radioterapia asociada a la quimioterapia de forma concurrente es más efectiva en el control de la enfermedad neoplásica.



c. La radioterapia asociada a la quimioterapia de forma concurrente precisa medidas de soporte como sonda nasogástrica, etc.



d. La radioterapia asociada a la quimioterapia de forma concurrente suele requerir tratamiento con esteroides.

Retroalimentación

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: La radioterapia asociada a la quimioterapia de forma concurrente no aumenta la toxicidad a nivel laríngeo.

Pregunta **28**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De los cinco niveles que se establecen para el cuidado de la xerostomía, ¿qué posición ocupa el tratamiento farmacológico?

Seleccione una:

- a. El primer nivel.
- b. El segundo nivel.
- c. El tercer nivel.

La respuesta es correcta.

- d. No ocupa ninguno porque depende del caso.

Retroalimentación

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: El tercer nivel.

Pregunta **29**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

1. Respecto a la inmunoterapia en general, seleccione la respuesta **correcta**:

Seleccione una:

- a. El sistema inmune innato está mediado principalmente por los linfocitos T y B, y el adaptativo, principalmente, por los neutrófilos, monocitos, macrófagos, células dendríticas (DC), células Natural-Killer (NK), mastocitos, células T y diversos componentes humorales.
- b. La interacción entre las células malignas y los diversos componentes de la respuesta inmune siempre inhibe el crecimiento tumoral.
- c. La inhibición de los puntos de control inmune mediante anticuerpos monoclonales es la estrategia inmunoterápica más utilizada actualmente.
- d. La respuesta inmune endógena de los CECC no tiene un significado pronóstico.

Retroalimentación

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: La inhibición de los puntos de control inmune mediante anticuerpos monoclonales es la estrategia inmunoterápica más utilizada actualmente.

Pregunta **30**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es **falsa**?

Seleccione una:

- a. El soporte con nutrición enteral debe iniciarse dentro de las primeras 24-48h tras la cirugía.
- b. La nutrición parenteral es la vía de elección principal tras el acto quirúrgico.
La respuesta es correcta. La nutrición parental no es la vía de elección principal tras el acto quirúrgico.
- c. La combinación de suplementación nutricional y consejo dietético ha demostrado aumentar la supervivencia en pacientes sometidos a quimio±radioterapia.
- d. No existen diferencias significativas en cuanto a la supervivencia en los pacientes con gastrostomías profilácticas.

Retroalimentación

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: La nutrición parenteral es la vía de elección principal tras el acto quirúrgico.

Pregunta **31**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Indica si la siguiente afirmación es verdadera o falsa: el primer paso del Protocolo SPIKES (S) sobre cómo dar malas noticias, nos ayuda a conocer que sabe el paciente antes de informarlo.

Seleccione una:

- a. Verdadero
- b. Falso

La respuesta es correcta. El primer paso del Protocolo SPIKES (S), nos ayuda a preparar previamente el encuentro y establecer contacto con el paciente en un ambiente que facilite el intercambio de información. Buscaremos un **lugar tranquilo** que dé lugar a pocas interrupciones, se preguntará al paciente qué personas quiere que estén presentes y se intentará mantener **contacto visual** a lo largo de la entrevista.

Retroalimentación

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Falso

Pregunta **32**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Las nuevas tecnologías utilizadas en radioterapia disminuyen la mucositis aguda cuando hacemos tratamientos de cabeza y cuello.

Seleccione una:



a. Si, puesto que permiten disminuir las dosis en zonas no incluidas en el volumen tumoral.

La respuesta es correcta.



b. No, es imposible.



c. Esto es cierto en los pacientes que no utilizan quimioterapia.



d. La primera y la tercera respuesta son correctas.

Retroalimentación

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Si, puesto que permiten disminuir las dosis en zonas no incluidas en el volumen tumoral.

Pregunta **33**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de estas actividades es necesaria para disminuir el riesgo de tapón mucoso?

Seleccione una:

- a. Hidratación del paciente y humidificación del medio ambiente.
- b. Fisioterapia respiratoria y tratamiento con aerosolterapia.
- c. Minimizar al máximo las aspiraciones.
- d. Todas las respuestas son correctas.

La respuesta es correcta.

Retroalimentación

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Todas las respuestas son correctas.

Pregunta **34**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de los siguientes no es un factor de riesgo de desarrollar toxicidad pulmonar de la inmunoterapia?

Señale la **respuesta correcta**

Seleccione una:

- a. Neoplasia de pulmón
- b. Patología pulmonar previa
- c. Combinación de inhibidores de puntos de control inmune
- d. Sobreexpresión de PDL1

Retroalimentación

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Sobreexpresión de PDL1

Pregunta **35**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La localización del tumor con más riesgo de ototoxicidad radioinducida es:

Seleccione una:

- a. La laringe.
- b. La hipofaringe.
- c. La nasofaringe.

La respuesta es correcta.

- d. La orofaringe.

Retroalimentación

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: La nasofaringe.

Pregunta **36**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Indica si la siguiente afirmación es verdadera o falsa: la técnica de acompañar o acompañamiento nos facilita validar o normalizar las emociones del paciente.

Seleccione una:

- a. Verdadero
- b. Falso

La respuesta es correcta. Adaptarnos al ritmo del paciente durante la entrevista (tono y ritmo de voz). Abordar los temas que preocupan al paciente, es decir, centrarnos en la agenda del paciente y no en lo que cree el profesional que es importante o preocupante para el paciente.

Retroalimentación

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Falso

Pregunta **37**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En aquellos pacientes con una estenosis laríngea generalizada, el tratamiento más adecuado es:

Seleccione una:

- a. Esteroides.
- b. Traqueotomía.
- c. Antiinflamatorios no esteroideos.
- d. Mucolíticos.

La respuesta es correcta.

Retroalimentación

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Esteroides.

Pregunta **38**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Referente al estudio Checkmate 141. Señale la respuesta **falsa**

Seleccione una:

- a. Incluye una población de pacientes con carcinoma escamoso de cabeza y cuello con progresión a platino en menos de 6 meses.
- b. Los randomizó 2:1, nivolumab 3mg/kg bisemanal versus tratamiento a criterio de investigador (incluyendo: metotrexate, docetaxel, cetuximab) hasta progresión o toxicidad no aceptable.
- c. El brazo control consiguió un beneficio claro en tasa de respuesta, supervivencia libre de progresión y supervivencia global



d. El brazo de nivolumab presentó un mejor perfil de seguridad

Retroalimentación


Respuesta correcta

La respuesta correcta es: El brazo control consiguió un beneficio claro en tasa de respuesta, supervivencia libre de progresión y supervivencia global

Pregunta **39**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de estos **NO** es un mecanismo de evasión inmune de las células tumorales?

Seleccione una:



a. La regulación de la maquinaria intracelular de presentación de antígenos tumorales.



b. El aumento del reconocimiento antigénico por parte del sistema inmune.



c. La promoción de la inmunosupresión a nivel del microambiente tumoral de los CECC, mediante el reclutamiento de inmunosupresores (iTreg y MDSCs) y la producción de citoquinas inmunosupresoras y enzimas (factor de crecimiento endotelial y la dioxigenasa indolamina 2,3).



d. La expresión de inhibidores del punto de control del sistema inmune a nivel tumoral y del microambiente tumoral.

Retroalimentación


Respuesta correcta

La respuesta correcta es: El aumento del reconocimiento antigénico por parte del sistema inmune.

Pregunta **40**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Respecto a la toxicidad hepática de la inmunoterapia. Señale la respuesta **falsa**

Seleccione una:

- a. Aparece con mayor frecuencia con la combinación de antiPD1 y anti CTLA4 que en monoterapia
- b. Habitualmente es asintomática
- c. Es imprescindible descartar otras causas mediante la realización de una anamnesis dirigida, descartando enolismo y otros tratamientos, realización de serologías víricas, estudio de la autoinmunidad, del hierro, ecografía abdominal e incluso una biopsia hepática.
- d. En pacientes con toxicidad severa que no responden a corticoterapia endovenosa, puede utilizarse inmunosupresores como el infliximab

Retroalimentación

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: En pacientes con toxicidad severa que no responden a corticoterapia endovenosa, puede utilizarse inmunosupresores como el infliximab