

Estrategias en prevención primaria y secundaria del cáncer de cuello uterino 2021

Comenzado el	martes, 23 de marzo de 2021, 18:08
Estado	Finalizado
Finalizado en	martes, 23 de marzo de 2021, 18:41
Tiempo empleado	33 minutos 7 segundos
Puntos	26,00/30,00
Calificación	8,67 de 10,00 (87%)

Pregunta 1

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué pruebas se pueden realizar a partir de una muestra recogida mediante autotoma?

Seleccione una:

- ☐ a. Citología.
- ☐ b. Pruebas de detección del VPH.
- ☒ c. Ambas son verdaderas.

Retroalimentación

Respuesta incorrecta.

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Es una vacuna segura?

Seleccione una:

- ☒ a. Si, es una vacuna segura. No contiene material genético, por lo tanto no puede causar enfermedad.
- ☐ b. Si, es una vacuna segura. Los viriones que contiene tienen su ADN recombinado y por tanto sin capacidad de infectar.
- ☐ c. Sí, es una vacuna segura. Contiene material genético del virus pero lo suficientemente atenuado como para no causar enfermedad.


Retroalimentación

Respuesta correcta

Pregunta **3**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Por qué deberían vacunarse los niños?

Seleccione una:

- ☐ a. Porque las vacunas ofrecen protección adicional frente a lesiones precancerosas anales y cáncer de ano.
- ☐ b. Porque las vacunas tetravalente y nonavalente ofrecen protección adicional frente a verrugas genitales.
- ☒ c. Todas las respuestas son correctas


Retroalimentación

Respuesta correcta

Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Un acontecimiento adverso que aparece tras la vacunación frente al VPH:

Seleccione una:

- ☐ a. Si se produce dentro de los dos meses siguientes a la vacunación se trata de un efecto adverso causalmente relacionado con la vacuna.
- ☐ b. Si se produce dentro del mes siguiente a la vacunación se trata de un efecto adverso causalmente relacionado con la vacuna.
- ☒ c. Para poder determinar si se trata de un efecto adverso causalmente relacionado con la vacuna se deben valorar otros criterios además de la relación temporal.


Retroalimentación

Respuesta correcta

Pregunta **5**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué es la ficha técnica de un medicamento o producto sanitario?

Seleccione una:

- ☒ a. Un documento con toda la evidencia clínica y preclínica sobre el medicamento y que se actualiza periódicamente con los nuevos datos disponibles.
- ☐ b. Un documento con toda la evidencia clínica y preclínica hasta el momento de la aprobación del medicamento
- ☐ c. Un documento resumen que solo sirve para que los pacientes lean cuales son los posibles efectos adversos esperados


Retroalimentación

Respuesta correcta

Pregunta **6**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Por qué sólo se pueden utilizar pruebas de VPH validadas para su uso en el cribado de cáncer de cuello uterino?

Seleccione una:

- ☒ a. Porque las tecnologías de detección de VPH utilizadas en cribado deben dar sólo resultados informativos sobre infecciones con riesgo de desarrollar un HSIL/CIN2+ HSIL/CIN3+
- ☐ b. Porque las tecnologías de detección de VPH utilizadas en cribado deben de tener una alta reproducibilidad intra e interlaboratorio.
- ☐ c. Ambas son verdaderas.

Retroalimentación

Respuesta incorrecta.

Pregunta **7**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Por qué es importante realizar controles de calidad en el cribado de cáncer cervical?

Seleccione una:

- ☐ a. Para asegurar la calidad en la toma, transporte y preparación de la muestra para su posterior lectura, asegurar la calidad de la técnica de detección utilizada, la interpretación de los resultados y su comunicación, cumpliendo para ellos unos intervalos de tiempo definidos.
- ☐ b. Para asegurar una alta reproducibilidad de la muestra bajo las diversas condiciones que pueden albergar los diferentes laboratorios clínicos, garantizando la fiabilidad y la exactitud de los resultados obtenidos.
- ☒ c. Ambas son verdaderas.

Retroalimentación

Respuesta correcta

Pregunta **8**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué diferencias hay entre incidencia y prevalencia de una enfermedad?

Seleccione una:

- ☐ a. A diferencia de la prevalencia, la incidencia se refiere a la proporción de individuos diagnosticados con la enfermedad (casos antiguos y nuevos) en un momento o periodo de tiempo determinado.
- ☐ b. A diferencia de la incidencia, la prevalencia cuantifica el número de casos nuevos de una enfermedad que se desarrollan en una población determinada durante un intervalo de tiempo concreto.
- ☒ c. A diferencia de la prevalencia, la incidencia cuantifica el número de casos nuevos de una enfermedad que se desarrollan en una población determinada durante un intervalo de tiempo concreto

Retroalimentación

Respuesta correcta

Pregunta 9
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Es importante evaluar un programa de cribado de cáncer de cuello uterino?

Seleccione una:

- ☐ a. Sí, porque aporta información sobre la reproducibilidad y fiabilidad de la prueba de cribado, permitiendo la identificación de posibles problemas si los hubiera.
- ☒ b. Sí, porque aporta información sobre su correcta implementación y funcionamiento. Además, permite conocer los resultados obtenidos y facilitar la identificación de posibles problemas.
- ☐ c. No, no es necesario. Si está basado en una evidencia científica sólida, no hace falta que se evalúe.


Retroalimentación

Respuesta correcta

Pregunta **10**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Una paciente con un HSIL/CIN2 que ya está siguiendo el tratamiento recomendado, acude a consulta porque está preocupada por si su pareja ha de seguir algún control especial. ¿Qué le aconsejaríamos?

Seleccione una:

- ☐ a. La pareja debe acudir al urólogo (en caso de ser un hombre) o al ginecólogo (si es una mujer) por si también presenta algún tipo de lesión.
- ☒ b. A no ser que su pareja presente algún síntoma, no se recomienda ninguna actuación especial. Tan solo podríamos recomendar el uso del preservativo durante el proceso de diagnóstico y tratamiento.
- ☐ c. Le aconsejaríamos no mantener ningún tipo de relación sexual durante el proceso de diagnóstico y tratamiento para asegurar la eficacia del tratamiento.


Retroalimentación

Respuesta correcta

Pregunta **11**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale los criterios para evaluar la causalidad de los efectos adversos de una vacuna de la Organización Mundial de la Salud:

Seleccione una:


- ☒ a. Relación temporal, fuerza de la asociación, especificidad, balance riesgo-beneficio, plausibilidad biológica.

- ☐ b. Relación temporal, fuerza de la asociación, especificidad, consistencia, plausibilidad biológica.
- ☐ c. Relación temporal, fuerza de la asociación, balance riesgo-beneficio, consistencia, plausibilidad biológica.

Retroalimentación

Respuesta incorrecta.

Pregunta **12**
Incorrecta
Puntúa 0,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En mujeres ya infectadas por el VPH:


Seleccione una:

- ☐ a. La vacunación frente a VPH se debería evitar, ya que se desconocen los efectos adversos de vacunar a mujeres ya infectadas.
- ☒ b. La vacunación frente a VPH es segura, con una frecuencia de efectos adversos locales y sistémicos superior a la de mujeres no infectadas.
- ☐ c. La vacunación frente a VPH es segura, con una frecuencia de efectos adversos locales y sistémicos similar a la que presentan las mujeres no infectadas.

Retroalimentación

Respuesta incorrecta.

Pregunta **13**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Se puede vacunar a las mujeres embarazadas?

Seleccione una:

- ☐ a. No, porque la evidencia científica ha demostrado que hay más riesgo de aborto y anomalías congénitas.
- ☐ b. Sí, la evidencia científica demuestra que no hay ningún peligro ni para la madre ni para el feto.
- ☒ c. No, porque los datos que existen son insuficientes para recomendar el uso de la vacuna durante el embarazo.

Retroalimentación

Respuesta correcta

Pregunta **14**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los programas de vacunación son un ejemplo de:

Seleccione una:

- ☒ a. Prevención primaria
- ☐ b. Prevención secundaria
- ☐ c. Prevención terciaria

Retroalimentación

Respuesta correcta

Pregunta **15**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En relación a las sospechas de efectos adversos graves asociados a la vacunación frente al VPH:

Seleccione una:

- ☐ a. Cualquier sospecha ha sido examinada de manera exhaustiva por las agencias reguladoras y organizaciones internacionales entre las que se encuentra el Comité Consultivo Mundial sobre Seguridad de Vacunas de la Organización Mundial de la Salud.
- ☐ b. A excepción del síncope, ninguna otra sospecha de efecto adverso grave ha sido confirmada.
- ☒ c. A y B con ciertas.

Retroalimentación

Respuesta correcta

Pregunta **16**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale la respuesta incorrecta en relación a la vacunación frente al VPH en las siguientes situaciones:

Seleccione una:

- ☒ a. En personas infectadas por el VPH, la vacunación se debe posponer hasta la resolución de la infección.
- ☐ b. En personas que tienen una enfermedad autoinmune se puede administrar la vacuna, ya que no hay evidencia de que aumente el riesgo de tener otras enfermedades autoinmunes.
- ☐ c. En embarazadas, la vacunación se debe posponer hasta la finalización del embarazo.

Retroalimentación

Respuesta correcta

Pregunta **17**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

A una mujer de 31 años a la que se le ha practicado una conización hace cuatro años. ¿Qué prueba de cribado le haríamos?

Seleccione una:

- ☐ a. Un co-test (citología + prueba de VPH).
- ☐ b. Una citología.
- ☒ c. Una prueba de VPH.


Retroalimentación

Respuesta correcta

Pregunta **18**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué es una autotoma cérvico-vaginal?

Seleccione una:

- ☐ a. Es un dispositivo que permite la obtención de muestras de secreciones anales por la propia mujer.
- ☒ b. Es un dispositivo que permite la obtención de muestras de secreciones cérvico-vaginales por la propia mujer.
- ☐ c. Es un dispositivo que permite la obtención de muestras de secreciones cérvico-vaginales por el personal sanitario que atiende a las mujeres en las actividades de cribado.


Retroalimentación

Respuesta correcta

Pregunta **19**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué es el cribado?:

Seleccione una:

- ☐ a. La identificación mediante pruebas, exámenes u otras técnicas de sujetos afectados por una enfermedad cuando esta está en fase sintomática.
- ☒ b. La identificación mediante pruebas, exámenes u otras técnicas de sujetos afectados por una enfermedad o por una anomalía que hasta entonces había pasado desapercibida.
- ☐ c. La identificación mediante pruebas, exámenes u otras técnicas de sujetos sanos, es decir libres de la enfermedad.


Retroalimentación

Respuesta correcta

Pregunta **20**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En relación a la evaluación de la seguridad de las vacunas, señale la respuesta incorrecta:

Seleccione una:

- ☐ a. La monitorización de los efectos adversos tras la comercialización de las vacunas es importante porque permite detectar efectos adversos de inicio tardío.
- ☒ b. Los ensayos clínicos pre-autorización no detectan efectos adversos comunes relacionados con la vacuna (estos se detectan en el seguimiento posautorización).
- ☐ c. La monitorización de los efectos adversos tras la comercialización de las vacunas tiene el potencial de detectar efectos adversos raros o poco frecuentes.


Retroalimentación

Respuesta correcta

Pregunta **21**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Una mujer acude al cribado. Se le realiza una prueba de VPH siendo esta positiva para el tipo VPH16. ¿Cuál sería el manejo clínico a seguir?

Seleccione una:

- ☐ a. Realizar co-test al cabo de un año.
- ☐ b. Realizar una citología réflex.
- ☒ c. Realizar una colposcopia inmediata.

Retroalimentación

Respuesta correcta

Pregunta **22**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué tipo de manejo clínico haríamos a una mujer de 43 años con una infección por el tipo de VPH18, a la que se le ha realizado una colposcopia y esta es negativa?

Seleccione una:

- ☒ a. Un co-test al cabo de un año.
- ☐ b. Realizar colposcopia y citología a los 6 meses.
- ☐ c. Una conización.

Retroalimentación

Respuesta correcta

Pregunta **23**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Una paciente, a la que hace cuatro años se le realizó una conización por un HSIL/CIN3, nos pregunta si se puede vacunar frente al VPH. ¿Qué le diríamos?

Seleccione una:

- ☐ a. Que sí que se puede vacunar. Quedará protegida frente a futuras infecciones por los tipos vacunales de los que no estuviera infectada.
- ☐ b. Que sí que se puede vacunar. Quedará protegida frente a una reinfección por el mismo tipo de VPH en caso de que la lesión estuviera producida por alguno de los tipos incluidos en la vacuna.
- ☒ c. Ambas son verdaderas.


Retroalimentación

Respuesta correcta

Pregunta **24**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El uso del preservativo utilizado de manera correcta y sistemática reduce pero no elimina el riesgo de transmisión del VPH. Pero ¿Cuándo se recomienda su uso en mujeres infectadas por el VPH?

Seleccione una:

- ☐ a. En ningún caso, una vez establecida la infección el preservativo no ayuda en su aclaramiento.
- ☐ b. En las mujeres que han sufrido una histerectomía benigna.
- ☒ c. En las mujeres que se encuentran en proceso de diagnóstico y tratamiento de una lesión cervical, mujeres con persistencia de infección por VPH a lo largo del tiempo y no que tienen ninguna lesión cervical.

Retroalimentación

Respuesta correcta

Pregunta **25**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Es necesario administrar una dosis de recuerdo?

Seleccione una:

- ☐ a. Si, 20 años tras la administración de la última dosis
- ☐ b. Si, a la edad de 40 años
- ☒ c. De momento, los estudios de extensión no parecen indicar la necesidad de administrar una dosis de recuerdo

Retroalimentación

Respuesta correcta

Pregunta **26**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Por qué en un cribado con la prueba de VPH como prueba primaria, el intervalo entre pruebas se recomienda de al menos 5 años?

Seleccione una:

- ☐ a. Porque tiene un elevado valor predictivo negativo (VPN), cercano al 99% en mujeres mayores de 30 años, lo que significa que una determinación negativa se traduce en una muy baja probabilidad de tener una lesión CIN2+ actual y en los próximos 5 años.
- ☐ b. Porque la sensibilidad de la prueba de VPH es superior a la de la citología, de manera que se evidencia una menor incidencia de cáncer de cuello uterino después de 5 años de una prueba de VPH negativa negativa que tras 3 años de una citología negativa.
- ☒ c. Ambas son correctas.

Retroalimentación

Respuesta correcta

Pregunta **27**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Ante un escenario de cribado con prueba de VPH como prueba primaria ¿Qué prueba de cribado realizaríamos a una mujer que nunca se ha cribado?

Seleccione una:

- ☒ a. Si tiene entre 25 y 29 años le realizaríamos una citología. Si tiene entre 30 y 64 años le realizaríamos una prueba de VPH. Si tiene 65 años o más realizaríamos un co-test (VPH + citología).
- ☐ b. Le realizaríamos una prueba de VPH independientemente de la edad que tenga.
- ☐ c. Si tiene entre 25 y 29 años le realizaríamos una citología. Si tiene 30 o más le realizaríamos una prueba de VPH.

Retroalimentación

Respuesta correcta

Pregunta **28**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿A qué edad se recomienda el inicio del cribado de cáncer de cuello uterino y mediante qué prueba de cribado?

Seleccione una:

- ☐ a. Tras el inicio de las relaciones sexuales, mediante la realización de una citología cervical.
- ☒ b. A partir de los 25 años de edad mediante una citología cervical.
- ☐ c. A partir de los 25 años de edad mediante una prueba de detección de VPH.


Retroalimentación

Respuesta correcta

Pregunta **29**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Una mujer homosexual se tendría que cribar?

Seleccione una:

- ☐ a. Sí, sí ha tenido o tiene relaciones sexuales con otra mujer. Además, en este grupo de mujeres los intervalos de cribado se podrían aumentar a más de 3 o 5 años (según si se criban con citología o VPH) dada la prevalencia tan baja de infección por VPH en este colectivo.
- ☒ b. Sí, sí ha tenido o tiene relaciones sexuales con otra mujer. El VPH se puede transmitir, aunque no haya penetración, ya que se contagia por contacto íntimo de las zonas genitales.
- ☐ c. No, porque en las relaciones homosexuales entre mujeres no se tiene penetración y por tanto el riesgo transmisión de VPH es muy raro.


Retroalimentación

Respuesta correcta

Pregunta **30**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué recomendarías realizar a una mujer que tiene dos pruebas de VPH positivas para los tipos de alto riesgo diferentes al VPH16/18 y dos citologías negativas realizadas en el intervalo de un año?

Seleccione una:

- ☒ a. Enviar a colposcopia inmediatamente.
- ☐ b. Volver a repetir un co-test al cabo de un año.
- ☐ c. Realizar una citología al cabo de un año.

Retroalimentación

Respuesta correcta