

## Gestión de riesgo. Herramientas en seguridad

Comenzado el sábado, 16 de mayo de 2020, 14:58

**Estado** Finalizado

**Finalizado en** sábado, 16 de mayo de 2020, 15:01

**Tiempo empleado** 2 minutos 26 segundos

**Puntos** 20,00/20,00

**Calificación** 10,00 de 10,00 (100%)

**Comentario -** Apto

### Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Enunciado de la pregunta

Podemos definir gestión de riesgo como aquellas actividades encaminadas a identificar, evaluar reducir o eliminar el riesgo que se produzca un efecto adverso que afecte a...

Seleccione una:

- a. Instalaciones
- b. Recursos económicos
- c. Personas
- d. Todas son correctas

### Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Enunciado de la pregunta

Los sistemas de notificación son.... Señale la correcta

Seleccione una:

- a. Sistemas siempre obligatorios de rellenar
- b. No punitivos, anónimos y confidenciales
- c. La principal fuente de información en el análisis reactivo, buscan el error y Iso profesionales implicados
- d. Ninguna es correcta

### Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Enunciado de la pregunta

Dentro de las herramientas que nos ayudan en el análisis proactivo. Señale la incorrecta

Seleccione una:

- a. La espina de pescado nos permite clasificar los riesgos de forma individualizada y también de manera global o por área
- b. En la espina de pescado colocaremos el área o proceso en las espinas principales y en las menores las diferentes categorías de riesgos.
- c. La lluvia de ideas se realiza tras haber realizado el grupo nominal.
- d. En el grupo nominal cada miembro aporta ideas que se le ocurran, aunque no estés seguro si son correctas o no.

### Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Enunciado de la pregunta

AMFE es una herramienta para... Señale la incorrecta

Seleccione una:

- a. Evaluar los fallos potenciales dentro del sistema
- b. Buscar las causas subyacentes
- c. Priorizar estos fallos potenciales según el riesgo
- d. Identificar las causas que han originado el problema

### Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Enunciado de la pregunta

Las fases del AMFE son. Señale la incorrecta

Seleccione una:

- a. Formación del grupo de trabajo
- b. Identificación del suceso centinela
- c. Análisis de fallos, posibles causas y efectos y métodos de detección
- d. Implantación de medidas de mejora

### Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Enunciado de la pregunta

En cuanto al análisis barreras. Señale la correcta

Seleccione una:

- a. Es una herramienta de análisis proactivo que clasifica los riesgos agrupándolos según su nivel de importancia.
- b. Las barreras administrativas podrían ser protocolos, procedimientos, formación, doble firma
- c. Las barreras naturales podrían ser los códigos de barras
- d. Las barreras más efectivas son las barreras humanas

### Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Enunciado de la pregunta

En cuanto a la herramienta ACR señale la correcta

Seleccione una:

- a. Es una herramienta fundamental para el análisis proactivo
- b. Se empezó a utilizar en el ámbito sanitario
- c. Su objetivo fundamental es encontrar el error latente
- d. Todas son correctas

### Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Enunciado de la pregunta

El error activo es....Señale la correcta

Seleccione una:

- a. El último error cometido individualmente por la persona
- b. Fallos subyacentes dentro del sistema
- c. La suma de todos los errores que aparecen en el proceso
- d. Ninguna es correcta

### Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Enunciado de la pregunta

Identifica cuál de los siguientes no es un suceso centinela

Seleccione una:

- a. Olvido material tras la intervención
- b. Dosis excesiva radioterapia
- c. Reacción adversa medicamentosa
- d. Muerte materna

### Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Enunciado de la pregunta

Para la secuencia cronológica de los hechos podemos utilizar. Señale la correcta

Seleccione una:

- a. Línea del tiempo
- b. Tabla cronológica
- c. Tabla persona-tiempo
- d. Todas son correctas

### Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

nunciado de la pregunta

Para el análisis de factores contribuyentes vamos a utilizar. Señale la correcta:

Seleccione una:

- a. Línea de persona- tiempo
- b. Diagrama de los por qué en cascada
- c. Matriz de riesgo
- d. Ninguna es correcta

### Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Enunciado de la pregunta

El objetivo de la gestión del riesgo es... Señale la opción incorrecta

Seleccione una:

- a. Incrementar la calidad de la asistencia sanitaria
- b. Mejorar la seguridad del paciente y de los profesionales
- c. Disminuir los costes inevitables.
- d. Todas son correctas

### Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Enunciado de la pregunta

En la fase de planificación de respuestas nos debemos preguntar.... Señale la incorrecta

Seleccione una:

- a. ¿Qué riesgos vamos a prevenir o minimizar?
- b. ¿Qué nivel de riesgos aceptamos?
- c. ¿Qué puede ir mal?
- d. ¿Cómo vamos a reaccionar si suceden?

### Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Enunciado de la pregunta

La gestión del riesgo combina tres tipos de riesgos.

Seleccione una:

- a. El riesgo inherente al paciente en sí mismo
- b. El riesgo relacionado con las decisiones médicas
- c. El riesgo ocasionado por la aplicación de las decisiones médicas
- d. Todas son correctas

### Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Enunciado de la pregunta

En la fase de identificación dentro de la gestión de riesgo nos debemos preguntar...

Seleccione una:

- a. ¿Qué ha salido mal?
- b. ¿Cuál es el riesgo más importante?
- c. ¿Qué puede ir mal?
- d. A y c son correctas

### Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Enunciado de la pregunta

Dentro de la fase de análisis de riesgo debemos llevar acciones encaminadas a.....señale la correcta.

Seleccione una:

- a. Acciones encaminadas a identificar factores relacionados con el riesgo
- b. Acciones encaminadas a objetivar la frecuencia, trascendencia y evitabilidad.
- c. Acciones encaminadas a eliminar, reducir y minimizar los riesgos
- d. Ninguna es correcta.

#### Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Enunciado de la pregunta

La visión de nuestra organización hace referencia a.... Señale la correcta

Seleccione una:

- a. Lo que estamos haciendo en este momento
- b. A nuestra experiencia como organización
- c. Nuestro objetivo, lo que queremos conseguir.
- d. Ninguna es correcta

#### Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Enunciado de la pregunta

Para realizar un análisis de situación y contexto debemos conocer....Señale la correcta

Seleccione una:

- a. Conocer quiénes somos como organización
- b. Conocer a nuestros clientes
- c. Conocer nuestro entorno
- d. Todas son correctas

#### Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Enunciado de la pregunta

La herramienta más utilizada para conocer la voz del cliente es...Señale la correcta

Seleccione una:

- a. QFD (Quality Function Deployment)
- b. ACR
- c. En el caso de clientes internos, la herramienta DAFO
- d. A y c son correctas

### Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Enunciado de la pregunta

En cuanto a la identificación de riesgos. Señale la opción correcta

Seleccione una:

- a. El análisis de riesgo reactivo se realiza antes de que el evento adverso haya ocurrido. Su objetivo principal es aprender de los errores.
- b. El análisis proactivo se realiza a posteriori, una vez que el riesgo ya se ha producido.
- c. En el análisis proactivo analizamos e identificamos riesgos antes de que se produzcan.
- d. El objetivo principal del análisis reactivo es averiguar qué ha pasado y quién ha realizado el error.

## Gestión de riesgo. Herramientas en seguridad

**Comenzado el** domingo, 24 de mayo de 2020, 10:25

**Estado** Finalizado

**Finalizado en** domingo, 24 de mayo de 2020, 10:26

**Tiempo empleado** 1 minutos 26 segundos

**Puntos** 5,00/5,00

**Calificación** 10,00 de 10,00 (100%)

**Comentario -** Apto

### Información

Texto informativo

NHC 556038

Varón de 51 años. Originario de Argelia.

*Antecedentes: Fumador de larga evolución (2-3 paq/d); Neumonía comunitaria LSD nov 07.*

*Historia:*

*Ingreso hospitalario 14/04/2017 para estudio de epigastralgia y síndrome constitucional. Hallazgos: LOES hepáticas, marcadores tumorales elevados, tumoración duodenal (biopsia).*

#### **20-22/04/2017**

- Rectorragia

#### **23/04/2017**

- Se realiza biopsia de LOE hepática percutánea.

#### **24/04/2017**

Intenso dolor abdominal a asociación de opiáceos

#### **25/04/2017 (12 AM)**

- Coma, hipotensión severa. Hb:7. Deterioro de la función renal, acidosis. TAC abdominal: hemoperitoneo. TAC craneal: no LOES. Cirugía Urgente. Inestabilidad en quirófano (6 litros de cristaloides, 500 cc de plasma fresco y 4 u de hematíes)
- Hallazgos Quirúrgicos: hemoperitoneo 600 cc; coágulo dependiente de epiploon mayor (se liga vaso sangrante); LOES hepáticas de aspecto metastático con afectación. Colectomía ampliada con LOE cercana a fundus vesicular + biopsias ganglionares.

#### **25/04/2017(21:45) pasa a UCI.**

- Inestable. Acidosis láctica. Reposición de líquidos. Drogas vasoactivas: noradrenalina. Monitorización con Vigileo: shock mixto (hipovolémico, distributivo).
- Renal: insuficiencia renal prerrenal que mejora
- Insuficiencia respiratoria hipoxémica con infiltrado alveolo intersticial en ambas bases. Se mantiene IOT y ventilación mecánica. Gradiente moderado (PaFi el 27/04 de 207).
- Tratamiento empírico con Piperacilina-Tazobactam. E. Coli en BAS.
- Altas necesidades de analgesia (opiáceos, AINEs.... Catéter epidural el 29/04).

#### **27/04/2017**

- Drogas vasoactivas a bajas dosis se retira en el turno de tarde.. No signos de sangrado.
- IPPV 0'4, pO2 83. Se pasa a BIPAP y CPAP a las 15h, y a las 16:30h en tubo en T.
- Descenso de dosis de propofol y fentanilo para iniciar destete. Se conecta con él, responde a órdenes.

- **17:15h: el paciente se auto extuba**

- No se reintuba. Se suspende propofol y se pone Ventimask al 60% (satO2 95%). Consciente, desorientado a ratos (barrera idiomática). Se intenta autorretirar SNG.

**Del 27-30/04:**

- Situación respiratoria justa pero mantenida (pO2 60 con VMX 80%, sin taquipnea excesiva ni tiraje). Progresión de infiltrado radiológico.

- Leucocitosis 20.000.

- Alto dolor no controlado (catéter epidural 29/04)

- Íleo para lítico.

**30/04/2017**

- Rápido deterioro respiratorio. Infección respiratoria no controlada pese a tto AB dirigido. Dada la situación oncológica de pésimo pronóstico se habla con la familia y se decide LET (se desestima reLOT y reconexión a VM) + intensificar medidas de confort. El paciente fallece a las 16h del 1/05/09.

**Pregunta 1**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Enunciado de la pregunta

Podemos definir este suceso como... Señale la opción correcta

Seleccione una:

- a. Evento adverso
- b. Incidente sin daño
- c. Distracción
- d. Casi incidente

**Pregunta 2**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Enunciado de la pregunta

Si tuviéramos que realizar un análisis. Realizaríamos...

Seleccione una:

- a. Un análisis de situación y contexto en nuestra unidad siendo prioritario identificar el número de extubaciones
- b. Un análisis reactivo, podíamos utilizar la herramienta ACR
- c. Un análisis proactivo, podíamos utilizar la herramienta AMFE



d. Un análisis reactivo, podíamos utilizar la herramienta AMFE

### Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Enunciado de la pregunta

Para realizar la recogida de información. Podemos utilizar....

Seleccione una:



a. Documentación clínica



b. Cronología del suceso



c. Profesionales involucrados



d. Todas son correctas

### Información

Texto informativo

17:15h del 27/04/2017. Autoextubación.

Entrevista con personas implicadas:

- Médico de Guardia: no estaba presente.
- Médico de tarde: no presenció el evento. Valoró al enfermo cuando se le avisó tras la autoextubación, indicando las medidas a seguir.
- Enfermera responsable: comentó que ni si quiera vieron cómo se autoextubó sonó el respirador y ya fueron corriendo y fue cuando ya le pusieron el alto flujo. Este paciente tenía aislamiento y estaba con biombo que como comentamos el otro día yo creo que pudieron influir bastante.
- Otras enfermeras: Las enfermeras y AE que estaban dentro de boxes atendiendo pacientes. El turno del café se había retrasado ese día (no coincidiendo con ningún ingreso). El paciente previamente había sido colocado y atendido a primera hora del turno de tarde. Sujeciones en MMSS ajustadas.
- TCAE responsable: entraban en la unidad del descanso del café el segundo turno, oyéndose al poco las alarmas del respirador. Quedaban en la unidad 3 enfermeras + 2 TCAE.

Situación/contexto:

- Hora del café: menos personal presencial en la unidad
- Hora del celador: si
- Nº de enfermos ingresados: 8
- Coincidencia con otros ingresos? No
- Ausencia de vigilancia desde el control (monitorización central)
- Personal nuevo: 1 enfermera nueva (1 mes de "rodaje").
- Sujeciones: si

- Aislado con Biombo

Para recoger información se realizaron entrevistas al personal involucrado. Con esta información responde a las siguientes preguntas.

#### Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Enunciado de la pregunta

Para realizar la investigación del suceso podemos utilizar las siguientes herramientas. Señale la incorrecta.

Seleccione una:

- a. Tabla cronológica
- b. Línea del tiempo
- c. Tabla persona- tiempo
- d. Diagrama de Ishikawa

#### Información

Texto informativo

Una vez que hemos recogido toda la información. Responda a las siguientes preguntas relacionadas con los factores contribuyentes

#### Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Enunciado de la pregunta

Los factores relacionados con barrera idiomática, aislamiento de contacto y dolor no controlado. Son factores... Señale la correcta:

Seleccione una:

- a. Individuales
- b. De tarea
- c. Del paciente
- d. Formación/entrenamiento