

## Examen Módulo V

Question1

Puntos: --/1

Algunas pautas de actuación no verbales son:

Seleccione una respuesta.

- a. Gestos no amenazantes, ni defensivos, evitando mostrar miedo
- b. Actitud abierta, tranquila, que invite al diálogo y a la privacidad
- c. No mirar de forma directa y continuada al paciente e intentar estar sentados a la misma altura
- d. Todas son correctas

Enviar

Question2

Puntos: --/1

Cuando un paciente amenaza con suicidarse hay que...

Seleccione una respuesta.

- a. Considerar en serio todas las amenazas de suicidio del paciente e informar de ellas inmediatamente.
- b. b) Como a veces son llamadas de atención, no siempre hay que hacer caso
- c. Hacerle caso en función del diagnóstico psiquiátrico.
- d. Hacerle caso si antes lo ha intentado.

Enviar

Question3

Puntos: --/1

El aseo de un paciente contenido se hará:

Seleccione una respuesta.

- a. No es necesario el aseo de un paciente contenido
- b. Una vez cada dos días
- c. Una vez al día
- d. Una vez por turno, al menos 2 veces al día, respetando el descanso

Enviar

Question4

Puntos: --/1

El cabecero de la cama del paciente con inmovilización terapéutica se mantendrá:

Seleccione una respuesta.

- a. A 90 grados
- b. A 30-45 grados
- c. A 10 grados



d. No es necesario levantar el cabecero

Enviar

Question5

Puntos: --/1

El número óptimo de personas para realizar la contención mecánica o inmovilización terapéutica es de:

Seleccione una respuesta.



a. 2



b. 3



c. 4



d. 5

Enviar

Question6

Puntos: --/1

El paciente con inmovilización terapéutica será visitado al menos:

Seleccione una respuesta.



a. a) Cada 20-60 minutos por parte del TCAE



b. b) Cada menos de 20 minutos si el estado clínico del paciente lo requiere.



c. c) No es necesario visitarle.



d. a) y b) son correctas.

Enviar

Question7

Puntos: --/1

El paciente se define como aquel que presenta:

Seleccione una respuesta.



a. Hiperactividad motora y psíquica



b. Enlentecimiento psicomotor



c. Catatonía



d. Trastorno de la personalidad

Enviar

Question8

Puntos: --/1

Entre las causas que pueden desencadenar una agitación encontramos:

Seleccione una respuesta.



a. A) Somnolencia



b. B) Consumo de alcohol y otro tipo de drogas tóxicas o abuso de medicamentos

- c. C) Brote psicótico
- d. B) y C) son correctas

Enviar

Question9

Puntos: --/1

La contención ambiental consiste en:

Seleccione una respuesta.

- a. Manejo del paciente agitado mediante el control del medio ambiente en que tiene lugar la situación para resolver la situación
- b. Evitar que el paciente pase a la acción, sin asumir riesgos, mediante la verbalización de las preocupaciones para favorecer
- c. La aplicación de psicofármacos que provoquen en el paciente una sedación superficial, cuando la contención verbal no s
- d. Es un procedimiento que permite limitar los movimientos del paciente agitado mediante sistemas de inmovilización física, seguridad del paciente y/o la de su entorno

Enviar

Question10

Puntos: --/1

La contención farmacológica consiste en:

Seleccione una respuesta.

- a. Manejo del paciente agitado mediante el control del medio ambiente en que tiene lugar la situación para resolver la situación
- b. Evitar que el paciente pase a la acción, sin asumir riesgos, mediante la verbalización de las preocupaciones para favorecer
- c. La aplicación de psicofármacos que provoquen en el paciente una sedación superficial, cuando la contención verbal no s
- d. Es un procedimiento que permite limitar los movimientos del paciente agitado mediante sistemas de inmovilización física, del paciente y/o la de su entorno

Enviar

Question11

Puntos: --/1

La contención verbal consiste en:

Seleccione una respuesta.

- a. Manejo del paciente agitado mediante el control del medio ambiente en que tiene lugar la situación para resolver la s
  - b. Evitar que el paciente pase a la acción, sin asumir riesgos, mediante la verbalización de las preocupaciones para favo
  - c. La aplicación de psicofármacos que provoquen en el paciente una sedación superficial, cuando la contención verbal n
  - d. Es un procedimiento que permite limitar los movimientos del paciente agitado mediante sistemas de inmovilización fís
- seguridad del paciente y/o la de su entorno

Enviar

Question12

Puntos: --/1

La inmovilización terapéutica consiste en:

Seleccione una respuesta.

- a. Manejo del paciente agitado mediante el control del medio ambiente en que tiene lugar la situación para resolver la situ

- b. Evitar que el paciente pase a la acción, sin asumir riesgos, mediante la verbalización de las preocupaciones para favorecer
- c. La aplicación de psicofármacos que provoquen en el paciente una sedación superficial, cuando la contención verbal no
- d. Es un procedimiento que permite limitar los movimientos del paciente agitado mediante sistemas de inmovilización física, seguridad del paciente y/o la de su entorno.

Enviar

Question13

Puntos: --/1

La inmovilización terapéutica se llevará a cabo con:  
Seleccione una respuesta.

- a. Vendas
- b. Sábanas
- c. Material específico tipo salvafix o segufix
- d. Camisas de fuerza

Enviar

Question14

Puntos: --/1

La meta de la contención verbal es:  
Seleccione una respuesta.

- a. Restablecer el autocontrol, facilitar la exteriorización de sus pensamientos y la implantación de límites de conducta claros
- b. Negociar soluciones imposibles
- c. Interrumpir el discurso del paciente
- d. Decirle al paciente lo que debería y no debería hacer

Enviar

Question15

Puntos: --/1

La posición en la que se inmoviliza al paciente es:  
Seleccione una respuesta.

- a. Decúbito prono (boca abajo)
- b. Decúbito supino (boca arriba)
- c. Decúbito lateral (de lado)
- d. Sentado

Enviar

Question16

Puntos: --/1

La puerta de la habitación de un paciente contenido, permanecerá:  
Seleccione una respuesta.

- a. Abierta
- b. Cerrada
- c. Entreabierta
- d. Cerrada con llave

Enviar

Question17

Puntos: --/1

La vía de administración de fármacos preferente en un paciente agitado es:  
Seleccione una respuesta.

- a. Intramuscular
- b. Sublingual
- c. Intravenosa
- d. Oral

Enviar

Question18

Puntos: --/1

Las características que definen el suicidio auténtico son:  
Seleccione una respuesta.

- a. Gran lealtad del método empleado
- b. Existencia de un plan detallado, con nota de despedida y baja probabilidad de ser descubierto.
- c. Nula crítica del intento, escasos proyectos de futuro y presencia de estados depresivos o psicóticos.
- d. Todas ellas son ciertas.

Enviar

Question19

Puntos: --/1

Las indicaciones de la inmovilización terapéutica son:  
Seleccione una respuesta.

- a. Prevención de lesiones al propio paciente, a otras personas o al entorno.
- b. Para evitar interferencias en el plan terapéutico del propio paciente o de los demás pacientes (la retira de vías, sondas)
- c. Para evitar la fuga del paciente si se considera que existe el riesgo y que el paciente corre peligro, no estando capacitado
- d. Todas son correctas.

Enviar

Question20

Puntos: --/1

Los grupos de riesgo elevado para desarrollar una conducta autolítica son:

Seleccione una respuesta.

- a. Personas de la tercera edad con etiología multifactorial o en situación de duelo.
- b. Inmigrantes o personas encarceladas.
- c. Personas con enfermedad somática.
- d. Todas son ciertas.

Enviar

Question21

Puntos: --/1

Los tipos de contención que existen son:

Seleccione una respuesta.

- a. Contención ambiental y verbal
- b. Contención farmacológica
- c. Aislamiento terapéutico e inmovilización terapéutica
- d. Todas son correctas

Enviar

Question22

Puntos: --/1

Quién toma la decisión de comenzar la contención mecánica o inmovilización terapéutica

Seleccione una respuesta.

- a. A) El vigilante de seguridad
- b. B) El medico responsable del paciente o en su defecto el facultativo de guardia.
- c. C) En caso de urgencia la enfermera está expresamente autorizada a iniciar el procedimiento, debiendo comunicárselo y recibir su conformidad por escrito
- d. b) y c) son correctas.

Enviar

Question23

Puntos: --/1

Señala cuál de estas afirmaciones es cierta:

Seleccione una respuesta.

- a. Se recomienda que ante una agresividad aguda o si el diagnóstico es incierto, se deben utilizar benzodiazepinas solas
- b. Si además de la agitación hay presente sintomatología psicótica, la recomendación indica el uso de benzodiazepinas y antipsicóticos conjuntamente
- c. Ninguna de las opciones es cierta
- d. Las opciones a y b son ciertas.