

Cuidados al niño en los accidentes

Comenzado el sábado, 12 de septiembre de 2020, 11:44

Estado Finalizado

Finalizado en sábado, 12 de septiembre de 2020, 12:14

Tiempo empleado 30 minutos 31 segundos

Puntos 20,00/20,00

Calificación 10,00 de 10,00 (100%)

Comentario - Apto

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

Entre las lesiones focales más frecuentes del TCE se encuentran:

Seleccione una:

- a. Hematoma subdural.
- b. Hematoma epidural.
- c. Hemorragia subaracnoidea.
- d. Todas son correctas. ✓

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

En un box de su servicio de urgencias se encuentra un niño de 10 años al que se le va a realizar una reducción de una fractura de cúbito y radio. ¿Qué fármaco prepararemos para realizar la sedoanalgesia?

Seleccione una:

- a. Clóruro Mórífico.
- b. Naloxona.
- c. Diacepam.
- d. Ketamina. ✓

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

Entre las lesiones focales más frecuentes del TCE se encuentran:

Seleccione una:

- a. Hematoma subdural
- b. Hematoma epidural
- c. Hemorragia subaracnoidea
- d. Todas son correctas. ✓

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre

1,00

Señale la respuesta correcta sobre el hematoma epidural:

Seleccione una:

- a. Colección de sangre por debajo de la duramadre.
- b. El sangrado siempre es de origen venoso y por tanto de crecimiento lento.
- c. El paciente puede presentar un periodo sin síntomas y al cabo de unas horas desarrollar síntomas de alarma. ✓
- d. Este tipo de hematoma no representa una emergencia neuroquirúrgica.

El hematoma epidural es una colección de sangre por ENCIMA de la duramadre. En muchos casos el sangrado es de origen ARTERIAL y por tanto de crecimiento rápido. Horas después del traumatismo pueden aparecer síntomas de alarma como náuseas, vómitos o cefalea, acompañados de síntomas localizadores como debilidad hemicorporal o dilatación pupilar. Este tipo de hematoma es una emergencia neuroquirúrgica, por la necesidad de descompresión por riesgo de hipertensión intracraneal.

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre

1,00

Durante la colocación del tablero espinal ¿quién coordinará la maniobra?

Seleccione una:

- a. El rescatador que se encuentra a los pies del paciente.
- b. El rescatador que se encuentra a la cabeza del paciente. ✓
- c. Cualquiera puede hacerlo.
- d. Ninguna es correcta.

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre

1,00

¿Cuál de los siguientes es el dispositivo indicado para el transporte aéreo?

Seleccione una:

- a. Colchón de vacío. ✓
- b. Tablero espinal.
- c. Camilla de cuchara.
- d. Camilla de la ambulancia.

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre

1,00

La Escala de Coma de Glasgow: Señale la FALSA.

Seleccione una:

- a. Permite predecir el daño neurológico e incluso el pronóstico vital.
- b. Se ha de recoger la puntuación desglosada, del siguiente modo: O4, V5, M6.
- c. La puntuación desglosada valora: respuesta ocular, respuesta sensitiva y respuesta motora. ✓
- d. Se utiliza durante el seguimiento de un paciente, y para el intercambio de información entre profesionales.

Puntuación desglosada: respuesta ocular (O), verbal (V), motora (M), O4, V5, M6.

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre

1,00

¿Qué tipo de analgésico sistémico emplearemos ante un paciente con dolor intenso?

Seleccione una:

- a. Metamizol.
- b. Opioides. ✓
- c. Ibuprofeno.
- d. Midazolam.

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre

1,00

¿Cuál de las siguientes sería una dosis tóxica de paracetamol en niños?

Seleccione una:

- a. 10 ml.
- b. 100 mg.
- c. 140mg/kg. ✓
- d. 80mg/kg.

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre

1,00

¿Qué antídoto administraremos ante una intoxicación por Benzodiazepinas?

Seleccione una:

- a. Flumazenilo. ✓
- b. Naloxona.
- c. N-acetilcisteína.
- d. Carbón activado.

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

¿Cómo clasificamos una quemadura con flictena pero que conserva los folículos pilosos?

Seleccione una:

- a. De primer grado.
- b. De segundo grado B.
- c. De segundo grado A. ✓
- d. De tercer grado.

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

Nos encontramos un paciente, con intoxicación etílica, que ha ingerido, hace menos de una hora, más de 1gr/Kg de alcohol. ¿Qué sería lo indicado en este caso?

Seleccione una:

- a. Administración de Flumaceniolo IV.
- b. Lavado gástrico. ✓
- c. Administración de carbón activado.
- d. Todas son correctas.

El carbón activado no es efectivo. En casos leves, sin alteración del nivel de conciencia: toma de constantes vitales, descartar hipoglucemia, colocar al paciente en decúbito lateral izquierdo y evaluar repetidamente el nivel de conciencia. Si el nivel de etanolemia estimado es mayor de 100mg/dl o la ingesta estimada es mayor de 1gr/kg y mas reciente de una hora, o si existe pérdida de conciencia o de reflejos, estaría indicado el lavado gástrico.

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

Son métodos para evaluar el dolor: Señale la FALSA.

Seleccione una:

- a. Escala de Flacc.
- b. Test de Apgar. ✓
- c. Escala de caras de Wong-Baker.
- d. Escala de Walco y Howite.

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre

1,00

En un paciente con agitación psicomotriz por intoxicación etílica, ¿qué fármaco podemos administrar?

Seleccione una:

- a. Ketamina.
- b. Fentanilo.
- c. Haloperidol. ✓
- d. Tramadol.

Si existe agitación psicomotriz que impide el adecuado manejo del paciente, administrar Haloperidol 2,5mg IM si el paciente es menor de 2 años, o 5mg IM en mayores de 2 años. Ante administración de sedación al paciente o disminución del nivel de conciencia, asegurar siempre la vía aérea.

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre

1,00

¿Cuál de los siguientes NO es una causa frecuente de accidentes en la infancia?

Seleccione una:

- a. Quemaduras.
- b. Caídas.
- c. Accidentes en el trabajo. ✓
- d. Ahogamiento.

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre

1,00

¿Qué es el ahogamiento húmedo?

Seleccione una:

- a. Es el ahogamiento atribuido a laringoespasma que persiste hasta que acontece la muerte por anoxia.
- b. El paciente sobrevive a la inmersión, al menos de forma temporal.
- c. Ahogamiento atribuido a la aspiración de agua a los pulmones (también arena, lodo, vómito...). ✓
- d. Muerte producida por asfixia dentro de un plazo de 72h.

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre

1,00

La estimación de volumen a infundir en el tratamiento de las quemaduras dependerá de:

Seleccione una:

- a. La extensión de las quemaduras.
- b. La profundidad de las quemaduras.
- c. El peso del paciente.
- d. Todas son correctas. ✓

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre

1,00

Ante un paciente hipotenso/hipovolémico, ¿Qué solución debemos administrar?

Seleccione una:

- a. SSF a 20cc/Kg en bolo rápido. ✓
- b. SG5% a 20cc/Kg en bolo rápido.
- c. SSF 500cc en bolo lento.
- d. SSF 500cc en bolo rápido.

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre

1,00

¿Qué analgésico está indicado para el tratamiento del dolor leve?

Seleccione una:

- a. Metamizol.
- b. Paracetamol. ✓
- c. Fentanilo.
- d. Tramadol.

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre

1,00

¿Qué complicaciones podemos encontrar en un paciente con una intoxicación etílica?

Seleccione una:

- a. Hipotermia.
- b. Hipotensión.
- c. Hipoglucemia.
- d. Todas son correctas. ✓

Volver a: Evaluación Sept... ➔