

[Página Principal](#) > [IT.Q003](#) > [Módulo 2. Atención enfermera al final de la vida.](#)

[Prueba de conocimientos Módulo 2](#)

Comenzado el	domingo, 31 de marzo de 2024, 16:01
Estado	Finalizado
Finalizado en	domingo, 31 de marzo de 2024, 16:07
Tiempo empleado	5 minutos 21 segundos
Puntos	19,00/20,00
Calificación	9,50 de 10,00 (95%)
Comentario -	Apto

Pregunta

1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Un método válido para la detección de alteraciones en la deglución es: Señala la respuesta correcta.

Seleccione una:

- a. Test clínico volumen viscosidad (MECV-V). ✓
- b. Test de Lattinen.
- c. MaGill Pain Questionnaire (MPQ).
- d. B y c son correctas.

Pregunta

2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En la mucositis Grado 1 según la clasificación de la OMS. Seleccione la respuesta correcta

Seleccione una:

- a. El paciente sólo tolera líquidos.
- b. El paciente no puede comer nada por las úlceras bucales.
- c. El paciente presenta eritema en la mucosa oral. ✓
- d. El paciente no presenta ningún síntoma ni alteración.

Pregunta

3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Dentro de los cuidados especiales de las úlceras tumorales. Señala la incorrecta.

Seleccione una:

- a. Se debe realizar un lavado minucioso de la herida friccionando para eliminar esfacelos y descontaminar la herida. ✓
 - b. Se puede utilizar metronidazol tópico para el control del mal olor.
 - c. Se puede utilizar apósitos hemostáticos para el control del sangrado.
 - d. Se debe administrar analgesia pautada previa a la cura en úlceras dolorosas.
-

Pregunta

4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En la hipercalcemia tumoral aparecen síntomas como: Señala la respuesta correcta.

Seleccione una:

- a. Anorexia.
 - b. Polidipsia.
 - c. Deshidratación.
 - d. Todas son correctas. ✓
-

Pregunta

5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para el alivio de la xerostomía en el paciente paliativo es recomendable: Seleccione la respuesta correcta.

Seleccione una:

- a. Chupar trocitos de hielo saborizados con zumo de frutas.
 - b. Dar pequeños sorbos frecuentes de bebidas frías.
 - c. Realizar enjuagues con manzanilla con limón.
 - d. Todas son correctas. ✓
-

Pregunta

6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿A qué se refiere el concepto de "dolor total" definido por la Dra. Cicely Saunders? Señala la respuesta correcta.

Seleccione una:

- a. A la suma de los dolores que refiere un paciente.
- b. A la queja del dolor por el paciente y su familia.
- c. A los aspectos físicos, sociales, emocionales y espirituales del dolor. ✓
- d. Al mecanismo, la intensidad y la clasificación del dolor.

Pregunta

7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Entre los síntomas y signos de linfedema nos podemos encontrar: Señala la respuesta correcta.

Seleccione una:

- a. Piel eritematosa, delgada y translúcida.
- b. Hipoestesis, parestesia y alodinia.
- c. Afectación ganglionar tumoral.
- d. Todas son correctas. ✓

Pregunta

8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Entre las complicaciones de la traqueotomía podemos tener: Señala la respuesta correcta.

Seleccione una:

- a. Lesión tumoral en el estoma.
- b. Estenosis.
- c. Hemorragias.
- d. Todas con correctas. ✓

Pregunta

9

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cuál es la vía de elección para la administración de fármacos en el paciente paliativo? Señala la respuesta correcta

Seleccione una:

- a. Intravenosa.
- b. Subcutánea. ✘
- c. Oral.
- d. Rectal.

Pregunta

10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Podemos utilizar en el tratamiento del control de la disnea en el paciente paliativo. Señala la respuesta correcta

Seleccione una:

- a. Opioides como la morfina.
- b. Benzodiazepinas para mitigar la ansiedad y ataques de pánico.
- c. Corticoides en obstrucción de la vía aérea.
- d. Todas son correctas. ✔

Pregunta

11

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Señala la respuesta incorrecta. La expectoración de sangre procedente de las vías respiratorias inferiores donde se produce un volumen de sangrado de 400-600ml /24h:

Seleccione una:

- a. Puede ser causada por infecciones, coagulopatias, carcinoma epidermoide y tratamientos con radioterapia.
- b. Es una hemoptisis leve. ✔
- c. Utilizar toallas, sábanas o paños de color oscuro para reducir el impacto psicológico de ver la sangre.
- d. Se recomienda reposo absoluto semisentado o en decúbito lateral sobre el lado del sangrado si se conoce.

Pregunta

12

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En la obstrucción intestinal el tratamiento puede incluir: Señala la respuesta correcta.

Seleccione una:

- a. Descompresión abdominal mediante sondaje nasogástrico conectado a bolsa.
- b. Ocreotride
- c. Metoclopramida
- d. Todas son correctas. ✓

Pregunta

13

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La enfermera para preservar la higiene del paciente paliativo: Señala la respuesta correcta.

Seleccione una:

- a. Facilitará un baño diario.
- b. El secado de los pliegues debe ser minucioso.
- c. No es preciso evaluar la piel en el aseo.
- d. La respuesta a y b son correctas. ✓

Pregunta

14

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En la Escala Analgésica de la OMS modificada por Dr. Gómez Sancho: Señala la incorrecta.

Seleccione una:

- a. Se progresará dependiendo la respuesta a cada escalón, la escalada dependerá del fallo del escalón anterior.
- b. Se puede ascender del primer al tercer escalón si la intensidad del dolor lo requiere.
- c. Se puede acompañar del uso de coadyudantes en cualquier escalón.
- d. El soporte emocional y de comunicación al paciente y la familia no es tenido en cuenta. ✓

Pregunta

15

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Pablo diagnosticado de cáncer de esófago avanzado presenta disfagia que le impide recibir analgésicos por vía oral, solicitando permanecer en su domicilio. ¿Qué otra vía de administración de fármacos implementaría prioritariamente? Señala la respuesta correcta.

Seleccione una:

- a. Intravenosa.
- b. Intramuscular.
- c. Subcutánea. ✓
- d. Endoscópica

Pregunta

16

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Entre las complicaciones de la disfagia encontramos: Señala la respuesta correcta.

Seleccione una:

- a. Neumonía aspirativas.
- b. Insuficiencia respiratoria.
- c. Deshidratación e insuficiencia renal.
- d. Todas son correctas. ✓

Pregunta

17

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Señale la incorrecta. Ante una crisis de disnea:

Seleccione una:

- a. Mantener al paciente en una postura cómoda.
- b. Administrar la medicación pautada.
- c. Fomentar la respiración eficaz y la utilización de ejercicios de relajación por parte del paciente.
- d. Pedir a los familiares que se salgan de la habitación para no estar junto al paciente. ✓

Pregunta

18

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La xerostomía es un síntoma frecuente en los pacientes paliativos. Entre sus causas están: Señala la respuesta correcta.

Seleccione una:

- a. Fármacos como opioides y corticoesteroides.
- b. Radioterapia.
- c. A y b son correctas. ✓
- d. La hiperhidratación.

Pregunta

19

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Señala la incorrecta. La compresión medula:

Seleccione una:

- a. En muchos casos supone el debut oncológico del paciente.
- b. La demora en la atención puede producir parálisis irreversible e incontinencia de esfínteres.
- c. No supone una emergencia médica. ✓
- d. A y b son correctas.

Pregunta

20

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Entre las terapias complementarias del dolor podemos encontrar. Señala la respuesta correcta.

Seleccione una:

- a. Técnicas de relajación.
- b. Musicoterapia.
- c. Risoterapia.
- d. Todas son correctas. ✓

Actividad previa

◀ Polos de manzanilla para la mucositis

Ir a...

Siguiendo actividad

Caso práctico: Atención enfermera al final de la vida ►

Fundación para el Desarrollo de la Enfermería

 <https://www.fuden.es>