

<b>Comenzado el</b>	jueves, 30 de agosto de 2018, 14:44
<b>Estado</b>	Finalizado
<b>Finalizado en</b>	jueves, 30 de agosto de 2018, 14:54
<b>Tiempo empleado</b>	9 minutos 13 segundos
<b>Puntos</b>	27,00/30,00
<b>Calificación</b>	<b>9,00</b> de 10,00 ( <b>90%</b> )
<b>Comentario -</b>	Una vez realizado el prestes puede iniciar el curso.

#### Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué consideraciones hay que tener con los monitores antes del traslado de un paciente

Seleccione una:

- a. Verificar su correcto funcionamiento.
- b. Todas las opciones son correctas.
- c. Verificar que tiene batería suficiente.
- d. Conocer el nivel de monitorización que requiera el paciente.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las opciones son correctas.

#### Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué es más importante en la priorización del riesgo en el paciente pediátrico

Seleccione una:

- a. El riesgo vital.
- b. El diagnóstico.
- c. El tratamiento.
- d. Ninguna de las opciones es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: El riesgo vital.

#### Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué tiempo se considera recomendable de experiencia para trabajar en las urgencias pediátricas

Seleccione una:

- a. No es necesaria una experiencia previa.
- b. Al menos 3 años tanto para médicos como para enfermería.
- c. 2 años para enfermería y 3 para médicos.
- d. 3 años para enfermería y 2 para médicos.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: 2 años para enfermería y 3 para médicos.

Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Según la escala canadiense el paciente en situación no urgente que generalmente no requiere ninguna exploración diagnóstica y/o terapéutica, corresponde al nivel:  
Seleccione una:

- a. I.
- b. V.
- c. III.
- d. III.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: V.

Pregunta **5**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué características debe tener el carro de parada de una urgencia pediátrica  
Señale la falsa.  
Seleccione una:

- a. Todas las opciones son correctas.
- b. Sólo el personal de enfermería debe conocer el contenido del carro ya que es quien proporciona el material en caso de utilización
- c. El material debe estar fácilmente visible y ordenado
- d. El personal sanitario está obligado a revisarlo periódicamente

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Sólo el personal de enfermería debe conocer el contenido del carro ya que es quien proporciona el material en caso de utilización

Pregunta **6**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué hacemos si después de estimular al niño este responde llorando durante la valoración  
Seleccione una:

- a. No lo moveremos salvo que no esté en un lugar seguro.
- b. Ninguna de las opciones es correcta
- c. Lo colocaremos en posición de seguridad.
- d. Lo llevaremos a un sitio fresco y sin sol directo.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: No lo moveremos salvo que no esté en un lugar seguro.

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué requisitos debe reunir la orden de no reanimar Señale la verdadera.  
Seleccione una:

- a. No es necesario que la orden esté por escrito
- b. Debe ser revisable
- c. Ninguna de las opciones es correcta.
- d. Los médicos responsables son los que tomarán la decisión

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Debe ser revisable

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Si no podemos abrir la vía aérea con la maniobra frente mentón, qué maniobra realizaremos

Seleccione una:

- a. Repetiremos la misma maniobra.
- b. No intentaremos abrir la vía aérea.
- c. Ninguna de las opciones son correctas.
- d. Realizaremos la tracción mandibular.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Realizaremos la tracción mandibular.

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Dentro de los cuidados de enfermería de la tos ferina, indica lo que se debe realizar

Seleccione una:

- a. Colocar al niño incorporado con la barbilla elevada y el cuello en posición neutra.
- b. Poner al niño en aislamiento respiratorio
- c. Todas las opciones son correctas.
- d. Mantener al niño lo más tranquilo posible.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las opciones son correctas.

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Indica cual no es un signo de dificultad respiratoria  
Seleccione una:

- a. Ninguna de las opciones son correctas.
- b. Eupnea.
- c. Tiraje subcostal.
- d. Aleteo nasal.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Eupnea.

Pregunta **11**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La lipotimia, dentro de qué categoría de síncope la podemos englobar  
Seleccione una:

- a. Síncope neurocardiogénico.
- b. Síncope no cardiogénico.
- c. Ninguna de las opciones son correctas.
- d. Síncope cardiogénico.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Síncope neurocardiogénico.

Pregunta **12**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué tipo de laringitis tiene su inicio de forma brusca y de predominio nocturno  
Seleccione una:

- a. Ninguna de las opciones son correctas.
- b. Laringitis aguda viral.
- c. Epiglotitis aguda.
- d. Laringitis espasmódica o estridulosa aguda.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Laringitis espasmódica o estridulosa aguda.

Pregunta **13**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuando un niño agitado llega a la urgencia pediátrica, qué debemos hacer  
Seleccione una:

- a. Dirigirnos a ellos con expresiones de apoyo y entendimiento, intentando que se tranquilice y recupere el autocontrol
- b. Ninguna de las opciones es correcta.

c. Administración de medicación

d. Inmovilización terapéutica

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Dirigirnos a ellos con expresiones de apoyo y entendimiento, intentando que se tranquilice y recupere el autocontrol

Pregunta **14**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En qué etapa de la edad pediátrica es más frecuente la OMA

Seleccione una:

- a. Entre tres meses y tres años
- b. Ninguna de las opciones es correcta.
- c. Mayores de tres años
- d. Menores de tres meses

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Entre tres meses y tres años

Pregunta **15**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué signos no nos indicarían gravedad al valorar a un niño en triaje que acude a urgencias por cefalea

Seleccione una:

- a. Vómitos en escopeta
- b. Puntuación de 4 en la escala de valoración del dolor
- c. Ninguna de las opciones es correcta
- d. Somnolencia

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Puntuación de 4 en la escala de valoración del dolor

Pregunta **16**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Un lactante llega a urgencia con un TCE tras una caída del cambiador, presenta una puntuación de 15 en la escala de Glasgow, cuál sería nuestra actuación

Señale la falsa.

Seleccione una:

- a. Ingreso en la unidad de hospitalización porque es un lactante
- b. Control de las constantes vitales.
- c. Observación durante 6 - 12 horas
- d. Comenzar tolerancia oral

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Ingreso en la unidad de hospitalización porque es un lactante

Pregunta **17**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué analgésico administraríamos a un neonato de 15 días antes de canalizarle una vía venosa

Seleccione una:

- a. Ninguna de las opciones es correcta
- b. Sacarosa
- c. No precisa ninguna analgesia
- d. Paracetamol

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Sacarosa

Pregunta **18**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué debemos evaluar en las vías respiratorias cuando un niño llega a urgencias víctima de un incendio en su domicilio Señale la falsa

Seleccione una:

- a. Frecuencia cardíaca
- b. Carbonización de vellos nasales
- c. Mucosa oral y nasal
- d. Estridor

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Frecuencia cardíaca

Pregunta **19**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué producto elegimos para realizar una descontaminación del tubo digestivo

Seleccione una:

- a. Agua destilada
- b. Suero fisiológico
- c. Carbón activado
- d. Ninguna de las opciones es correcta

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Carbón activado

Pregunta **20**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Según el grado de contaminación qué tipo de herida sería la ocasionada tras una apendicetomía

Seleccione una:

- a. Ninguna de las opciones es correcta
- b. Limpia
- c. Limpia - contaminada
- d. Contaminada

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Limpia - contaminada

Pregunta **21**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la ventilación con bolsa autohinchable. Indica la incorrecta.

Seleccione una:

- a. Colocar al paciente en posición olfateo. Coger la bolsa autohinchable del tamaño adecuado al niño y colocarle la mascarilla apropiada.
- b. Hay que comprobar el correcto funcionamiento de la toma de oxígeno.
- c. Se conecta la bolsa autohinchable a la toma de oxígeno para realizar una hiperoxigenación con una FiO<sub>2</sub> del 50% según indicaciones. Colocar la mascarilla en la cara del paciente cubriendo nariz y boca con la mano dominante abarcando la mascarilla y el mentón del paciente.
- d. Se retira el cabecero de la cama en el caso que el paciente esté en una cama y se separa de la pared.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Se conecta la bolsa autohinchable a la toma de oxígeno para realizar una hiperoxigenación con una FiO<sub>2</sub> del 50% según indicaciones. Colocar la mascarilla en la cara del paciente cubriendo nariz y boca con la mano dominante abarcando la mascarilla y el mentón del paciente.

Pregunta **22**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Indica cuál de los siguientes no es un objetivo para colocar una sonda nasogástrica.

Seleccione una:

- a. Realizar lavado gástrico en caso de intoxicaciones.
- b. Administración de alimentación oral.
- c. Aspiración o drenaje del contenido gástrico con fines diagnósticos o terapéuticos.
- d. Ninguna de las opciones es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Administración de alimentación oral.

Pregunta **23**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Indica qué tenemos que tener en cuenta cuando retiramos un catéter periférico  
Seleccione una:

- a. Observar que el catéter está íntegro, si no lo estuviera hay que notificarlo al personal responsable inmediatamente.
- b. Mantener la presión durante 5-7 minutos. Si el paciente tiene algún problema de coagulación mantenerla durante 15 minutos.
- c. Ninguna de las opciones es correcta.
- d. No es necesario observar el punto de inserción del catéter ya que lo estamos retirando.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Observar que el catéter está íntegro, si no lo estuviera hay que notificarlo al personal responsable inmediatamente.

Pregunta **24**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Para la administración de fármacos por vía respiratoria a través de aerosoles/inhaladores con cámara expansora. Indica lo incorrecto.  
Seleccione una:

- a. Sin separar la mascarilla de la cara del paciente de administra un puff del fármaco mientras contamos hasta 10 a un ritmo normal mientras que el paciente va respirando, cuando hemos terminado podemos o retirar la mascarilla o volver a administrar
- b. Acoplar en el lado contrario la mascarilla del tamaño del paciente y se le coloca en la cara abarcando sólo la nariz.
- c. Se colocará al paciente en decúbito supino.
- d. Acoplar el inhalador a la cámara en posición vertical haciendo forma de L.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Se colocará al paciente en decúbito supino.

Pregunta **25**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Con respecto a las consideraciones que tenemos que tener en cuenta con la familia del paciente a la hora de realizar una técnica. Indica la correcta:  
Seleccione una:

- a. Ninguna de las opciones es correcta.
- b. La presencia de los padres durante la realización del procedimiento debe ser obligatoria en todos los procedimientos; en muchas ocasiones la familia va a ser el mejor apoyo que el niño puede tener durante la realización de la técnica.



- c. Es adecuado pedir ayuda a los familiares para inmovilizar al niño, ya que suponen un apoyo en procedimientos desagradables.
- d. Siempre que el procedimiento lo permita, serán los padres los que lo realicen, como la toma de medicación oral, recogida de muestra de orina, etc.

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Siempre que el procedimiento lo permita, serán los padres los que lo realicen, como la toma de medicación oral, recogida de muestra de orina, etc.

Pregunta **26**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál es la técnica de elección para recoger una muestra de orina cuando los niños no controlan la micción

Seleccione una:

- a. Con bolsa adhesiva perineal.
- b. Por micción espontánea.
- c. Sondaje vesical.
- d. Ninguna de las opciones es correcta.

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Con bolsa adhesiva perineal.

Pregunta **27**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuando un niño con dificultad respiratoria presenta síntomas compensatorios, el niño precisa atención médica rápida para administración de tratamiento. Indica cual no es un mecanismo compensatorio

Seleccione una:

- a. Sudoración.
- b. Ninguna de las opciones son correctas.
- c. Irritabilidad.
- d. Taquipnea.

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Sudoración.

Pregunta **28**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Según la situación vital del paciente para el traslado intrahospitalario (señale la incorrecta):

Seleccione una:

- a. Transporte normal.

- b. Transporte urgente.
- c. Transporte demorable.
- d. Transporte de emergencia.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Transporte normal.

Pregunta **29**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

A qué velocidad debemos realizar las compresiones torácicas en el niño

Seleccione una:

- a. 70 - 90 lpm
- b. Ninguna de las opciones son correctas.
- c. 90 - 100 lpm
- d. 100 - 120 lpm

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 100 - 120 lpm

Pregunta **30**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Al aumento de la frecuencia respiratoria superficial se llama

Seleccione una:

- a. Ninguna de las opciones son correctas.
- b. Taquipnea.
- c. Bradipnea.
- d. Polipnea.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Polipnea.