

Comenzado el jueves, 8 de julio de 2021, 13:54
Estado Finalizado
Finalizado en jueves, 8 de julio de 2021, 14:00
Tiempo empleado 5 minutos 34 segundos
Puntos 20,00/20,00
Calificación **10,00** de 10,00 (**100%**)
Comentario - Apto

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los embriones que no se transfieran podrán tener distintos destinos, señala la opción incorrecta:
Seleccione una:

- a. Criopreservarlos para usarlos más adelante.
- b. Destruirlos.
- c. Donarlos para otra mujer que desee gestación.
- d. Donarlos para investigación.

Retroalimentación

Epígrafe Intervención terapéutica / Embriones criopreservados.
La respuesta correcta es: Destruirlos.

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué diferencia hay entre los fármacos análogos de la GnRH y los antagonistas de la GnRH?
Seleccione una:

- a. Los antagonistas suprimen la liberación de la GnRH, los análogos la potencian.
- b. Los antagonistas se utilizan en tratamientos de reproducción asistida, los análogos no.
- c. Ambas suprimen la liberación de la GnRH, los análogos por bloqueo no competitivo y los antagonistas por bloque competitivo.
- d. Los análogos se utilizan en tratamientos de reproducción asistida, los antagonistas no.

Retroalimentación

Epígrafe Intervención terapéutica / Fecundación in vitro.
La respuesta correcta es: Ambas suprimen la liberación de la GnRH, los análogos por bloqueo no competitivo y los antagonistas por bloque competitivo.

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuántos folículos se buscan conseguir en una estimulación ovárica para una IAH?

Seleccione una:

- a. 1 – 2.
- b. 3 – 4.
- c. 10 – 16.
- d. El mayor número posible.

Retroalimentación

Epígrafe Intervención terapéutica / Inseminación artificial / Inseminación artificial homóloga (IAH).

La respuesta correcta es: 1 – 2.

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué sintomatología no corresponde con el SHO moderado?

Seleccione una:

- a. Perfil hematológico y bioquímico normal
- b. Trombosis venosa y dolor abdominal.
- c. Malestar abdominal, náuseas, distensión abdominal.
- d. Aumento del tamaño de los ovarios, indicios ecográficos de ascitis

Retroalimentación

Epígrafe Intervención terapéutica / Fecundación in vitro / Fecundación in vitro mediante microinyección intracitoplasmática espermática (ICSI).

La respuesta correcta es: Trombosis venosa y dolor abdominal.

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué tasa de embarazo se obtiene en una primera IAH?

Seleccione una:

- a. 10 – 15%.
- b. 15 – 20%.
- c. 20 – 25%.

Od. 25 – 30%.

Retroalimentación

Epígrafe Intervención terapéutica / Inseminación artificial /Inseminación artificial homóloga (IAH).
La respuesta correcta es: 15 – 20%.

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿En qué estadio embrionario se realiza la transferencia?

Seleccione una:

- a. Mórula.
- b. Blastocisto.
- c. Estroma.
- d. Blastómero.

Retroalimentación

Epígrafe Intervención terapéutica / Fecundación in vitro.
La respuesta correcta es: Blastocisto.

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Mediante qué técnica se introduce de manera artificial un espermatozoide seleccionado en un óvulo?

Seleccione una:

- a. IA.
- b. FIV.
- c. ICSI.
- d. Todas son correctas.

Retroalimentación

Epígrafe Intervención terapéutica / Fecundación in vitro / Fecundación in vitro mediante microinyección intracitoplasmática espermática (ICSI).
La respuesta correcta es: ICSI.

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿En cuántas mujeres aparece tras la estimulación hormonal un aumento del tamaño de los ovarios y una sintomatología acentuada similar al de la fase menstrual?

Seleccione una:

- a. En todas.
- b. En el 75%.
- c. En la mitad.
- d. En 1 de cada 3.

Retroalimentación

Epígrafe Intervención terapéutica / Fecundación in vitro / Fecundación in vitro mediante microinyección intracitoplasmática espermática (ICSI).

La respuesta correcta es: En 1 de cada 3.

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

 Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de las siguientes no es indicación para una IAH?

Seleccione una:

- a. Causas desconocidas de infertilidad o esterilidad.
- b. Alteración de la ovulación.
- c. Dificultad de penetración de los espermatozoides en la cavidad uterina.
- d. Obstrucción de trompas.

Retroalimentación

Epígrafe Intervención terapéutica / Inseminación artificial / Inseminación artificial homóloga (IAH).

La respuesta correcta es: Obstrucción de trompas.

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

 Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué desencadena el SHO?

Seleccione una:

- a. La hCG.
- b. La FSH.
- c. La progesterona.
- d. El estradiol.

Retroalimentación

Epígrafe Intervención terapéutica / Fecundación in vitro / Fecundación in vitro mediante microinyección intracitoplasmática espermática (ICSI).

La respuesta correcta es: La hCG.

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Indica cuál de los siguientes no es un fármaco con actuación sobre el ovario usado en TRA:

Seleccione una:

- a. Análogo de la GnRH.
- b. Gonadotropinas.
- c. Antagonista estrogénico.
- d. Anticonceptivos orales.

Retroalimentación

Epígrafe Intervención terapéutica / Fecundación in vitro.

La respuesta correcta es: Análogo de la GnRH.

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de los siguientes no es un riesgo de la inseminación artificial?

Seleccione una:

- a. Embarazo múltiple.
- b. Punción accidental de las asas intestinales.
- c. Embarazo ectópico.
- d. Depresión.

Retroalimentación

Epígrafe Intervención terapéutica / Inseminación artificial / Inseminación artificial con semen de donante (IAD).

La respuesta correcta es: Punción accidental de las asas intestinales.

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué requisitos mínimos debe tener un seminograma para poder optar a una IAH?

Seleccione una:

- a. REM mayor que 3 millones y teratozoospermia menor que 4%.
- b. REM mayor que 3 millones y teratozoospermia mayor que 4%.
- c. REM mayor que 4 millones y teratozoospermia menor que 3%.
- d. REM mayor que 4 millones y teratozoospermia mayor que 3%.

Retroalimentación

Epígrafe Intervención terapéutica / Inseminación artificial /Inseminación artificial homóloga (IAH).
La respuesta correcta es: REM mayor que 3 millones y teratozoospermia mayor que 4%.

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué día post-fecundación se aconseja transferir los embriones en una FIV?

Seleccione una:

- a. Entre el 1º y el 3º.
- b. Entre el 2º y el 6º.
- c. Entre el 4º y el 8º.
- d. Entre el 5º y el 10º.

Retroalimentación

Epígrafe Intervención terapéutica / Fecundación in vitro.
La respuesta correcta es: Entre el 2º y el 6º.

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de los siguientes fármacos de uso habitual en TRA actúa sobre el ovario?

Seleccione una:

- a. Antagonista estrogénico.
- b. Análogos de la GnRH.
- c. Progestágenos.
- d. Estrógenos.

Retroalimentación

Epígrafe Intervención terapéutica / Fecundación in vitro.
La respuesta correcta es: Antagonista estrogénico.

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuántos ciclos de inseminación artificial se aconsejan antes de plantearse otro tipo de tratamiento?

Seleccione una:

- a. 3.
- b. 4.
- c. 5.
- d. 6.

Retroalimentación

Epígrafe Intervención terapéutica / Inseminación artificial / Inseminación artificial homóloga (IAH).

La respuesta correcta es: 4.

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué tasa de embarazo presenta un primer ciclo de FIV?

Seleccione una:

- a. 10 – 25%.
- b. 20 – 30%.
- c. 25 – 50%.
- d. 30 – 65%.

Retroalimentación

Epígrafe Intervención terapéutica / Fecundación in vitro.

La respuesta correcta es: 25 – 50%.

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿En cuál de los siguientes casos habrá mayor riesgo de sufrir SHO?

Seleccione una:

- a. Mujer de 28 años que logra embarazo mediante TRA.
- b. Mujer de 37 años que logra embarazo mediante TRA.
- c. Mujer de 28 años que no logra embarazo mediante TRA.
- d. Mujer de 37 años que no logra embarazo mediante TRA.

Retroalimentación

Epígrafe Intervención terapéutica / Fecundación in vitro / Fecundación in vitro mediante microinyección intracitoplasmática espermática (ICSI).

La respuesta correcta es: Mujer de 28 años que logra embarazo mediante TRA.

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Si en el contexto del estudio de una pareja estéril se sospecha de la presencia de alteraciones genéticas:

Seleccione una:

- a. Se informará a la pareja de que no podrán someterse a una técnica de reproducción asistida.
- b. Se solicitará un cariotipo.
- c. Se aconsejará realizar una FIV con posterior selección de embriones.
- d. Se aconsejará la amniocentesis si hay embarazo.

Retroalimentación

Epígrafe Valoración de la pareja estéril / La primera visita.

La respuesta correcta es: Se solicitará un cariotipo.

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuántos hijos pueden nacer de una misma donante de óvulos?

Seleccione una:

- a. 3.
- b. 6.
- c. 9.
- d. La ley no regula el número de hijos, sino el número de donaciones a realizar por una misma donante.

Retroalimentación

Epígrafe Intervención terapéutica / Donación de ovocitos.

La respuesta correcta es: 6.

[Finalizar revisión](#)