

Exámen Módulo I Agentes Citrostáticos

Revisión del intento 1

[Finalizar revisión](#)

Comenzado el	lunes, 29 de diciembre de 2014, 22:41
Completado el	martes, 27 de enero de 2015, 19:05
Tiempo empleado	28 días 20 horas
Puntos	23/24
Calificación	9.58 de un máximo de 10 (96%)
Comentario -	Buen trabajo - Continuar con el curso

1 Cuál de los siguientes agentes alquilantes no es una mostaza nitrogenada

Puntos:

1

Seleccione una respuesta.

- a. Lomustina ✓
- b. Ifosfamimda ✗
- c. Ciclofosfamida ✗
- d. Clorambucilo ✗

Correcto

Puntos para este envío: 1/1.

2 Cuál de los siguientes tratamientos contra el cáncer es sistémico

Puntos:

1

Seleccione una respuesta.

- a. Cirugía ✗
- b. Radioterapia ✗
- c. Ninguna es correcta ✗
- d. Quimioterapia ✓

Correcto

Puntos para este envío: 1/1.

3 Cuál fue el primer fármaco quimioterápico utilizado en el tratamiento del cáncer

Puntos:

1

Seleccione una respuesta.

- a. Gas sarín ✗
- b. Gas mostaza ✓
- c. Gas pimienta ✗
- d. Gas lacrimógeno ✗

Correcto

Puntos para este envío: 1/1.

4 Cuando una enfermera administra cisplatino, debe prestar especial atención durante el tratamiento:

Puntos:

1

- Seleccione una respuesta.
- a. Ingesta Oral ✘
 - b. Saturación de oxígeno ✘
 - c. Temperatura ✘
 - d. Diuresis ✔

Correcto

Puntos para este envío: 1/1.

5 El agente citostático de elección dependerá de varios factores. Señale la opción correcta:

Puntos:

1

- Seleccione una respuesta.
- a. Pronostico del paciente ✘
 - b. Estadio de la enfermedad ✘
 - c. Todas son correctas ✔
 - d. Tipo de célula cancerígena ✘

Correcto

Puntos para este envío: 1/1.

6 El metotrexato es un agente quimioterápico que incluimos dentro del grupo de citostáticos:

Puntos:

1

- Seleccione una respuesta.
- a. Antimetabolitos ✔
 - b. Productos naturales ✘
 - c. Monoclonales ✘
 - d. Agentes alquilantes ✘

Correcto

Puntos para este envío: 1/1.

7 El tratamiento quimioterápico, en muchos casos suele ir asociado a la administración de otros fármacos. Esta asociación tiene siempre por objetivo

Puntos:

1

- Seleccione una respuesta.
- a. Aumentar la eficacia de la quimioterapia. ✘
 - b. Disminuir el tiempo de administración del ciclo. ✘
 - c. Mantener estable las constantes vitales. ✘
 - d. Prevenir o paliar la toxicidad asociada al tratamiento citostáticos. ✔

Correcto

Puntos para este envío: 1/1.

8 En qué fase del ciclo celular, los cromosomas que contienen el código genético (ADN) se replican para que ambas células nuevas tengan hebras iguales de ADN

Puntos:

1

- Seleccione
- a. Fase G1 ✘

- una respuesta.
- b. Fase S ✓
 - c. Fase G2 ✗
 - d. Fase M ✗

Correcto

Puntos para este envío: 1/1.

9 En qué fase del ciclo celular, la célula origina da lugar a dos nuevas células

Puntos:

1

- Seleccione una respuesta.
- a. Fase G2 ✗
 - b. Fase M ✓
 - c. Fase G1 ✗
 - d. Fase S ✗

Correcto

Puntos para este envío: 1/1.

10 En relación a la administración de la gemcitabina.

Puntos:

1

- Seleccione una respuesta.
- a. Debe administrarse en perfusiones superiores a 180 minutos. ✗
 - b. Debe administrarse en perfusiones entre 60-120 minutos ✗
 - c. Debe administrarse en perfusiones entre 120-180 minutos ✗
 - d. Debe administrarse en perfusiones inferiores a 60 minutos ✓

Correcto

Puntos para este envío: 1/1.

11 En relación al Paclitaxel, señale la opción incorrecta:

Puntos:

1

- Seleccione una respuesta.
- a. Entre otros efectos adversos, destaca la taquicardia y la hipertensión. ✓
 - b. Se debe administrar con filtro de partículas de 0,2 micras. ✗
 - c. Se debe acompañar con premedicación ✗
 - d. Esta indicado en el tratamiento del cáncer de pulmón no microcitico ✗

Incorrecto

Puntos para este envío: 0/1.

12 En relación al rituximab, señale la opción correcta:

Puntos:

1

- Seleccione una respuesta.
- a. Su uso está indicado en el Linfoma de Hodking ✗
 - b. Entre sus efectos secundarios frecuentes se encuentra la hipotermia ✗
 - c. Entre sus efectos adversos frecuentes se encuentra la hipotensión ✓
 - d. La velocidad de infusión es continua a lo largo de todo el tratamiento ✗

Correcto

Puntos para este envío: 1/1.

13 Entre las causas más frecuentes que ocasionan anemia en el paciente con tratamiento quimioterápico se encuentran:

Puntos:
1

- Seleccione una respuesta.
- a. Hemorragias. ✘
 - b. El propio tumor. ✘
 - c. Todas son correctas ✔
 - d. Un déficit nutricional, a consecuencia del propio tratamiento quimioterápico ✘

Correcto

Puntos para este envío: 1/1.

14 José María, es un paciente de 74 años de edad al que el oncólogo le acaba de diagnosticar un cáncer de colon. El facultativo decide administrar quimioterapia de forma previa a un tratamiento quirúrgico. Esto se denominaría:

Puntos:
1

- Seleccione una respuesta.
- a. Quimioterapia de inducción ✔
 - b. Quimioterapia adyuvante. ✘
 - c. Radioquimioterapia concomitante ✘
 - d. Poliquimioterapia ✘

Correcto

Puntos para este envío: 1/1.

15 La 6-tioguarina es un quimioterápico, que cuando se administra por vía oral se debe administrar.

Puntos:
1

- Seleccione una respuesta.
- a. Se debe administrar con el estómago vacío, ✔
 - b. 10 minutos antes de las comidas ✘
 - c. Se debe administrar con el estómago lleno. ✘
 - d. Se debe administrar durante ingesta de alimentos. ✘

Correcto

Puntos para este envío: 1/1.

16 La quimioterapia, es un tratamiento tóxico que suele ir acompañado de efectos secundarios. Si dichos efectos secundarios se producen en los días o semanas siguientes a la administración del tratamiento, hablamos de una aparición

Puntos:
1

- Seleccione una respuesta.
- a. Inmediata ✘
 - b. Temprana ✔
 - c. Diferida ✘
 - d. Tardía ✘

Correcto

Puntos para este envío: 1/1.

17 Para qué tipo de tumores está indicado el tratamiento con metotrexato. Señale la opción incorrecta.

Puntos:

1

Seleccione una respuesta.

- a. Páncreas ✓
- b. Leucemias ✗
- c. Pulmón ✗
- d. Mama ✗

Correcto

Puntos para este envío: 1/1.

18 Qué precauciones debemos tener con la administración de la citarabina:

Puntos:

1

Seleccione una respuesta.

- a. Todas las opciones de respuesta son falsas ✗
- b. No tiene antídoto ante una extravasación ✗
- c. Se debe proteger de la luz durante la administración ✓
- d. Es un fármaco irritante. ✗

Correcto

Puntos para este envío: 1/1.

19 Señale la opción correcta, en relación a la administración de citostáticos:

Puntos:

1

Seleccione una respuesta.

- a. Hepatopatías o nefropatías pueden condicionar la dosis de agente citostático a administrar. ✓
- b. La dosis de agente citostático a administrar se calcula siempre con el peso del paciente. ✗
- c. La dosis de agente citostático a administrar es la misma para todos los pacientes. ✗
- d. El estado nutricional no interfiere en el cálculo de la dosis de agente citostático a administrar ✗

Correcto

Puntos para este envío: 1/1.

20 Señale la opción incorrecta en relación a la ciclofosfamida

Puntos:

1

Seleccione una respuesta.

- a. Es un agente alquilante ✗
- b. No requiere hidratación ✓
- c. Uno de sus efectos adversos es la fibrosis tisular ✗
- d. Está indicado para tratar el cáncer de mama ✗

Correcto

Puntos para este envío: 1/1.

21 Si durante la administración de Fluorouracilo, apareciera estomatitis o esófagofaringitis, se debería

Puntos:

1

Seleccione una respuesta.

- a. Administrar antieméticos ✗

- b. Interrumpir el tratamiento. ✓
- c. Administrar antipiréticos ✗
- d. Colocar en decúbito supino. ✗

Correcto

Puntos para este envío: 1/1.

22 Si el paciente que está bajo nuestro cuidado sufre una reacción de hipersensibilidad, nuestra primera actuación será:

Puntos:
1

- Seleccione una respuesta.
- a. Administrar oxígeno ✗
 - b. Avisar al médico ✗
 - c. Abrir el carro de parada ✗
 - d. Detener la infusión. ✓

Correcto

Puntos para este envío: 1/1.

23 Si se administra un quimioterápico, con el objetivo de disminuir y controlar la evolución de la enfermedad, aumentando la esperanza de vida y la calidad de vida, cuando la curación no es posible, se denomina:

Puntos:
1

- Seleccione una respuesta.
- a. Curación ✗
 - b. Supervivencia ✗
 - c. Control ✓
 - d. Paliativo ✗

Correcto

Puntos para este envío: 1/1.

24 Una de las mayores complicaciones que se pueden dar en la administración de la quimioterapia es la neutropenia. Ante un paciente con neutropenia el profesional de enfermería debe:

Puntos:
1

- Seleccione una respuesta.
- a. Evitar el contacto con cualquier ser humano para evitar infecciones ✗
 - b. Vigilar la aparición de signos de infección ✓
 - c. Si presenta tos, colocar aislamiento inverso. ✗
 - d. Mantener en dieta absoluta hasta recuperar los niveles leucocitarios ✗

Correcto

Puntos para este envío: 1/1.

Finalizar revisión