

Exámen Módulo V Agentes Citostáticos

Revisión del intento 1

Finalizar revisión

Comenzado el	miércoles, 28 de enero de 2015, 17:58
Completado el	miércoles, 28 de enero de 2015, 18:00
Tiempo empleado	2 minutos 33 segundos
Puntos	24/24
Calificación	10 de un máximo de 10 (100%)
Comentario -	Buen trabajo - Continúe con el curso

1 Al iniciar el tratamiento con quimioterapia, la enfermera debe hacer una serie de recomendaciones nutricionales. Señale la opción incorrecta

Puntos:
1

- Seleccione una respuesta.
- ☐ a. Para aumentar el aporte proteico y calórico es útil añadir a los platos principales: queso rallado, clara de huevo, leche en polvo, harina de almendra etc. ✖
 - ☐ b. Procurar beber de 6 a 8 vasos de líquido. ✖
 - ☐ c. Realizar de 5 a 6 comidas al día ✖
 - ☒ d. Intentar realizar comidas de poco volumen y que sean poco nutritivas. ✔

Correcto

Puntos para este envío: 1/1.

2 Alguno de los efectos adversos más frecuentes de la quimioterapia es la astenia. En relación a la astenia señale la opción de respuesta incorrecta

Puntos:
1

- Seleccione una respuesta.
- ☐ a. Se aconseja llevar a cabo las principales actividades en los momentos que se encuentre menos fatigado. ✖
 - ☐ b. Evitar aquéllas actividades poco importantes, aunque conviene incentivar las que le ayuden a distraerse. ✖
 - ☐ c. Revisar el horario de las actividades para intentar programarlas según la tolerancia. ✖
 - ☒ d. Disminuir el tiempo de descanso entre actividades. ✔

Correcto

Puntos para este envío: 1/1.

3 Alguno de los efectos adversos más frecuentes de la quimioterapia es la fiebre. En relación a la fiebre señale la opción de respuesta incorrecta

Puntos:
1

- Seleccione ☐ a. Si la temperatura es superior a 38 consultar con su medico ✖

una respuesta.

- ☐ b. Evitar la toma de antitérmicos si tiene previsto consultar a un servicio médico. ❌
- ☐ c. Puede ser un efecto secundario o un proceso infeccioso subyacente ❌
- ☒ d. Se recomienda tomar la temperatura de forma sistémica ✔️

Correcto

Puntos para este envío: 1/1.

4

Puntos:
1

Algunos de los efectos adversos más frecuentes de la quimioterapia es la anorexia. En relación a la anorexia señale la opción de respuesta correcta

Seleccione una respuesta.

- ☐ a. Se define como el aumento de apetito. ❌
- ☐ b. Se aconseja servir poca cantidad de comida en platos pequeños. ❌
- ☐ c. No es necesario controlar el peso del paciente. ❌
- ☒ d. Puede condicionar la calidad de vida del paciente ✔️

Correcto

Puntos para este envío: 1/1.

5

Puntos:
1

Alteración de los labios y/o tejidos blandos de la cavidad oral. Es la definición, De qué diagnóstico de enfermería

Seleccione una respuesta.

- ☐ a. Deterioro de la integridad oral ❌
- ☐ b. Deterioro de la dentición ❌
- ☒ c. Deterioro de la mucosa oral ✔️
- ☐ d. Deterioro de la piel ❌

Correcto

Puntos para este envío: 1/1.

6

Puntos:
1

Cúal de las siguientes escalas es de gran utilidad para valorar la autoestima

Seleccione una respuesta.

- ☐ a. Escala de Karnofsky ❌
- ☐ b. Escala de Barthel ❌
- ☐ c. Escala de Edmonton ❌
- ☒ d. Escala de Rosenberg ✔️

Correcto

Puntos para este envío: 1/1.

7

Puntos:
1

Cúal de las siguientes escalas es de gran utilidad para valorar las actividades básicas de la vida diaria

Seleccione una respuesta.

- ☐ a. Escala de Norton ❌
- ☒ b. Escala de Barthel ✔️
- ☐ c. Escala EVA ❌
- ☐ d. Escala de Karnofsky ❌

Correcto

Puntos para este envío: 1/1.

8 Cúal de los siguientes agentes citostáticos tiene un riesgo emetógeno alto

Puntos:

1

Seleccione una respuesta.

- ☐ a. Vincristina ✖
- ☐ b. Vinblastina ✖
- ☒ c. Cisplatino ✔
- ☐ d. Metrotrexato ✖

Correcto

Puntos para este envío: 1/1.

9 En relación a la sexualidad del paciente que está bajo tratamiento de agentes citostáticos. Señale la opción incorrecta

Puntos:

1

Seleccione una respuesta.

- ☐ a. Se recomienda utilizar siempre preservativo (especialmente en las primeras 48 horas después del tratamiento) ✖
- ☐ b. El varón puede experimentar una mayor dificultad para mantener la erección ✖
- ☐ c. En el caso de las mujeres, se puede alterar el ciclo menstrual ✖
- ☒ d. Es normal experimentar un aumento de la libido ✔

Correcto

Puntos para este envío: 1/1.

10 Entre las principales recomendaciones que se deben realizar al paciente con problemas con alopecia se encuentran. Señale la opción correcta

Puntos:

1

Seleccione una respuesta.

- ☐ a. Cortar el cabello previamente al tratamiento para reducir su peso y disminuir su caída. ✖
- ☐ b. Evitar lacas, espumas o tintes que debilitan el pelo. ✖
- ☐ c. No utilizar secadores ni pasadores ni cualquier elemento ✖
- ☒ d. Todas las opciones de respuesta son correctas. ✔

Correcto

Puntos para este envío: 1/1.

11 Entre las principales recomendaciones que se deben realizar al paciente con problemas con estreñimiento se encuentran. Señale la opción incorrecta

Puntos:

1

Seleccione una respuesta.

- ☒ a. Disminuir el ejercicio físico. ✔
- ☐ b. Administración de enemas y laxantes prescritos por el médico. ✖
- ☐ c. Abundante ingesta hídrica. ✖
- ☐ d. Dieta rica en residuos o fibra con aumento de ingesta de líquidos. ✖

Correcto

12 Entre las principales recomendaciones que se deben realizar al paciente con problemas con xerostomía se encuentran. Señale la opción correcta

Puntos:
1

Seleccione una respuesta.

- ☐ a. Disminuir la ingesta de líquidos. ✖
- ☒ b. Chupar trozos de frutas ácidas como piña, naranja, limón, o cubitos de hielo. ✔
- ☐ c. No tomar manzanilla fría con limón, realizar enjuagues o aplicarla sobre la mucosa mediante torundas. ✖
- ☐ d. Masticar chicle con azúcar. ✖

Correcto

Puntos para este envío: 1/1.

13 Evita mirar tocar una parte del cuerpo, respuesta verbal negativa, cambios en la participación social y rechazo a confirmar cambios reales son las características definitorias del diagnóstico de enfermería:

Puntos:
1

Seleccione una respuesta.

- ☐ a. Depresión ✖
- ☐ b. Baja autoestima situacional ✖
- ☐ c. Baja autoestima ✖
- ☒ d. Alteración de la imagen corporal ✔

Correcto

Puntos para este envío: 1/1.

14 La emesis retardada es aquella que se presenta

Puntos:
1

Seleccione una respuesta.

- ☐ a. Entre las 24 horas y las 72 horas tras la administración del tratamiento ✖
- ☐ b. Entre las 24 horas y los 5 días tras la administración del tratamiento ✖
- ☐ c. Entre las 24 horas y los 4 días tras la administración del tratamiento ✖
- ☒ d. Entre las 24 horas y los 7 días tras la administración del tratamiento ✔

Correcto

Puntos para este envío: 1/1.

15 Entre las medidas terapéuticas encaminadas a mejorar los síntomas y prevenir las complicaciones de la mucositis se encuentra:

Puntos:
1

Seleccione una respuesta.

- ☒ a. Todas son correctas ✔
- ☐ b. Ingesta de alimentos fríos y blandos. ✖
- ☐ c. Lavados con suero fisiológico. ✖
- ☐ d. Tratas con bicarbonato sódico o colutorio antiséptico. ✖

Correcto

Puntos para este envío: 1/1.

16

Puntos:
1

Los agentes citostáticos se pueden eliminar por distintas vías, por ello es necesario aplicar una serie de medidas higiénicas. Señale la acción incorrecta

Seleccione una respuesta.

- ☐ a. Lavar la ropa por separado de la del resto de su familia. ✖
- ☒ b. Utilizar cubiertos desechables ✔
- ☐ c. Evitar compartir los objetos de aseo personal. ✖
- ☐ d. Lavarse siempre minuciosamente las manos después de ir al baño. ✖

Correcto

Puntos para este envío: 1/1.

17

Puntos:
1

Muchos de los agentes quimioterápicos, pueden ocasionar náuseas y vómitos al paciente, por ello, la enfermera deberá realizar una serie de recomendaciones adelantándose a estos síntomas. Entre otras actuaciones el paciente en caso de presentar náuseas, deberá

Seleccione una respuesta.

- ☒ a. Evitar las grasas. ✔
- ☐ b. Buscar un ambiente agradable y con olores fuertes ✖
- ☐ c. Comer mucha cantidad ✖
- ☐ d. Disminuir la ingesta de líquidos. ✖

Correcto

Puntos para este envío: 1/1.

18

Puntos:
1

Qué recomendaciones debe realizar el profesional de enfermería con respecto a los cuidados generales de la boca, antes de iniciar el tratamiento de quimioterapia

Seleccione una respuesta.

- ☐ a. Utilizar un cepillo de cerda dura. ✖
- ☐ b. Utilizar enjuagues con base de alcohol. ✖
- ☐ c. Tomar alimentos muy calientes. ✖
- ☒ d. Antes de ir al dentista, consultar de forma previa con el médico responsable del tratamiento quimioterápico. ✔

Correcto

Puntos para este envío: 1/1.

19

Puntos:
1

Señala la opción de respuesta incorrecta en relación al rash cutáneo que aparece como efecto no deseado en algunos tratamientos con agentes citostáticos

Seleccione una respuesta.

- ☐ a. Habitualmente suele manejarse mediante tratamientos tópicos. ✖
- ☐ b. Utilizar crema hidratante corporal con pH neutro para prevenir y mejorar la sequedad. ✖
- ☒ c. Afeitarse con cuchillas desechables. ✔
- ☐ d. Erupción cutánea más o menos confinada a las áreas seboreicas. ✖

Correcto

Puntos para este envío: 1/1.

20

Si un paciente presenta diarrea posterior a la administración de citostáticos, la enfermera

Puntos: 1
1 previamente le habrá recomendado... Señale la opción de respuesta incorrecta

- Seleccione una respuesta.
- ☐ a. Comer poca cantidad y de forma frecuente, evitando comidas ricas en fibra ✖
 - ☐ b. Controlar el peso y el estado de la piel. ✖
 - ☐ c. Aumentar la ingesta de líquidos (pequeños sorbos). ✖
 - ☒ d. Tomar lácteos para aumentar la flora intestinal. ✔

Correcto

Puntos para este envío: 1/1.

21
Puntos: 1
Si un paciente presenta eritema, edema y úlceras dolorosas en la cavidad bucal que le permiten la ingesta oral. Diremos que el paciente presenta

- Seleccione una respuesta.
- ☐ a. Mucositis Grado I ✖
 - ☒ b. Mucositis Grado II ✔
 - ☐ c. Mucositis grado IV ✖
 - ☐ d. Mucositis grado III ✖

Correcto

Puntos para este envío: 1/1.

22
Puntos: 1
Si un paciente sufre diarrea y presenta complicaciones hemodinámicas que amenaza su vida. Estamos hablando de una diarrea

- Seleccione una respuesta.
- ☐ a. Diarrea Grado III ✖
 - ☐ b. Diarrea Grado V ✖
 - ☐ c. Diarrea Grado II ✖
 - ☒ d. Diarrea Grado IV ✔

Correcto

Puntos para este envío: 1/1.

23
Puntos: 1
Un paciente con tratamiento con capecitabina acude a nuestra consulta de enfermería y nos refiere dolor en manos y pies que le dificultan las actividades de la vida diaria. En la observación la superficie de la piel no está afectada. Señale la opción que no proceda

- Seleccione una respuesta.
- ☐ a. Le recomendaremos usar ropas amplias y zapatos cómodos. ✖
 - ☐ b. Le recomendaremos no arrodillarse durante largos periodos de tiempo. ✖
 - ☐ c. Le recomendaremos utilizar frío local en las zonas afectadas. ✖
 - ☒ d. El paciente presenta una eritrodistesia palmoplantar grado I ✔

Correcto

Puntos para este envío: 1/1.

24
Puntos: 1
Un paciente que padece hipertension arterial y que está con tratamiento quimioterápico, debe tomarse la tensión arterial

Seleccione una respuesta.

- ☒ a. 3 veces a la semana ✓
- ☐ b. 4 veces a la semana ✗
- ☐ c. 2 veces a la semana ✗
- ☐ d. 1 vez a la semana ✗

Correcto

Puntos para este envío: 1/1.

Finalizar revisión

Usted se ha autenticado como [JUAN MARTINEZ MORALES](#) ([Salir](#))

AMAC