

Marcar pregunta

Texto informativo

Eres un DUE de un centro de salud en una población alejada, en la que el hospital más cercano está a unos 50 km y la ambulancia municipal no está operativa ya que son las fiestas patronales del pueblo de al lado. Te envían a valorar un accidente laboral de un agricultor con caída desde una cosechadora (unos 3-4 metros de altura), arrollamiento del propio vehículo (cosechadora) al caer del mismo y eres el recurso más cercano. Acabas de hacer un curso de politraumatizado por lo que sabes que....

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En el 1º pico de mortalidad del paciente politraumatizado se suele producir por:

Seleccione una:

- a. Lesiones órganos vitales
- b. Hemo-neumotórax
- c. Shock séptico
- d. Hemorragias cerebrales

Retroalimentación

normalmente corazón, cerebro y/o laceración de grandes vasos

La respuesta correcta es: Lesiones órganos vitales

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Fase de la actuación ante un politraumatizado que consiste en “detección de aquellos problemas que ponen en riesgo la vida del paciente y resolverlos de inmediato”

Seleccione una:

- a. Valoración secundaria
- b. Tratamiento definitivo
- c. Exposición neurológica
- d. Valoración primaria

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Valoración primaria

Pregunta 3

Incorrecta

Puntuación 0,00 sobre 1,00

[Marcar pregunta](#)

Enunciado de la pregunta

En la valoración de la vía aérea en la valoración primaria, que maniobra no realizaremos

Seleccione una:

- a. Intubación orotraqueal
- b. Colocar collarín cervical
- c. Retirada de cuerpo extraño en vía aérea
- d. A y b son incorrectas

Retroalimentación

en valoración primaria realizaremos maniobras esenciales con estricto control de eje cuello-cabeza y permeabilidad de la vía aérea, como elevación mandibular, retirada de cuerpo extraño, tubo de Guedel...

La respuesta correcta es: A y b son incorrectas

Pregunta 4

Correcta

Puntuación 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Ante un paciente con apertura ocular a la presión (~dolor), retira el miembro como respuesta motora y orientado como respuesta verbal, tendrá un GCS de:

Seleccione una:

- a. 10
- b. 11
- c. 12
- d. 9

Retroalimentación

AO=2, RM=4, RV=5

La respuesta correcta es: 11

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la estabilización del paciente politraumatizado, cuando valoramos la ventilación, debemos identificar posibles patologías como.... Señale la falsa:

Seleccione una:

- a. Neumotórax a tensión o abierto
- b. Hemotórax
- c. Crepitantes bibasales
- d. A y b son falsas

Retroalimentación

este ítem no se valorará en la estabilización

La respuesta correcta es: Crepitantes bibasales

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la reposición de volumen en el paciente traumatizado, señala lo correcto:

Seleccione una:

- a. En extrahospitalaria administrar cristaloides para mantener pulso central hasta que haya control de hemorragia
- b. En hospital priorizar reposición amplia de volumen hasta el control de hemorragia
- c. Administrar ácido tranexámico IV para prevenir la coagulopatía
- d. A y c son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: A y c son correctas

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de estas actividades no debe incluir la valoración secundaria?

Seleccione una:

- a. Historia clínica
- b. Compresión de hemorragias
- c. Examen físico al detalle
- d. Toma de constantes

Retroalimentación

es más propio de valoración primaria

La respuesta correcta es: Compresión de hemorragias

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la valoración de cuello (valoración secundaria) es falso:

Seleccione una:

- a. Retiraremos collarín cervical ante un TCE sin inmovilizar previamente con manos
- b. Buscar cortes, hemorragias
- c. Buscar desviación traqueal, enfisema subcutáneo
- d. Mover en bloque

Retroalimentación

se puede retirar el collarín para valorar siempre se inmovilice bimanualmente durante la valoración

La respuesta correcta es: Retiraremos collarín cervical ante un TCE sin inmovilizar previamente con manos

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la valoración del abdomen realizaremos...

Seleccione una:

- a. Auscultación del peristaltismo
- b. Percusión de abdomen, buscando zonas dolorosas
- c. Inspección buscando distensión abdominal, hematoma o heridas
- d. Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la valoración de la pelvis del paciente politraumatizado, señala la incorrecta:

Seleccione una:

- a. Realizar en pacientes con fractura de pelvis evidente
- b. Inmovilizar con faja pélvica o dispositivo compatible si se dispone
- c. No realizar exploración en pacientes en shock
- d. Todas son falsas

Retroalimentación

No se debe realizar en pacientes con fractura evidente, ya que puede aumentar el sangrado

La respuesta correcta es: Realizar en pacientes con fractura de pelvis evidente