

[Página Principal](#) / [Mis cursos](#) / [A-DC-PNCP](#)

/ [Módulo IV: Vía subcutánea. Otros tratamientos en CP. Urgencias en CP y Atención en situaciones especiales: pacientes no oncológicos y pacientes pediátricos.](#)
/ [Exámen Módulo IV: Vía subcutánea. Otros tratamientos en CP...](#)

Comenzado el jueves, 7 de diciembre de 2017, 14:37

Estado Finalizado

Finalizado en jueves, 7 de diciembre de 2017, 14:50

Tiempo empleado 13 minutos 35 segundos

Puntos 17,00/20,00

Calificación 8,50 de 10,00 (85%)

Comentario - Buen trabajo - Continúe con el curso

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Con respecto a los infusores subcutáneos y los fármacos:

Seleccione una:

- a. Permite mezclar fármacos y administrarlos a la vez. ✓
- b. Se diluye con agua bidestilada.
- c. No se deben utilizar en paliativos.
- d. Se utilizan muy poco.

La respuesta correcta es: Permite mezclar fármacos y administrarlos a la vez.

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Cuando queramos realizar la sedación paliativa, elijeremos como sedante:

Seleccione una:

- a. Propofol,
- b. Fenobarbital.
- c. Midazolam. ✓
- d. Morfina.

La respuesta correcta es: Midazolam.

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Cuando tengamos que realizar una sedación paliativa, tenemos obligatoriamente que:

Seleccione una:

- a. Instaurarla sin el consentimiento del paciente.
- b. Se realizará a petición del paciente.
- c. Solicitar el consentimiento informado. ✓
- d. Realizarla para aliviar cualquier sintoma.

La respuesta correcta es: Solicitar el consentimiento informado.

Pregunta 4

Incorrecta

Puntúa 0,00
sobre 1,00

De las siguientes sustancias irritantes subcutáneas, ¿cuál es la única que utilizamos?

Seleccione una:

- a. Metamizol.
- b. Diazepam. ✗
- c. Clorpromazina.
- d. Metoclopramida.

La respuesta correcta es: Metoclopramida.

Pregunta 5

Incorrecta

Puntúa 0,00
sobre 1,00

Dentro de los cuidados paliativos en niños, no es cierto que:

Seleccione una:

- a. Los niños tienen mayor tolerancia al dolor.
- b. La asistencia, siempre que sea posible, se realizará en el hogar.
- c. El tratamiento del duelo comienza desde el diagnóstico de la enfermedad.
- d. No debemos inframedicar. ✘

La respuesta correcta es: Los niños tienen mayor tolerancia al dolor.

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Dentro de los efectos secundarios que produce la radioterapia paliativa no se encuentra:

Seleccione una:

- a. Náuseas.
- b. Aumento del dolor. ✔
- c. Alteración de la mucosa.
- d. Quemaduras sobre la piel

La respuesta correcta es: Aumento del dolor.

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

El manejo de la información en los niños tiene las siguientes características:

Seleccione una:

- a. Debe ser dada sólo por el especialista.
- b. Se debe suministrar toda la información al niño, a los padres y a los hermanos si los hubiera. ✔
- c. No debemos adaptar el lenguaje para que los niños entiendan.
- d. Se consiente la conspiración de silencio.

La respuesta correcta es: Se debe suministrar toda la información al niño, a los padres y a los hermanos si los hubiera.

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

En el caso de la administración de quimioterápicos como tratamiento paliativo obtenemos los siguientes beneficios en cuanto al dolor.

Seleccione una:

- a. En el dolor de cuello en los casos de cáncer de cuello.
- b. En todos los anteriores. ✔
- c. En el dolor de cabeza debido a cáncer de cabeza.
- d. En el caso de cáncer de mama avanzado.

La respuesta correcta es: En todos los anteriores.

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

En el caso de una hemorragia masiva, no es correcto que realicemos la siguiente acción:

Seleccione una:

- a. No ingresar nunca al paciente. ✔
- b. Utilizar paños oscuros para disminuir el impacto del sangrado.
- c. Informar a la familia cuando exista la posibilidad de que ocurra.
- d. Valorar la posibilidad de claudicación familiar si ocurre.

La respuesta correcta es: No ingresar nunca al paciente.

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

En la radioterapia paliativa pueden aparecer efectos secundarios como:

Seleccione una:

- a. Alteración del gusto.
- b. Dermatitis aguda.
- c. Enteritis aguda.
- d. Todas las anteriores. ✔

La respuesta correcta es: Todas las anteriores.

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Hasta que volumen podemos administrar de forma subcutánea por una hipodermocclisis en un día

Seleccione una:

- a. No hay cantidades fijas.
- b. Todo lo que necesitemos.
- c. Hasta 1500 ml. ✓
- d. Hasta 1000 ml.

La respuesta correcta es: Hasta 1500 ml.

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

La hipodermocclisis no presenta:

Seleccione una:

- a. Tiene un volumen máximo de administración al día.
- b. Un mecanismo de acción rápido. ✓
- c. Da reacciones locales.
- d. Falta de conocimiento de los profesionales.

La respuesta correcta es: Un mecanismo de acción rápido.

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

La sedación paliativa se clasifica según:

Seleccione una:

- a. Todas son correctas. ✓
- b. La intensidad.
- c. El objetivo
- d. La temporalidad

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

La vía alternativa a la oral en los pacientes terminales es:

Seleccione una:

- a. La vía transdérmica.
- b. La vía intramuscular.
- c. La vía intravenosa.
- d. La vía subcutánea. ✓

La respuesta correcta es: La vía subcutánea.

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

La vía de administración de fármacos por orden de elección en el paciente paliativo es:

Seleccione una:

- a. Intramuscular, intravenosa, subcutánea y oral.
- b. Subcutánea, oral, intramuscular e intravenosa.
- c. Intravenosa, oral, subcutánea e intramuscular.
- d. Oral, subcutánea, intravenosa e intramuscular. ✓

La respuesta correcta es: Oral, subcutánea, intravenosa e intramuscular.

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Las ventajas del uso de la vía intravenosa son:

Seleccione una:

- a. Ninguna de las anteriores. ✓
- b. No es necesario el ingreso hospitalario.
- c. Fácil detección de complicaciones.
- d. Técnica fácil y poco agresiva.

La respuesta correcta es: Ninguna de las anteriores.

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

No es causa que pueda provocar una urgencia paliativa:

Seleccione una:

- a. La claudicación familiar.
- b. Dolor.
- c. Crisis de angustia.
- d. Anorexia. ✓

La respuesta correcta es: Anorexia.

Pregunta 18

Incorrecta

Puntúa 0,00
sobre 1,00

No es indicación de vía subcutánea:

Seleccione una:

- a. Náuseas y vómitos incontrolados.
- b. Diarrea.
- c. Síndrome de malabsorción. ✗
- d. Sedación paliativa.

La respuesta correcta es: Diarrea.

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Podemos clasificar a un enfermo de EPOC como un enfermo terminal cuando se cumpla que:

Seleccione una:

- a. Enfermedad pulmonar crónica severa documentada con disnea de reposo y con escasa o nula respuesta a los broncodilatadores.
- b. Hipoxemia de pO₂ de 55 mm de Hg o hipercapnia de pCO₂ de 50 mm de Hg.
- c. Progresión de la enfermedad.
- d. Todas las anteriores. ✓

La respuesta correcta es: Todas las anteriores.

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Son complicaciones habituales de la vía subcutánea:

Seleccione una:

- a. Reacción local.
- b. Extracción accidental.
- c. Infección local.
- d. Todas las anteriores. ✓

La respuesta correcta es: Todas las anteriores.