

[Página Principal](#) ▶ [Mis cursos](#) ▶ [DF-CEU](#) ▶

Módulo 4: Actualización en cuidados en las urgencias pediátricas y gineco-obstétricas ▶

[Caso práctico: Actualización en cuidados en las urgencias pediátricas y gineco-obstétricas](#)

Comenzado el	lunes, 26 de diciembre de 2022, 13:15
Estado	Finalizado
Finalizado en	lunes, 26 de diciembre de 2022, 13:21
Tiempo empleado	6 minutos 20 segundos
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)
Comentario -	Apto



Niño de 11 años que llega a urgencias del centro de salud, porque tras jugar al fútbol y estando sentado en el banquillo del campo, presenta de forma súbita un episodio de pérdida de conciencia de menos de un minuto de duración, del cual se recupera espontáneamente.

Exploración física: Peso 35 kg. Aceptable estado general, aunque está nervioso. Color normal de piel y mucosas. Bien hidratado. Eupneico, no signos de dificultad respiratoria. Auscultación pulmonar: normal. Pulsos palpables y simétricos. Auscultación cardíaca: no soplos. Abdomen: no megalias. Consciente, no signos de focalidad. Frecuencia cardíaca: 60 lpm. Tensión arterial 96/59 mmHg.

Imagen 1: QT largo/prolongado




Imagen 2: Torsade de pointes





Imagen 3: FV



Pregunta

1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál sería tu actitud?

Seleccione una:

- a. Valorar ABCD, realizar breve historia clínica, hacer ECG y avisar al pediatra ✓
- b. Canalizar una vía venosa.
- c. Realizar una anamnesis detallada.
- d. Avisar al pediatra

Pregunta

2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

A la vista del ECG/EKG (Imagen 1) (Descripción de la imagen del ECG/EKG: intervalo QT prolongado) actuaremos

Seleccione una:

- a. Informando a la familia junto con el pediatra y tranquilizándola, pues se confirma el síncope vasovagal
- b. Remitir a un centro hospitalario para estudio por cardiología. ✓
- c. Canalizar una vía venosa y expandir con suero fisiológico
- d. Marcharnos dejando que el alta la de el pediatra

Pregunta

3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Tras la realización del 1er ECG, el niño está muy nervioso, se queja de que se encuentra cada vez peor, está más pálido y refiere tener palpitaciones de forma frecuente y dolor retroesternal. Por lo que volvemos a poner el ECG (Imagen 2: "Torsade de Pointes" o torcimiento de puntas, taquicardia ventricular polimorfa). Inmediatamente vuelve a tener otro episodio de pérdida de conciencia con una duración mayor que el anterior. Tiene mala perfusión periférica, no es posible tomar la tensión arterial y los pulsos son débiles ¿Qué tratamiento es el indicado?

Seleccione una:

- a. Amiodarona IV
- b. Adrenalina 0,01 mg/Kg
- c. Cardioversión eléctrica a 1Julio/kg ✓
- d. Sulfato de magnesio 40mg/kg

Pregunta

4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Mientras se canaliza una vía periférica para administrar sedación previa a la cardioversión, el paciente comienza con peor perfusión periférica, cambia el ritmo el electrocardiograma (Imagen 3: FV) y realiza una apnea con cianosis, ¿Qué hacemos?

Seleccione una:

- a. Realizar desfibrilación a 4 Julios/kg ✓
- b. Realizar desfibrilación a 2 Julios/kg
- c. Terminar de canalizar la vía y administrar amiodarona.
- d. Adrenalina

Pregunta

5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el siguiente paso a dar?

Seleccione una:

- a. Intubación OT
- b. Adrenalina
- c. Avisar al 112, pedir apoyo SVA ✓
- d. Sulfato de magnesio 40mg/kg

Pregunta

6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Tras 5 ciclos o 2 minutos

Seleccione una:

- a. Reevaluar ritmo ✓
- b. Avise otra vez al 112
- c. Informar a los padres
- d. Hacer otro ECG

Pregunta

7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Las adrenalinas se podrán administrar

Seleccione una:

- a. Cada 5-10 minutos con dosis 0,01 mg/kg
 - b. Cada 3-5 minutos con dosis 0,01 mg/kg ✓
 - c. Cada 3-5 minutos dosis de 1 mg
 - d. Cada 5-10 minutos con dosis 1 mg/kg
-

Pregunta

8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La amiodarona se administrará

Seleccione una:

- a. Tras la 1ª descarga
- b. Tras la 2ª descarga
- c. Tras la 3ª y 5ª descarga ✓
- d. Tras la 2ª y 6ª descarga

Pregunta

9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La dosis de la amiodarona será

Seleccione una:

- a. 5mg
- b. 5 mg/kg ✓
- c. 5ml
- d. 50 mg/kg

Pregunta

10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para reponer volumen usaremos

Seleccione una:

- a. SSF 0,9 % o Ringer 20 ml/kg ✓
- b. SGDx 5% en Y con SSF 0,9 %
- c. Ringer Lactato 50 ml/kg máximo 300 ml hora
- d. Gelafundina

Actividad previa

◀ Prueba de conocimientos 4

Ir a...

Siguiente actividad

Satisfacción del alumnado al finalizar la acción formativa ▶

Fundación para el Desarrollo de la Enfermería

 <https://www.fuden.es>