

[Página Principal](#) [IT.Q003](#) [Módulo 2. Atención enfermera al final de la vida.](#)

Caso práctico: Atención enfermera al final de la vida

Comenzado el	lunes, 25 de marzo de 2024, 10:14
Estado	Finalizado
Finalizado en	lunes, 25 de marzo de 2024, 10:24
Tiempo empleado	9 minutos 58 segundos
Puntos	5,00/5,00
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)
Comentario -	Apto

Información

Luisa, mujer de 69 años, diagnosticada de Cáncer de mama, en fase terminal en la actualidad (con presencia de metástasis hepáticas, pulmonares y cerebrales, siendo descartado más tratamiento quirúrgico y médico de tipo curativo). Finalizada radioterapia holocraneal para tratamiento de las metástasis cerebrales de manera paliativa.

Desde el punto de vista funcional precisa ayuda personal y de dispositivos para la movilización, para actividades básicas como el aseo y vestido. Con empeoramiento de su situación limitada cama -sillón.

Ingresa en planta de hospitalización por mal control del dolor por úlcera tumoral en mama derecha con mal olor, dolor y sangrado.

Pregunta

1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Ante la presencia de dolor, que escala de valoración utilizarías. Señala la correcta.

Seleccione una:

- a. Escala de Andersen.
- b. Escala Analógica Visual.
- c. A y b son correctas.
- d. Todas son correctas. ✓

Pregunta

2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Según la clasificación cronológica el dolor puede ser. Señala la respuesta incorrecta.

Seleccione una:

- a. Dolor agudo.
- b. Dolor Irruptivo.
- c. Dolor neuropático.✓
- d. Dolor fin de dosis.

Pregunta

3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el tercer escalón de la escalera analgésica de la OMS se encuentran: Señala la respuesta correcta.

Seleccione una:

- a. Los opioides potentes.✓
- b. Los opioides débiles.
- c. Los AINES.
- d. Todas son correctas.

Pregunta

4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Señala la respuesta correcta respecto a las úlceras tumorales.

Seleccione una:

- a. No se debe desbridar por alta vascularización del tejido y riesgo de sangrado.
- b. Ante sangrado en sábana o puntos sangrantes aplicar varilla de nitrato de plata o alginato.
- c. Ante hemorragias cuantiosas usar gasas impregnadas en adrenalina 1:1000, ácido traxenámico o ácido aminocaproico y ejercer presión sobre la zona sangrante.
- d. Todas son correctas.✓

Pregunta

5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Antidepresivos, anticonvulsionantes, relajantes musculares, benzodiacepinas y corticoides forman parte de:
Señala la respuesta correcta.

Seleccione una:

- a. Técnicas invasivas para el control del dolor.
- b. Primer escalón de la escala analgésica.
- c. Fármacos analgésicos coadyuvantes. ✓
- d. Segundo escalón de la escala analgésicas.

Actividad previa

◀ Prueba de conocimientos Módulo 2

Ir a...

Fundación para el Desarrollo de la Enfermería

 <https://www.fuden.es>