

<b>Comenzado el</b>	lunes, 20 de abril de 2020, 12:18
<b>Estado</b>	Finalizado
<b>Finalizado en</b>	lunes, 20 de abril de 2020, 12:23
<b>Tiempo empleado</b>	5 minutos 20 segundos
<b>Puntos</b>	20,00/20,00
<b>Calificación</b>	<b>10,00</b> de 10,00 ( <b>100%</b> )
<b>Comentario -</b>	<b>Apto</b>

### Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué requisitos tiene que tener un buen collarín cervical?

Seleccione una:

- ☐ a. Flexible
- ☐ b. Orificio posterior
- ☒ c. Apoyo mentoniano
- ☐ d. Todas son correctas

Retroalimentación

el collarín debe ser rígido, apoyo mentoniano y orificio anterior

La respuesta correcta es: Apoyo mentoniano

### Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La mortalidad en el 3º pico en el paciente politraumatizado es de:

Seleccione una:

- ☐ a. Aproximadamente 30%
- ☐ b. Aproximadamente 50%
- ☒ c. Aproximadamente 20%
- ☐ d. Aproximadamente 80%

Retroalimentación

en el 1º pico 50%, 2º pico 30% y 3º pico 20%

La respuesta correcta es: Aproximadamente 20%

### Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En caso de paciente politraumatizado, la valoración de la respiración en la valoración primaria, que actividades debemos realizar:

Seleccione una:

- ☐ a. Oxigenoterapia si precisa
- ☐ b. Evaluar respiración
- ☐ c. Explorar tórax buscando asimetrías
- ☒ d. Todas son correctas

Retroalimentación

junto con el cuello buscando heridas, desviación traqueal...

La respuesta correcta es: Todas son correctas

### Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Para valorar la zona hepática lo buscaremos en:

Seleccione una:

- ☐ a. Hipogastrio
- ☐ b. Fosa iliaca derecha
- ☐ c. Fosa iliaca izquierda
- ☒ d. Hipocondrio derecho

Retroalimentación

es la zona abdominal en la que se encuentra el hígado

La respuesta correcta es: Hipocondrio derecho

**Pregunta 5**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Está indicado el sondaje vesical antes del traslado al centro hospitalario en el paciente politraumatizado en caso de:

Seleccione una:

- ☐ a. Sangre en meato urinario
- ☐ b. Equimosis perineal
- ☐ c. Hematoma escrotal
- ☒ d. Ninguna es correcta

Retroalimentación

son las contraindicaciones del sondaje vesical en el politraumatizado

La respuesta correcta es: Ninguna es correcta

**Pregunta 6**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué asociación ha estandarizado el tratamiento del paciente politraumatizado?

Seleccione una:

- ☐ a. American Nurse Association
- ☐ b. European Resuscitation Council
- ☐ c. American Heart Association
- ☒ d. American College of Surgeons

Retroalimentación

American College of Surgeons es el órgano que ha estandarizado

La respuesta correcta es: American College of Surgeons

**Pregunta 7**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la valoración de la circulación de la valoración primaria se debe valorar... señale la falsa:

Seleccione una:

- ☒ a. Respuesta pupilar
- ☐ b. Relleno capilar
- ☐ c. Color de la piel
- ☐ d. Nivel de conciencia

Retroalimentación

la respuesta pupilar se valorará en la valoración neurológica

La respuesta correcta es: Respuesta pupilar

**Pregunta 8**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la aplicación de Celox®, ¿cuál de estas actuaciones son correctas?

Seleccione una:

- ☐ a. Cubrir la herida y presionar en “this side up”
- ☒ b. Secar la herida, cubrir con gránulos y presionar
- ☐ c. Vendaje por el extremo suelto en la herida y tapar con el resto
- ☐ d. Colocar almohadilla sobre la herida y envolver la venda elástica alrededor de la extremidad o parte del cuerpo lesionado

Retroalimentación

se debe abrir el envase, secar con gasas, cubrir con gránulos, y presionar durante 5 minutos

La respuesta correcta es: Secar la herida, cubrir con gránulos y presionar

#### Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La mortalidad en el 2º pico en el paciente politraumatizado es de:

Seleccione una:

- ☒ a. Aproximadamente 30%
- ☐ b. Aproximadamente 50%
- ☐ c. Aproximadamente 20%
- ☐ d. Aproximadamente 80%

Retroalimentación

en el 1º pico 50%, 2º pico 30% y 3º pico 20%

La respuesta correcta es: Aproximadamente 30%

#### Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿cuál es el primer paso ante una hemorragia exanguinante?:

Seleccione una:

- ☒ a. Compresión directa con gasas y compresas
- ☐ b. Uso de hemostáticos
- ☐ c. Torniquete
- ☐ d. Vendaje israelí

Retroalimentación

la primera actuación será comprimir durante por lo menos 3 minutos

La respuesta correcta es: Compresión directa con gasas y compresas

### Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Una hemorragia de grado II nos dará los siguientes signos:

Seleccione una:

- ☐ a. FC>120 lpm, pérdida 1500-2000 cc
- ☒ b. FC menor a 100 lpm, pérdida 750-1500cc, FR20-30 rpm
- ☐ c. FC menor a 100, pérdida menor a 750 cc, FR menor a 15 rpm
- ☐ d. FC mayor a 140 lpm, pérdida mayor a 2000 cc, FR mayor a 35 rpm

Retroalimentación

La respuesta correcta es: FC menor a 100 lpm, pérdida 750-1500cc, FR20-30 rpm

### Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la valoración secundaria del tórax ¿cuál de estas actividades no realizaremos?

Seleccione una:

- ☐ a. Inspeccionar pared anterior y lateral
- ☒ b. Evitar girar al paciente para valorar la pared posterior, aunque sea en bloque
- ☐ c. Valorar parrilla costal y esternón
- ☐ d. Auscultación de ambos campos pulmonares

Retroalimentación

se puede girar en bloque al paciente siempre que la situación y estabilidad del paciente lo permita

La respuesta correcta es: Evitar girar al paciente para valorar la pared posterior, aunque sea en bloque

### Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La mortalidad en el 1º pico en el paciente politraumatizado es de:

Seleccione una:

- ☐ a. Aproximadamente 30%
- ☒ b. Aproximadamente 50%
- ☐ c. Aproximadamente 20%
- ☐ d. Aproximadamente 80%

Retroalimentación

en el 1º pico 50%, 2º pico 30% y 3º pico 20%

La respuesta correcta es: Aproximadamente 50%

### Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En el 3º pico de mortalidad del paciente politraumatizado se suele producir por:

Seleccione una:

- ☐ a. Lesiones órganos vitales
- ☐ b. Hemo-neumotórax
- ☐ c. Laceración de grandes vasos
- ☒ d. Shock séptico

Retroalimentación

en los primeros días o semanas de ingreso en unidades de cuidados críticos es la valoración primaria, valorando ABCDE

La respuesta correcta es: Shock séptico

### Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Donde se debe realizar la valoración secundaria del paciente inestable y sabiendo que puede retrasar el diagnóstico:

Seleccione una:

- ☐ a. En la ambulancia en los primeros 10 minutos
- ☒ b. Es más propio de hospital
- ☐ c. Durante el traslado
- ☐ d. En el lugar del accidente

Retroalimentación

siempre que no retrase el traslado del paciente se podría realizar en ambulancia, pero es más propio del hospital

La respuesta correcta es: Es más propio de hospital

### Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En el 2º pico de mortalidad del paciente politraumatizado se suele producir por:

Seleccione una:

- ☐ a. Lesiones órganos vitales
- ☒ b. Hemo-neumotórax
- ☐ c. Laceración de grandes vasos
- ☐ d. Shock séptico

Retroalimentación

la llamada hora de oro, hemorragias cerebrales, hemo-neumotórax, roturas hepáticas o esplénicas, fracturas, shock hipovolémico.

La respuesta correcta es: Hemo-neumotórax

**Pregunta 17**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La presencia de pulso femoral indica una presión arterial de por lo menos:

Seleccione una:

- ☐ a. 60 mmHg
- ☐ b. 65 mmHg
- ☒ c. 70 mmHg
- ☐ d. 80 mmHg

Retroalimentación

70 mm Hg nos indica

La respuesta correcta es: 70 mmHg

**Pregunta 18**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la valoración de cabeza y cara (valoración secundaria), no debemos valorar:

Seleccione una:

- ☐ a. Cuero cabelludo buscando contusiones
- ☐ b. Zona facial buscando heridas
- ☐ c. Valoración pupilar
- ☒ d. Todas son correctas

Retroalimentación

junto con valoración de oídos, nariz, boca

La respuesta correcta es: Todas son correctas

**Pregunta 19**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Mediante la auscultación pulmonar y cardiaca, podremos descubrir las siguientes lesiones, señale la falsa:

Seleccione una:

- ☒ a. Fracturas costales
- ☐ b. Hemotórax
- ☐ c. Taponamiento cardiaco
- ☐ d. Neumotórax

Retroalimentación

Las fracturas costales se valorarán mediante la palpación del tórax

La respuesta correcta es: Fracturas costales

**Pregunta 20**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de estos fármacos es un antifibrinolítico?

Seleccione una:

- ☒ a. Ácido tranexámico
- ☐ b. Protomplex©
- ☐ c. Octaplex©
- ☐ d. Fibrinógeno

Retroalimentación

el resto son procoagulantes

La respuesta correcta es: Ácido tranexámico