

Actualización en cuidados en el paciente politraumatizado

Comenzado el	martes, 21 de abril de 2020, 18:16
Estado	Finalizado
Finalizado en	martes, 21 de abril de 2020, 18:32
Tiempo empleado	15 minutos 57 segundos
Puntos	20,00/20,00
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)
Comentario - Apto	

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Mediante la auscultación pulmonar y cardiaca, podremos descubrir las siguientes lesiones, señale la falsa:

Seleccione una:

- a. Fracturas costales ✓
- b. Hemotórax
- c. Taponamiento cardiaco
- d. Neumotórax

Las fracturas costales se valorarán mediante la palpación del tórax

La respuesta correcta es: Fracturas costales

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Donde se debe realizar la valoración secundaria del paciente inestable y sabiendo que puede retrasar el diagnóstico:

Seleccione una:

- a. En la ambulancia en los primeros 10 minutos
- b. Es más propio de hospital ✓
- c. Durante el traslado
- d. En el lugar del accidente

siempre que no retrase el traslado del paciente se podría realizar en ambulancia, pero es más propio del hospital

La respuesta correcta es: Es más propio de hospital

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué requisitos tiene que tener un buen collarín cervical?

Seleccione una:

- a. Flexible
- b. Orificio posterior
- c. Apoyo mentoniano ✓
- d. Todas son correctas

el collarín debe ser rígido, apoyo mentoniano y orificio anterior

La respuesta correcta es: Apoyo mentoniano

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

¿Qué asociación ha estandarizado el
tratamiento del paciente
politraumatizado?

Seleccione una:

- a. American Nurse Association
- b. European Resuscitation
Council
- c. American Heart Association
- d. American College of
Surgeons ✓

American College of Surgeons es el
órgano que ha estandarizado

La respuesta correcta es: American
College of Surgeons

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Una hemorragia de grado II nos dará los siguientes signos:

Seleccione una:

- a. FC > 120 lpm, pérdida 1500-2000 cc
- b. FC menor a 100 lpm, pérdida 750-1500cc, FR 20-30 rpm ✓
- c. FC menor a 100, pérdida menor a 750 cc, FR menor a 15 rpm
- d. FC mayor a 140 lpm, pérdida mayor a 2000 cc, FR mayor a 35 rpm

Clasificación de las hemorragias en función de la pérdida sanguínea

Grado	I	II	III	IV
Pérdida sanguínea (ml)	< 750	750-1500	1500-2000	>2000
Pérdida sanguínea (%)	<15	15-30	30-40	>40
TAs (mmHg)	Normal	Normal	Disminuida	Disminuida
FC (lat/min)	<100	<100	>120	>140
FR (resp/min)	14-20	20-30	30-40	>35
Estado mental	Ansioso	Agitado	Confundido	Letárgico

La respuesta correcta es: FC menor a 100 lpm, pérdida 750-1500cc, FR 20-30 rpm

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

En la valoración secundaria del tórax
¿cuál de estas actividades no
realizaremos?

Seleccione una:

- a. Inspeccionar pared anterior y lateral
- b. Evitar girar al paciente para valorar la pared posterior, aunque sea en bloque ✓
- c. Valorar parrilla costal y esternón
- d. Auscultación de ambos campos pulmonares

se puede girar en bloque al paciente siempre que la situación y estabilidad del paciente lo permita

La respuesta correcta es: Evitar girar al paciente para valorar la pared posterior, aunque sea en bloque

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La presencia de pulso femoral indica una presión arterial de por lo menos:

Seleccione una:

- a. 60 mmHg
- b. 65 mmHg
- c. 70 mmHg ✓
- d. 80 mmHg

70 mm Hg nos indica

La respuesta correcta es: 70 mmHg

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La mortalidad en el 3º pico en el paciente politraumatizado es de:

Seleccione una:

- a. Aproximadamente 30%
- b. Aproximadamente 50%
- c. Aproximadamente 20% ✓
- d. Aproximadamente 80%

en el 1º pico 50%, 2º pico 30% y 3º pico 20%

La respuesta correcta es:
Aproximadamente 20%

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

En la aplicación de Celox®, ¿cuál de estas actuaciones son correctas?

Seleccione una:

- a. Cubrir la herida y presionar en “this side up”
- b. Secar la herida, cubrir con gránulos y presionar ✓
- c. Vendaje por el extremo suelto en la herida y tapar con el resto
- d. Colocar almohadilla sobre la herida y envolver la venda elástica alrededor de la extremidad o parte del cuerpo lesionado

se debe abrir el envase, secar con gasas, cubrir con gránulos, y presionar durante 5 minutos

La respuesta correcta es: Secar la herida, cubrir con gránulos y presionar

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

En el 2º pico de mortalidad del paciente politraumatizado se suele producir por:

Seleccione una:

- a. Lesiones órganos vitales
- b. Hemo-neumotórax ✓
- c. Laceración de grandes vasos
- d. Shock séptico

la llamada hora de oro, hemorragias cerebrales, hemo-neumotórax, roturas hepáticas o esplénicas, fracturas, shock hipovolémico.

La respuesta correcta es: Hemo-neumotórax

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿cuál es el primer paso ante una hemorragia exanguinante?:

Seleccione una:

- a. Compresión directa con gasas y compresas ✓
- b. Uso de hemostáticos
- c. Torniquete
- d. Vendaje israelí

la primera actuación será comprimir durante por lo menos 3 minutos

La respuesta correcta es: Compresión directa con gasas y compresas

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La mortalidad en el 1º pico en el paciente politraumatizado es de:

Seleccione una:

- a. Aproximadamente 30%
- b. Aproximadamente 50% ✓
- c. Aproximadamente 20%
- d. Aproximadamente 80%

en el 1º pico 50%, 2º pico 30% y 3º pico 20%

La respuesta correcta es:
Aproximadamente 50%

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de estos fármacos es un antifibrinolítico?

Seleccione una:

- a. Ácido tranexámico ✓
- b. Protomplex©
- c. Octaplex©
- d. Fibrinógeno

el resto son procoagulantes

La respuesta correcta es: Ácido tranexámico

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

En el 3º pico de mortalidad del paciente politraumatizado se suele producir por:

Seleccione una:

- a. Lesiones órganos vitales
- b. Hemo-neumotórax
- c. Laceración de grandes vasos
- d. Shock séptico ✓

en los primeros días o semanas de ingreso en unidades de cuidados críticos es la valoración primaria, valorando ABCDE

La respuesta correcta es: Shock séptico

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

En la valoración de la circulación de la valoración primaria se debe valorar... señale la falsa:

Seleccione una:

- a. Respuesta pupilar ✓
- b. Relleno capilar
- c. Color de la piel
- d. Nivel de conciencia

la respuesta pupilar se valorará en la valoración neurológica

La respuesta correcta es: Respuesta pupilar

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La mortalidad en el 2º pico en el paciente politraumatizado es de:

Seleccione una:

- a. Aproximadamente 30% ✓
- b. Aproximadamente 50%
- c. Aproximadamente 20%
- d. Aproximadamente 80%

en el 1º pico 50%, 2º pico 30% y 3º pico 20%

La respuesta correcta es:
Aproximadamente 30%

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Para valorar la zona hepática lo buscaremos en:

Seleccione una:

- a. Hipogastrio
- b. Fosa iliaca derecha
- c. Fosa iliaca izquierda
- d. Hipocondrio derecho ✓

es la zona abdominal en la que se encuentra el hígado

La respuesta correcta es: Hipocondrio derecho

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

En caso de paciente politraumatizado, la valoración de la respiración en la valoración primaria, que actividades debemos realizar:

Seleccione una:

- a. Oxigenoterapia si precisa
- b. Evaluar respiración
- c. Explorar tórax buscando asimetrías
- d. Todas son correctas ✓

junto con el cuello buscando heridas, desviación traqueal...

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Está indicado el sondaje vesical antes del traslado al centro hospitalario en el paciente politraumatizado en caso de:

Seleccione una:

- a. Sangre en meato urinario
- b. Equimosis perineal
- c. Hematoma escrotal
- d. Ninguna es correcta ✓

son las contraindicaciones del sondaje vesical en el politraumatizado

La respuesta correcta es: Ninguna es correcta

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

En la valoración de cabeza y cara (valoración secundaria), no debemos valorar:

Seleccione una:

- a. Cuero cabelludo buscando contusiones
- b. Zona facial buscando heridas
- c. Valoración pupilar
- d. Todas son correctas ✓

junto con valoración de oídos, nariz, boca

La respuesta correcta es: Todas son correctas

[Volver a: Módulo 2: Atenc... ➔](#)