

CUIDADOS ESTANDARIZADOS AL PACIENTE PALIATIVO PARA AUXILIARES DE ENFERMERÍA. A DISTANCIA (P19)

Área personal > CFC > AUXILIARES DE ENFERMERÍA - TCAE > P19 > Evaluación del supuesto > Supuestos prácticos

Comenzado el domingo, 25 de agosto de 2019, 17:03

Estado Finalizado

Finalizado en domingo, 25 de agosto de 2019, 17:04

Tiempo empleado 1 minutos 4 segundos

Puntos 4,89/5,00

Calificación 9,78 de 10,00 (98%)


Comentario - **iii APTO iii**

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Asigne una puntuación del dolor de acuerdo con la escala de Wong-Baker para niños:



Respuesta correcta

Jamón cocido.

Charcutería en general

Todos los que tomaba antes

En puré

Según tolerancia

Mantequilla, aceite.

Todos en cantidad moderada.

Pregunta 2

Parcialmente
correcta

Puntúa 0,89 sobre
1,00

Arrastrar hasta el texto las palabras que correspondan:

Alimentos.	Recomendables.	No aconsejables.	
Lácteos.	Leche descremada, yogurt.	Pan integral, excepto en estreñimiento.	
Queso.	Frescos, fermentados y cocidos.	En caso de intolerancia introducir poco a poco en la preparación de guisos.	
Charcutería.		Pimienta y pimentón	
	✓	✓	
Pescados y mariscos.	A la plancha o al vapor.	Salsas.	
Huevos.	Fritos, Duros, escalfados o tortilla	Fritos.	
Cereales y féculas.	Harina, arroz, sémola, pasta, patatas.		
		✗	
Legumbres.		Según tolerancia personal.	
	✓		
Verduras.	Cocidas o en ensalada.	Según tolerancia personal.	
Frutas.	Crudas, cocidas, muy maduras y peladas.		
		✓	
Materias grasas.		Frituras y fritos.	
	✓		
Productos azucarados.	Mayores	Chocolate, helados, pastelería de crema.	
	✓	Menores	
		Malignos	
Bebidas.	Agua, té y café ligero, infusiones, vino en cantidad moderada.	Todas las bebidas con gas o muy frías.	
Parotidectomía Superficial	Extrafacial		
Pan y derivados.	Pan fresco, bizcotes, galletas.		
		✓	
Condimentos.	Todos los que tomaba antes.		
		✓	
	Parotidectomía Externa	Benignos	
Exteriores	Interiores	Generales	
Específicas	Parotidectomía Interna complicada	Intermedios	

Respuesta parcialmente correcta.

Ha seleccionado correctamente 8.

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

Arrastrar hasta el texto las palabras que correspondan:

Las glándulas salivares se dividen en yEl carcinoma mucoepidermoide está dentro de los tumores

En la parótida, la cirugía de elección suficiente para lesiones pequeñas y de bajo grado es la

Respuesta correcta

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

Ordene según tiempo de aparición las etapas de la adaptación a la muerte:

Shock ✓Negación ✓Enfado ✓Pacto ✓Depresión ✓Aceptación ✓

Respuesta correcta

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

Establezca la Etapa del Carcinoma colorrectal de acuerdo con la extensión del mismo:

Células cancerosas solo en tejidos superficiales del colon

Etapa 0 ▾



Células cancerosas fuera de la capa más interna del colón a la segunda y tercera capas, y complica la pared interior del colon pero no la exterior

Etapa I ▾



Células cancerosas diseminadas fuera del colon a los tejidos vecinos pero no a los ganglios linfáticos.

Etapa II ▾



Células cancerosas diseminadas fuera del colon a los tejidos vecinos y a los ganglios linfáticos vecinos, pero no a otros órganos.

Etapa III ▾



Células cancerosas diseminadas fuera del colon y por otros órganos del cuerpo.

Etapa IV ▾



Respuesta correcta