

## Cuidados de práctica avanzada en urgencias y emergencias

Comenzado el lunes, 11 de noviembre de 2019, 13:35

Estado Finalizado

Finalizado en martes, 10 de diciembre de 2019, 19:32

Tiempo empleado 29 días 5 horas

Calificación 7,00 de 10,00 (70%)

### Pregunta 1

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre  
1,00

En un paciente politraumatizado debemos sospechar que está obstruida la vía aérea en los siguientes casos:

Seleccione una:

- ☐ a. Pacientes inconscientes
- ☒ b. Pacientes con movimientos respiratorios mínimos o con gran trabajo respiratorio X
- ☒ c. Las opciones a y b son ciertas
- ☐ d. Ninguna de las anteriores

La respuesta correcta es: Las opciones a y b son ciertas

### Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre  
1,00

Los signos de una vía aérea obstruida pueden ser:

Seleccione una:

- ☐ a. Estridor, ronquidos, afonía e inadecuada alineación traqueal
- ☐ b. Bajo nivel de conciencia, taquipnea y uso de la musculatura respiratoria accesoria
- ☐ c. Tiraje, escasa o nula expansión torácica y cianosis
- ☒ d. Todas son correctas ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 3

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre

1,00

Respecto al manejo del TCE, señale lo falso:

Seleccione una:

- ☒ a. Lo prioritario es mantener la vía aérea, la ventilación y la oxigenación ✕
- ☐ b. En muchos casos es causa de hipotensión en el paciente traumatizado
- ☐ c. Es fundamental prevenir la lesión secundaria sobre todo en las fases iniciales
- ☐ d. Está contraindicada la hiperventilación profiláctica

La respuesta correcta es: En muchos casos es causa de hipotensión en el paciente traumatizado

Pregunta 4

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre

1,00

Respecto al paciente politraumatizado todas son ciertas, excepto:

Seleccione una:

- ☒ a. Los equipos de emergencias solo pueden actuar sobre el segundo pico de mortalidad del trauma ✕
- ☐ b. Todos los politraumatizados pueden sobrevivir con lo que se reanimará agresivamente a todos los pacientes con lesiones vitales
- ☐ c. La PCR del politraumatizado cursa con AESP o DEM
- ☐ d. Todo paciente politraumatizado tiene una lesión cervical mientras no se demuestre lo contrario

La respuesta correcta es: Todos los politraumatizados pueden sobrevivir con lo que se reanimará agresivamente a todos los pacientes con lesiones vitales

^

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre  
1,00

Usted es el enfermero de un equipo de emergencias. Cuando valora el nivel de conciencia de un paciente que ha sufrido un traumatismo craneoencefálico determina que abre los ojos ante estímulos dolorosos, que emite palabras inapropiadas y realiza una flexión anormal de decorticación. ¿Qué puntuación resulta en la escala de coma de Glasgow?:

Seleccione una:

- ☐ a. 7
- ☐ b. 9
- ☐ c. 6
- ☒ d. 8 ✓

La respuesta correcta es: 8

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre  
1,00

Con respecto al control de la vía aérea en el paciente politraumatizado todo lo siguiente es cierto, excepto:

Seleccione una:

- ☒ a. Para realizar apertura de vía aérea es de elección la tracción mandibular que se realizará por axioma en todo paciente politraumatizado ✓
- ☐ b. La IOT se realizará con el cuello en posición neutra; siendo necesario la retirada del collarín con control cervical manual
- ☐ c. El último paso de control de la vía aérea es la colocación de un collarín cervical rígido que se realizará entre dos personas
- ☐ d. El primer paso control de la vía aérea es control cervical manual buscando el habla

La respuesta correcta es: Para realizar apertura de vía aérea es de elección la tracción mandibular que se realizará por axioma en todo paciente politraumatizado

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre  
1,00

Respecto a la colocación de sondas en el paciente politraumatizado, señale la incorrecta:

Seleccione una:

- ☐ a. Siempre se colocará sonda orogástrica cuando sea necesario, principalmente paciente inconsciente al que hemos realizado IOT
- ☐ b. La sonda nasogástrica está contraindicada ante la sospecha de fractura de base de cráneo
- ☒ c. La sonda vesical está indicada ante hematomas en el periné o el escroto para descartar hematuria ✓
- ☐ d. La hematuria es indicativa de cirugía y lesión interna del aparato urinario

La respuesta correcta es: La sonda vesical está indicada ante hematomas en el periné o el escroto para descartar hematuria

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre  
1,00

En relación a la biomecánica del traumatizado, cual de las siguientes es falsa:

Seleccione una:

- ☒ a. En el caso de choque frontal las lesiones son más graves que en el choque lateral ✓
- ☐ b. En la prevención de lesiones, el airbag complementa al cinturón de seguridad pero no lo sustituye
- ☐ c. En una colisión por alcance la hiperextensión del cuello podría evitarse mediante el reposacabezas
- ☐ d. Uno de los principales riesgos en el caso de vuelco es la expulsión del vehículo si no lleva puesto el cinturón de seguridad

La respuesta correcta es: En el caso de choque frontal las lesiones son más graves que en el choque lateral

^

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre  
1,00

De las siguientes entidades, cuáles no corresponden a muertes evitables del politraumatizado en el ámbito extrahospitalario:

Seleccione una:

- ☐ a. Asfixia/Hipoxia
- ☐ b. Neumotórax a tensión
- ☒ c. Shock de cualquier entidad ✓
- ☐ d. Hipertensión intracraneal

La respuesta correcta es: Shock de cualquier entidad

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre  
1,00

La primera maniobra a realizar en un paciente politraumatizado con dificultad respiratoria, herida soplante en tórax, y cianosis será:

Seleccione una:

- ☐ a. Toracocentesis de emergencia con angiocatéter y dedo de guante
- ☐ b. Tapar la herida con gasa vaselinaza por tres bordes
- ☐ c. Oxigenoterapia agresiva con O2 al 100%
- ☒ d. Comprobar la permeabilidad de la vía aérea ✓

La respuesta correcta es: Comprobar la permeabilidad de la vía aérea

[Volver a: Módulo 3: Sopor... ➡](#)

