

Comenzado el	jueves, 27 de julio de 2017, 12:13
Estado	Finalizado
Finalizado en	jueves, 10 de agosto de 2017, 14:13
Tiempo empleado	14 días 2 horas
Puntos	20,00/20,00
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)
Comentario -	Buen trabajo - Continúe con el curso

Pregunta **1**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Con cuál de los siguientes antibióticos puede aparecer el síndrome del cuello rojo:
 Seleccione una:

a. Imipenem

b. Vancomicina

c. Clindamicina

d. Linezolid

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Vancomicina

Pregunta **2**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál de las siguientes afirmaciones de pentamidina es falsa:
 Seleccione una:

a. La preparación de las soluciones para administración parenteral o inhalada, se debe realizar en cabina de flujo laminar vertical

b. Antiprotozoario, eficaz frente a varias infecciones por protozoos, leishmaniasis, tripanosomiasis y neumocistosis

c. La administración por vía inhalatoria por el personal sanitario no requiere de ninguna

medida protectora

d. Debido al riesgo de hipotensión es importante que el paciente esté en decúbito durante la administración

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La administración por vía inhalatoria por el personal sanitario no requiere de ninguna medida protectora

Pregunta **3**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál de las siguientes características de isoniazida es falsa:
 Seleccione una:

a. Es neurotóxico

b. Es hepatotóxico

- c. Es un potente inductor enzimático, disminuyendo las concentraciones plasmáticas de ciertos fármacos, como anticoagulantes orales, antiepilépticos, ketoconazol
- d. Antibiótico bactericida para micobacterias pero sin ninguna actividad sobre patógenos no micobacterianos

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Es un potente inductor enzimático, disminuyendo las concentraciones plasmáticas de ciertos fármacos, como anticoagulantes orales, antiepilépticos, ketoconazol

Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál de las siguientes características de rifampicina es falsa:

Seleccione una:

- a. Puede causar una coloración rojiza de los fluidos corporales (orina, esputo, lágrimas, sudor, semen, heces...)
- b. Se emplea en la profilaxis de la meningitis meningocócica en portadores asintomáticos
- c. Se debe administrar junto con alimentos
- d. Es el fármaco de elección para el tratamiento de la tuberculosis en todas sus formas en combinación con otros tuberculostáticos

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Se debe administrar junto con alimentos

Pregunta **5**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál de las siguientes es una aplicación clínica de los macrólidos:

Seleccione una:

- a. Neumonía por *Legionella pneumophilla* y *Mycoplasma pneumoniae*
- b. Todas son correctas
- c. Tratamiento de erradicación de *Helicobacter pylori*
- d. Tosferina

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta **6**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál de las siguientes penicilinas es la más activa frente a *Pseudomonas*:

Seleccione una:

- a. Cloxacilina
- b. Piperacilina

- c. Penicilina G sódica
- d. Amoxicilina

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Piperacilina

Pregunta **7**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál de las siguientes recomendaciones para la administración de tetraciclinas es incorrecta:

Seleccione una:

- a. Administrarlas con un vaso grande de agua
- b. El paciente debe estar en posición decúbito durante una hora tras la toma del antibiótico
- c. La administración intravenosa debe hacerse lentamente, al menos en una hora
- d. No administrar con leche o derivados lácteos, antiácidos, sales de calcio o hierro

Retroalimentación

La respuesta correcta es: El paciente debe estar en posición decúbito durante una hora tras la toma del antibiótico

Pregunta **8**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál de los siguientes aminoglucósidos se emplea para el tratamiento de la encefalopatía hepática:

Seleccione una:

- a. Amikacina
- b. Gentamicina
- c. Paromomicina
- d. Tobramicina

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Paromomicina

Pregunta **9**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál de los siguientes antibióticos puede desencadenar un síndrome serotoninérgico cuando se administra con antidepresivos IMAO e inhibidores de la recaptación de serotonina:

Seleccione una:

- a. Vancomicina
- b. Tigeciclina
- c. Linezolid
- d. Imipenem

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Linezolid

Pregunta **10**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál de los siguientes antibióticos se utiliza en el tratamiento y profilaxis de la neumonía por *Pneumocystis jirovecii*:

Seleccione una:

- a. Rifampicina
- b. Espiramicina
- c. Cotrimoxazol
- d. Sulfisoxazol

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Cotrimoxazol

Pregunta **11**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál de los siguientes antivirales no se emplea en el tratamiento de la hepatitis B:

Seleccione una:

- a. Lamivudina
- b. Tenofovir
- c. Ribavirina
- d. Entecavir

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Ribavirina

Pregunta **12**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál de los siguientes macrólidos debe evitarse administrar junto con fármacos metabolizados por el citocromo P-450:

Seleccione una:

- a. Espiramicina
- b. Azitromicina
- c. Eritromicina
- d. Claritromicina

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Eritromicina

Pregunta **13**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El mecanismo de acción de los antibióticos glucopéptidos es:

Seleccione una:

- a. Bloquea el reciclaje del bactoprenol
- b. Inhiben la formación del dipéptido de D-alanina
- c. Inhiben la unión entre unidades NAG-NAM pentapéptido
- d. Inhiben la transpeptidación

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Inhiben la unión entre unidades NAG-NAM pentapéptido

Pregunta **14**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La anfotericina B:

Seleccione una:

- a. Las reacciones adversas relacionadas con la perfusión pueden prevenirse disminuyendo la velocidad de perfusión o administrando previamente antitérmicos, antihistamínicos, corticoides y/o antieméticos
- b. Es compatible con soluciones salinas
- c. Se absorbe por vía oral
- d. La nefrotoxicidad es mucho mayor con anfotericina liposomal, anfotericina complejo lipídico y anfotericina en dispersión coloidal.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Las reacciones adversas relacionadas con la perfusión pueden prevenirse disminuyendo la velocidad de perfusión o administrando previamente antitérmicos, antihistamínicos, corticoides y/o antieméticos

Pregunta **15**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

No se incluyen dentro de los B-lactámicos:

Seleccione una:

- a. Tetraciclinas
- b. Carbapenems
- c. Cefalosporinas
- d. Monobactamas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Tetraciclinas

Pregunta **16**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Para el tratamiento de las infecciones por citomegalovirus se puede emplear:
Seleccione una:

- a. A y B son correctas
- b. B: Foscarnet
- c. C: Oseltamivir
- d. A: Ganciclovir

Retroalimentación

La respuesta correcta es: A y B son correctas

Pregunta **17**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Para el tratamiento de las micosis profundas se pueden emplear los siguientes antifúngicos azólicos excepto uno:

Seleccione una:

- a. Posaconazol
- b. Voriconazol
- c. Clotrimazol
- d. Fluconazol

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Clotrimazol

Pregunta **18**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué cefalosporina no debe ser mezclada o administrada simultáneamente con soluciones que contengan calcio por el riesgo de formación de precipitados:

Seleccione una:

- a. Cefepima
- b. Cefotaxima
- c. Ceftazidima
- d. Ceftriaxona

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Ceftriaxona

Pregunta **19**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Si al asociar dos antibióticos el efecto es sinérgico quiere decir que:

Seleccione una:

- a. El efecto de los dos es igual al que daría el más eficaz si se administrara sólo
- b. El efecto de los dos juntos es mayor que la suma de los efectos individuales

- c. El efecto de los dos juntos es menor que el que produciría el más eficaz si se administrase solo.
- d. El efecto de los dos juntos es igual a la suma de los efectos individuales

Retroalimentación

La respuesta correcta es: El efecto de los dos juntos es mayor que la suma de los efectos individuales

Pregunta **20**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Uno de los siguientes efectos adversos de las quinolonas es incorrecto:

Seleccione una:

- a. Fotosensibilidad
- b. Acumulación en el cartílago articular
- c. Prolongación del intervalo PR
- d. Tendinitis y rotura de tendón

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Prolongación del intervalo PR