

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En caso de microcalcificaciones en la mama puede ser necesario:

Seleccione una:



A. Realizar un marcaje previo a la intervención mediante un arpón colocado en el Servicio de Radiología. ✓



B. Realizar una mastectomía bilateral como tratamiento de elección.



C. Siempre será necesaria un linfadenectomía axilar.



D. Todas las respuestas son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Realizar un marcaje previo a la intervención mediante un arpón colocado en el Servicio de Radiología.

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En las intervenciones quirúrgicas por vía vaginal, ¿cuál es la posición correcta de la paciente?

Seleccione una:



A. Decúbito dorsal.



B. Litotomía. ✓



C. Decúbito lateral derecho.



D. Todas son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Litotomía.

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Indique la respuesta incorrecta en la preparación mínima de la paciente sometida a cirugía laparoscópica.

Seleccione una:

- ☒ A. Monitorización de ECG, PA invasiva, pulsioximetría y capnografía. ✓
- ☐ B. Canalización de vía venosa periférica.
- ☐ C. Posición de litotomía modificada y refuerzo con hombreras para evitar desplazamientos.
- ☐ D. Lavado y desinfección con suero fisiológico y solución antiséptica de abdomen y región perineal, incluyendo la bóveda vaginal.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Monitorización de ECG, PA invasiva, pulsioximetría y capnografía.

Pregunta 4

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En una histeroscopia la distensión del espacio uterino puede ser con. Señala la respuesta incorrecta

Seleccione una:

- ☒ A. Histeroinsuflador de CO2. ✗
- ☐ B. Glicina.
- ☐ C. Suero fisiológico.
- ☐ D. Suero Glucosado 5%

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Suero Glucosado 5%

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿En qué consiste la mastectomía radical tipo Maden?

Seleccione una:

- ☐ A. Se realiza ante tumores malignos mamarios sin afectación ganglionar.
- ☐ B. Es la extirpación del cuadrante de la mama donde se encuentra el tumor.
- ☐ C. Se reseca toda la mama y se conserva el pezón y la areola intactos.
- ☒ D. Se extirpa toda la mama, ganglios linfáticos axilares y tejido adiposo, conservando el músculo pectoral menor. ✓

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Se extirpa toda la mama, ganglios linfáticos axilares y tejido adiposo, conservando el músculo pectoral menor.

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué tipo de óptica se utiliza en este procedimiento quirúrgico (histeroscopia)?

Seleccione una:

- ☐ A. Óptica de 70º
- ☒ B. Óptica de 30º ✓
- ☐ C. Óptica de 0º
- ☐ D. Óptica de 45º

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Óptica de 30º

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la preparación de la paciente para una intervención de mama se debe tener en cuenta aspectos como:

Seleccione una:

- ☐ A. El manguito para la toma de PA no invasiva se coloca en la pierna.
- ☐ B. La canalización de la vía venosa periférica es en el brazo contrario a la lesión.

☐ C. Los electrodos se colocan generalmente en la espalda.

☒ D. Todas son correctas. ✓

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La caja de instrumental de cirugía abdominal ginecológica debería contener instrumental específico como:

Seleccione una:

☐ A. Pinzas de Dartigues o histerolabo.

☐ B. Tirabuzón.

☐ C. Tijera de Wescot.

☒ D. Las respuestas a y b son correctas. ✓

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Las respuestas a y b son correctas.

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los tumores benignos de ovario más frecuentes son de naturaleza quística. Entre ellos se encuentran:

Seleccione una:

☒ A. Teratomas benignos o quistes dermoides. ✓

☐ B. De Tarlov.

☐ C. De epidídimo.

☐ D. Las respuestas a y b son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Teratomas benignos o quistes dermoides.

Pregunta 10

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué material no se prepararía para realizar una laparoscopia?

Seleccione una:



A. Óptica y cable de luz



B. Instrumentos específicos para hemostasia, disección y exéresis de la lesión. ✖



C. Inmovilizador uterino para nulípara.



D. Trócares de laparoscopia

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Inmovilizador uterino para nulípara.

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La colocación de la paciente en la mesa quirúrgica para realizar una intervención de mama ha de ser:

Seleccione una:



A. Decúbito dorsal con los brazos sujetos al cuerpo.



B. Decúbito dorsal con los brazos extendidos en cruz en una angulación máxima de 45°.



C. Decúbito dorsal con el brazo de la mama afectada extendido en un soporte con una angulación máxima de 90 °. ✔



D. Decúbito lateral del lado de la mama afectada y el brazo homolateral levantado y sujeto sobre la cabeza.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Decúbito dorsal con el brazo de la mama afectada extendido en un soporte con una angulación máxima de 90 °.

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En las intervenciones abdominales se pueden practicar dos tipos de incisiones: Pfannenstiel y laparotomía media infraumbilical. Señale la respuesta correcta:

Seleccione una:

- ☐ A. En la laparotomía media infraumbilical se realiza apertura longitudinal de la aponeurosis abdominal.
- ☐ B. En la Pfannenstiel la apertura de la aponeurosis abdominal es de forma transversal.
- ☐ C. La incisión de Pfannenstiel es más estética porque la cicatriz queda cubierta por el vello púbico.
- ☒ D. Todas son correctas. ✓

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué tipo de sutura se utiliza para realizar la histerorrafia en la intervención de Cesárea?

Seleccione una:

- ☐ A. Seda trenzada 1
- ☒ B. Poliglactina 1 ✓
- ☐ C. Nylon 0
- ☐ D. Monofilamento no reabsorbible 1

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Poliglactina 1

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué es un cerclaje cervical y cuándo esta indicado?:

Seleccione una:

- ☐ A. Se trata de evitar la dilatación prematura del orificio cervical interno mediante una sutura continua con cerviz-set y cinta de PET.
- ☐ B. Se realizará después de la 16 semana de embarazo.
- ☐ C. Puede ser una intervención de urgencia si existe amenaza de aborto o de parto prematuro.
- ☒ D. Todas las anteriores son correctas. ✓

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las anteriores son correctas.

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La glándula de Bartholino segrega moco y puede infectarse provocando un absceso que puede requerir cirugía. Señale la respuesta incorrecta:

Seleccione una:

- ☒ A. La enfermera instrumentista preparará lo necesario para una intervención abdominal. ✓
- ☐ B. Se realiza una incisión, drenaje de la cavidad y desbridamiento digital.
- ☐ C. Se realiza lavado de arrastre con povidona yodada y suero fisiológico a partes iguales.
- ☐ D. Si se marsupializa se impide el cierre inmediato de la cavidad quística mediante puntos sueltos.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La enfermera instrumentista preparará lo necesario para una intervención abdominal.

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿En cuál de las siguientes intervenciones es necesario el recuento de compresas y gasas?

Seleccione una:

- ☐ A. Miomectomía

☐ B. Quistectomía ovárica

☐ C. Anexectomía

☒ D. Todas son correctas ✓

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De los siguientes instrumentos quirúrgicos, indique cuál no sería imprescindible en un instrumental de legrado:

Seleccione una:

☐ A. Valvas vaginales.

☐ B. Tallos de Hegar o dilatadores.

☐ C. Legras fenestradas de Recamier.

☒ D. Separadores Farabeuf. ✓

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Separadores Farabeuf.

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué es una conización?

Seleccione una:

☒ A. Es la resección de un cono de tejido del cuello uterino. ✓

☐ B. Es el drenaje de la cavidad quística mediante un Penrose cónico.

☐ C. Normalmente se asocia a la histerectomía radical.

☐ D. Todas las anteriores son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Es la resección de un cono de tejido del cuello uterino.

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué instrumentos se utilizan para cortar el cordón umbilical?

Seleccione una:

- ☐ A. Pinzas de disección y bisturí eléctrico
- ☐ B. Pinzas de disección y bisturí frío
- ☐ C. Tijeras de Mayo
- ☒ D. 2 pinzas de Kocher y tijeras rectas ✓

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 2 pinzas de Kocher y tijeras rectas

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué causas pueden motivar la cesárea? Señala la respuesta incorrecta.

Seleccione una:

- ☐ A. Desproporción Pélvico cefálica
- ☐ B. Presentaciones anómalas (podálica, transversa)
- ☐ C. Placenta previa
- ☒ D. Todas las anestесias epidurales ✓

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las anestесias epidurales

Pregunta 21

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuáles son los instrumentos que se utilizan en la dilatación cervical para la introducción del histertoscopio?

Seleccione una:

- ☐ A. Dilatadores de Bakey
- ☐ B. Tallos de Allis
- ☒ C. Tallos de Hegar ✓
- ☐ D. Dilatadores de Mayo

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Tallos de Hegar

Pregunta 22

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los miomas son tumores benignos que se deben extirpar en caso de presentar sintomatología, gran tamaño o provocar problemas de fertilidad. Señale la respuesta incorrecta:

Seleccione una:

- ☐ A. Una vez abierta la cavidad abdominal se exterioriza el útero para poder examinarlo mejor.
- ☐ B. El lecho del mioma, una vez extirpado, se cierra con Poliglactina del 0 evitando los espacios muertos.
- ☒ C. Habitualmente, la miomectomía se acompaña de una doble anexectomía. ✓
- ☐ D. Las piezas resecaadas se envían al servicio de Anatomía Patológica.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Habitualmente, la miomectomía se acompaña de una doble anexectomía.

Pregunta 23

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La histerectomía vaginal puede ir acompañada de la reparación del cistocelo. Señale la respuesta incorrecta.

Seleccione una:

- ☐ A. La posición quirúrgica es litotomía, protegiendo los huecos poplíteos con un almohadillado.



B. La reparación del cistocele es previa a la histerectomía. ✓



C. Una vez que se ha alcanzado el cuello vesical, se dan puntos en la aponeurosis para tensar y evitar el abombamiento de la vejiga.



D. La cúpula vaginal se cierra con sutura reabsorbible y sirve de anclaje para los pedículos.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La reparación del cistocele es previa a la histerectomía.

Pregunta 24

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El útero se encuentra suspendido en la cavidad pelviana por una serie de ligamentos que lo cubren, que son: Señale la respuesta correcta:

Seleccione una:



A. Los ligamentos anchos que le proporcionan estabilidad dentro de la cavidad pélvica.



B. Los ligamentos cardinales que evitan que el útero se colapse.



C. Los ligamentos redondos que ayudan a mantener el útero sostenido y orientado hacia delante.



D. Todas son correctas. ✓

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 25

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué es una histerectomía tipo Wertheim-Meigs?

Seleccione una:



A. Es aquella en la que se conserva el cuello del útero.



B. Es una histerectomía radical con linfadenectomía pélvica. ✓



C. Es la extirpación del útero, ovarios y trompas.



D. Ninguna respuesta es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Es una histerectomía radical con linfadenectomía pélvica.

Pregunta 26

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La histeroscopia consiste en la introducción de una videocámara dentro del útero a través del cérvix con fines diagnósticos o terapéuticos, como pueden ser:

Seleccione una:

- ☐ A. Miomectomía.
- ☐ B. Evaluar los osteum tubáricos y canalización tubárica retrógrada.
- ☐ C. Liberación de adherencias que dificultan la implantación de un embarazo.
- ☒ D. Todas son correctas. ✓

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 27

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Con respecto a los ovarios, señale la respuesta incorrecta:

Seleccione una:

- ☐ A. Son de color gris claro y brillante.
- ☐ B. En niñas y mujeres postmenopáusicas son de menor tamaño.
- ☐ C. Su irrigación es a través de la arteria ovárica.
- ☒ D. Su posición en la cavidad pélvica no varía después del primer parto. ✓

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Su posición en la cavidad pélvica no varía después del primer parto.

Pregunta 28

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En cuanto al procedimiento quirúrgico de la histerectomía, cabe destacar:

Seleccione una:

- ☒ A. Las asas intestinales se rechazan y protegen con un paño humedecido en suero fisiológico caliente. ✓
- ☐ B. La paciente se coloca en posición de anti-Trendelenburg.
- ☐ C. Para el cierre de la cúpula vaginal se utiliza Polipropileno de 8/0.
- ☐ D. Todas las anteriores son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Las asas intestinales se rechazan y protegen con un paño humedecido en suero fisiológico caliente.

Pregunta 29

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En casos de gestación ectópica puede ser necesario una salpinguectomía. Se debe tener en cuenta:

Seleccione una:

- ☐ A. Puede existir hemoperitoneo por estallido tubular, comprometiendo la situación hemodinámica de la paciente.
- ☐ B. La unión de la trompa con la vagina se pinza y se liga con Poliglactina del 0.
- ☐ C. El lavado de la cavidad abdominal para eliminar restos de coágulos se realiza con suero fisiológico caliente.
- ☒ D. Las respuestas a y c son correctas. ✓

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Las respuestas a y c son correctas.

Pregunta 30

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La cesárea es la extracción del feto por vía abdominal y puede ser de forma programada o urgente. Indique la respuesta incorrecta:

Seleccione una:

- ☒ A. Se administra 1000 UI de oxitocina para evitar la contracción uterina. ✓
- ☐ B. Se deben tener preparados un equipo textil, caja de instrumental para cirugía abdominal y unos forceps.
- ☐ C. Si el tipo de anestesia es general la preparación de la paciente y la colocación del campo quirúrgico es previa a la inducción anestésica.
- ☐ D. La placenta se retira de forma manual y se comprueba su integridad.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Se administra 1000 UI de oxitocina para evitar la contracción uterina.