

## Preguntas Test Final UNIDAD 2

Calificación 8,40 de 10,00 (84%)

Comentario - ¡ MUY BIEN !! 😊

### Pregunta 1

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

326.- La primera dosis de Enoxaparina debe ir precedida de un bolo de::

Seleccione una:

☐ a. A) 50 mg IV.

☐ b. B) 30 mg SC. ✗

Mal, debes repasar un poco

☐ c. C) 30 mg IV.

☐ d. D) 30 mg VO.

### Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

401.- Dentro de las arritmias hiperactivas o taquiarritmias. ¿Cuál corresponde a las supraventriculares?

Seleccione una:

☐ a. A) Fibrilación ventricular.

☐ b. B) Impulsos ventriculares prematuros.

☐ c. C) Taquicardia clásica monomorfa.

☐ d. D) Taquicardia sinusal por aumento del automatismo. ✓

¡Bien, correcto!

### Pregunta 3

Correcta


Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

214.- En el tratamiento del edema pulmonar, con respecto a la morfina es cierto que:

Seleccione una:

- ☐ a. A) Produce una vasoconstricción arteriolar y venosa.
- ☐ b. B) Disminuye la circulación esplácnica.
- ☐ c. C) Debe administrarse con cuidado en pacientes con hipotensión, asma bronquial o hemorragia intracraneal. 
- ☐ d. D) Es eficaz en el tratamiento del edema pulmonar no cardiogénico.

#### Pregunta 4

Correcta


Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

213.- De las siguientes, indique cuál no es una causa precipitante del fallo cardíaco:

Seleccione una:

- ☐ a. A) Déficit de fluidos en el postoperatorio. 
- ☐ b. B) Embolismo pulmonar.
- ☐ c. C) Hipertiroidismo.
- ☐ d. D) Infección sistémica.

#### Pregunta 5

Correcta


Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

307.- El tratamiento de la pericarditis postinfarto consiste en:

Seleccione una:

- ☐ a. A) Cirugía urgente.
- ☐ b. B) Reposo.
- ☐ c. C) AAS a dosis altas (2 gr/día).
- ☐ d. D) B y c son correctas. 

¡Bien, correcto!

#### Pregunta 6

Incorrecta


Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

403.- En cuanto a la taquicardia sinusal.

Seleccione una:

- ☐ a. A) La aparición de poliuria puede ser un síntoma característico.
- ☐ b. B) Esta taquicardia responde mal al tratamiento farmacológico.
- ☐ c. C) Raramente es debida a un mecanismo de reentrada sinoauricular.
- ☐ d. D) Se caracteriza por la existencia de un ritmo sinusal a una frecuencia cardíaca inferior a 100 lpm. 

Mal, debes repasar un poco

### Pregunta 7

Correcta


Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

420.- Señale la opción incorrecta sobre el flúter auricular:

Seleccione una:

- ☐ a. A) Es el ritmo auricular rápido organizado y regular.
- ☐ b. B) En el EKG se representa por ondas F.
- ☐ c. C) Una frecuencia ventricular a 300lpm sugiere la existencia de exceso de calcioantagonista.
-  ¡Bien, correcto!
- ☐ d. D) En su forma paroxística puede ocurrir en pacientes sin cardiopatía estructural.

### Pregunta 8

Correcta



Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

410.- Señale la opción falsa sobre la TV monomorfa.

Seleccione una:

- ☐ a. A) Suele iniciarse con una CVP de la misma morfología que el resto de la TV.
- ☐ b. B) Es muy frecuente el fenómeno R/T y algunas veces los primeros complejos pueden ser polifórmicos. 
-  ¡Bien, correcto!
- ☐ c. C) La FC oscila entre 130-240 lpm.
- ☐ d. D) Se repite siempre la misma morfología, aunque pueden existir complejos aislados de diferente morfología debido a la presencia de latidos de captura y fusión.

## Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

215.- ¿Cuál es el vasodilatador de elección cuando se requiere una reducción importante de la postcarga de ventrículo izquierdo?

Seleccione una:

☐ a. A) Nitroglicerina.

☒ b. B) Nitroprusiato. 

¡Bien, correcto!

☐ c. C) Amrinona.

☐ d. D) Ninguno de los anteriores.

## Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta


### Enunciado de la pregunta

217.- En la valoración de la insuficiencia cardiaca en pacientes en estado crítico encontramos una serie de signos y síntomas, señale la opción incorrecta:

Seleccione una:

☐ a. A) Cianosis.

☐ b. B) Letargia.

☒ c. C) Aplanamiento yugular. 

¡Bien, correcto!

☐ d. D) Angustia e inquietud.

## Pregunta 11

Incorrecta


Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

308.- Tras confirmar el diagnóstico de SCA, el paciente deberá:

Seleccione una:

☐ a. A) Tener un seguimiento ambulatorio. 

Mal, debes repasar un poco

☐ b. B) Es indiferente, ya que el tratamiento se puede aplicar en régimen ambulatorio u hospitalario.

☐ c. C) Ser ingresado en el hospital, para el manejo de la isquemia coronaria aguda.

☐ d. D) A y b son correctas.

## Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00


■ Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

318.- Según la clasificación de la sociedad española de cardiología (1995) clasifica la AL en función de su presentación clínica y su forma evolutiva en, señale la opción incorrecta:

Seleccione una:

☐ a. A) A. inicial: angina < 1 mes.

☐ b. B) A. progresiva: mejora en el último mes. 

¡Bien, correcto!

☐ c. C) A. prolongada: de reposo que, por su larga duración simula un IAM.

☐ d. D) A. variante: episodios de A reposo con elevación del ST durante la crisis y responde a NTG.

## Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

■ Marcar pregunta


### Enunciado de la pregunta

413.- Los  $\beta$ -bloqueantes están indicados en:

Seleccione una:

☐ a. A) Taquicardias supraventriculares.

☐ b. B) Arritmias del ejercicio.

☐ c. C) A y b son correctas. 

¡Bien, correcto!

☐ d. D) Todas son falsas.

## Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

■ Marcar pregunta


### Enunciado de la pregunta

303.- Algunas de las medidas generales en el manejo del IAM con ST elevado en la unidad coronaria son:

Seleccione una:

☐ a. A) Monitorización ECG continua y monitorización incruenta de la PA.

☐ b. B) Canalización de una o dos vías periféricas.

- ☐ c. C) A y b son correctas. 
- ¡Bien, correcto!
- ☐ d. D) Todas son falsas.

### Pregunta 15

Incorrecta


Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

405.- Debe plantearse la realización de un EEF en pacientes que cumplen una de estas características: Indica la incorrecta.

Seleccione una:

- ☐ a. A) Crisis de taquicardias frecuentes.
- ☐ b. B) Mala tolerancia hemodinámica de la arritmia
- ☐ c. C) Tener más de 40 años.
- ☐ d. D) Preferencia del paciente. 

Mal, debes repasar un poco

### Pregunta 16

Correcta


Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

310.- Una de las recomendaciones de la SEC ante una sospecha de una isquemia miocárdica es:

Seleccione una:

- ☐ a. A) Reducir al mínimo el retraso en la asistencia. 
- ¡Bien, correcto!
- ☐ b. B) Administrar AAS entre 50-150 mg.
- ☐ c. C) Administrar nitratos sublinguales.
- ☐ d. D) Realizar una ecocardiograma.

### Pregunta 17

Correcta


Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

408.- En los criterios diagnósticos de extrasístoles ventricular, señale lo correcto.

Seleccione una:

- ☐ a. A) Latido adelantado o prematuro respecto al latido sinusal 

¡Bien, correcto!

- ☐ b. B) Complejo QRS normal.
- ☐ c. C) Pausa compensadora incompleta
- ☐ d. D) Latido precedido de onda P.

### Pregunta 18

Correcta


Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

415.- Señale la opción correcta sobre el bloqueo sinoauricular:

Seleccione una:

- ☐ a. A) Puede tener varios grados.
- ☐ b. B) Se produce un trastorno de la conducción entre el nódulo sinusal y la aurícula derecha.
- ☐ c. C) El primer grado no puede diagnosticarse en el EKG.
- ☐ d. D) Todas las anteriores son correctas. 

¡Bien, correcto!

### Pregunta 19

Correcta


Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

412.- Según la clasificación de Vaughan Williams de los fármacos antiarrítmicos, uno de los siguientes no pertenece a la clase I de fármacos que bloquean la entrada de sodio, ¿cuál?

Seleccione una:

- ☐ a. A) Lidocaína.
- ☐ b. B) Propafenona.
- ☐ c. C) Verapamil. 

¡Bien, correcto!

- ☐ d. D) Quinidina.

### Pregunta 20

Correcta


Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

304.- Señale la opción falsa sobre la ecocardiografía.

Seleccione una:

- ☐ a. A) Es una exploración incruenta.
- ☐ b. B) Es una exploración complicada e irrepetible. 
- ¡Bien, correcto!
- ☐ c. C) Es especialmente útil para la valoración de la función ventricular.
- ☐ d. D) Es una exploración relativamente sencilla y repetible.

### Pregunta 21

Correcta


Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

221.- Con respecto a la morfina, señale la opción incorrecta:

Seleccione una:

- ☐ a. A) Reduce el trabajo y esfuerzo para respirar.
- ☐ b. B) Es importante por sus efectos hemodinámicos.
- ☐ c. C) Disminuye la circulación esplácnica. 
- ¡Bien, correcto!
- ☐ d. D) La dosis habitual es 3-5 mg. IV en 3 min y puede repetirse cada numero 15 min.

### Pregunta 22

Correcta


Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

418.- Señale la opción incorrecta de la taquicardia supraventricular paroxística:

Seleccione una:

- ☐ a. A) Duran de escasos segundos a varias horas.
- ☐ b. B) Es frecuente en pacientes con patología extracardiaca.
- ☐ c. C) Un síntoma característico es la poliuria durante el episodio arrítmico.
- ☐ d. D) Todas son falsas 
- ¡Bien, correcto!

### Pregunta 23

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00


Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

329.- Señale la opción correcta sobre la rotura de pared libre:



Seleccione una:

- ☐ a. A) Es la segunda causa más frecuente de muerte en los pacientes hospitalizados por IAM.
- ☐ b. B) El diagnóstico de sospecha es clínico y se confirma con el ecocardiograma.
- ☐ c. C) El tratamiento definitivo es quirúrgico y de extrema urgencia.
- ☐ d. D) Todas son correctas. 

Bien, correcto!

## Pregunta 24

Correcta


Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

319.- Que exploraciones complementarias de las mencionadas son no invasivas.

Seleccione una:

- ☐ a. A) Ecocardiograma.
- ☐ b. B) Prueba de esfuerzo.
- ☐ c. C) Holtes.
- ☐ d. D) Todas son no invasivas. 

¡Bien, correcto!

## Pregunta 25

Incorrecta


Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

311.- Las actuaciones generales fuera de un medio hospitalario atendiendo a un paciente con IAM sin elevación de ST son todas menos:

Seleccione una:

- ☐ a. A) Considerar analgesia y/sedación. 
- ☐ b. B) Nitratos sublinguales siempre que haya hipotensión.
- ☐ c. C) Cercanía al desfibrilador.
- ☐ d. D) Valoración del dolor.

## Pregunta 26

Correcta


Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

423.- En el ritmo Idioventricular Acelerado es cierto la siguientes opciones:

Seleccione una:

- ☐ a. A) Es una salva de TV de larga duración que en general es sintomática.
- ☐ b. B) Suele aparecer en el IAM, durante la fase de repercusión espontanea o tras trombolisis.
- ☐ c. C) Suele ser benigna y asintomática.
- ☐ d. D) B y c son correctas. 

¡Bien, correcto!

### Pregunta 27

Correcta


Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

208.- ¿Cuál es la consecuencia más frecuente y grave de la disfunción aguda del ventrículo izquierdo?

Seleccione una:

- ☐ a. A) Edemas periféricos.
- ☐ b. B) Aumento de la presión venosa central.
- ☐ c. C) Derrame pleural.
- ☐ d. D) Edema agudo de pulmón. 

¡Bien, correcto!

### Pregunta 28

Correcta


Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

421.- La fibrilación auricular conlleva importantes efectos perjudiciales debido a:

Seleccione una:

- ☐ a. A) Alteración en la frecuencia ventricular.
- ☐ b. B) Falta de contracción auricular efectiva.
- ☐ c. C) Ser arritmia envolígena, tanto en su forma paroxística como permanente.
- ☐ d. D) Todas son correctas. 

¡Bien, correcto!

### Pregunta 29


Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

416.- La aparición de la disociación AV, puede ser debida a; señale la opción incorrecta:  
Seleccione una:

- ☐ a. A) Bradicardia. 
- ¡Bien, correcto!
- ☐ b. B) Existencia de un bloqueo AV completo.
- ☐ c. C) Enlentecimiento del ritmo del marcapasos normal, poniéndose en marcha marcapasos subsidiarios.
- ☐ d. D) Aumento anormal de frecuencia en un foco idionodal o idioventricular.

### Pregunta 30


Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

402.- Es/son arritmias hipoactivas o bradiarritmias. Señale la correcta.  
Seleccione una:

- ☐ a. A) Bradicardia sinusal. 
- ¡Bien, correcto!
- ☐ b. B) Fibrilación ventricular.
- ☐ c. C) Taquicardia clásica monomorfa.
- ☐ d. D) Flutter auricular.

### Pregunta 31


Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

404.- La reentrada en el nodo sinusal o reentrada intraauricular corresponde a.  
Seleccione una:

- ☐ a. A) Taquicardia auricular por reentrada. 
- ¡Bien, correcto!
- ☐ b. B) Taquicardia auricular multifocal o ritmo auricular caótico.
- ☐ c. C) Taquicardia auricular por aumento del automatismo.
- ☐ d. D) Taquicardia supraventricular.

## Pregunta 32

Correcta


Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

331.- En el estudio de viabilidad miocárdica se aceptan tres situaciones de origen isquémico vinculadas a la asistencia de miocardio viable, señale la opción correcta:

Seleccione una:

- ☐ a. A) Disfunción miocárdica aguda.
- ☐ b. B) Aturdimiento miocárdico.
- ☐ c. C) Hibernación.
- ☐ d. D) Todas son correctas. 

¡Bien, correcto!

## Pregunta 33

Correcta


Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

313.- La angioplastia primaria ha sido capaz de:

Seleccione una:

- ☐ a. A) No repermeabilizar ninguna arteria..
- ☐ b. B) Incidencia de perfusión inicial nula.
- ☐ c. C) Menos estenosis residual. 
- ☐ d. D) Todas son correctas.

¡Bien! ¡Correcto!

## Pregunta 34

Correcta


Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

322.- Señale la opción falsa sobre el nitrato:

Seleccione una:

- ☐ a. A) Inducen vasodilatación al estimular la producción de óxido nítrico.
- ☐ b. B) Inhibe directamente la trombina ligada al trombo. 
- ☐ c. C) Es el fármaco más eficaz para aliviar la crisis de angina.

¡Bien, correcto!

- ☐ d. D) Una de las contraindicaciones es la hipotensión arterial.

### Pregunta 35

Correcta


Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

201.- ¿A qué se denomina disfunción diastólica?

Seleccione una:

- ☐ a. A) A la dificultad del ventrículo izquierdo para vaciarse.
- ☐ b. B) A la incapacidad del ventrículo izquierdo para llenarse y relajarse. 
- ¡Bien, correcto!
- ☐ c. C) A la dificultad del ventrículo derecho para relajarse y llenarse.
- ☐ d. D) Ninguna de las anteriores es correcta.

### Pregunta 36

Correcta


Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

216.- Indique de las siguientes, la respuesta incorrecta:

Seleccione una:

- ☐ a. A) La dobutamina aumenta el consumo de O<sub>2</sub>, por lo que puede causar arritmias.
- ☐ b. B) La Milrinona produce disminución del gasto cardíaco y aumento de la presión de llenado de ventrículo izquierdo. 
- ¡Bien, correcto!
- ☐ c. C) La Furosemida es el diurético de elección en el tratamiento del edema pulmonar cardiogénico.
- ☐ d. D) La Nitroglicerina es el vasodilatador de elección en el fracaso cardíaco con enfermedad isquémica coronaria.

### Pregunta 37

Correcta


Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

222.- ¿Que es el nitropusiato?

Seleccione una:

- ☐ a. A) Un vaso dilatador que se utiliza para la reducción de postcarga del ventrículo izquierdo. 

¡Bien, correcto!

- ☐ b. B) Un precursor de la norepinefrina.
- ☐ c. C) Un agonista beta adrenérgico que estimula receptores beta 1 y 2 y alfa 1 adrenérgico.
- ☐ d. D) Una droga inotrópica.

### Pregunta 38

Correcta


Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

327.- Señale la opción incorrecta sobre la insuficiencia mitral aguda:

Seleccione una:

- ☐ a. A) Suele aparecer entre el segundo y quinto día del infarto. 
- ¡Bien, correcto!
- ☐ b. B) Clínicamente se manifiesta por la aparición de edema agudo de pulmón y cuadro de bajo gasto.
- ☐ c. C) El pronóstico de estos pacientes es infausto.
- ☐ d. D) Hay acuerdo general en que el tratamiento de elección es la cirugía.

### Pregunta 39

Correcta


Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

205.- Indique de las siguientes, la respuesta incorrecta:

Seleccione una:

- ☐ a. A) La postcarga es la tensión sistólica de la pared durante la contracción ventricular.
- ☐ b. B) Contractilidad, es la fuerza contráctil que puede generarse respecto a un determinado grado de distensión diastólica.
- ☐ c. C) En la taquicardia se produce un aumento del consumo miocárdico de oxígeno.
- ☐ d. D) Cuando aumenta la frecuencia cardíaca, el tiempo para el llenado durante la diástole también aumenta. 

¡Bien, correcto!

### Pregunta 40

Correcta


Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

409.- Se dice que dos extrasístoles son unifocales cuando:

Seleccione una:

- ☒ a. A) Proceden de un único foco. 
- ☐ b. B) Proceden de varios focos.
- ☐ c. C) Proceden de uno o dos focos.
- ☐ d. D) A y c son correctas.

¡Bien, correcto!

### Pregunta 41

Correcta


Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

206.- Cuando se desarrolla la insuficiencia cardíaca congestiva, se producen una serie de mecanismos compensadores secundarios, como puede ser:

Seleccione una:

- ☒ a. A) Activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y de la hormona antidiurética.
- ☐ b. B) Aumento del volumen ventricular izquierdo y la masa ventricular.
- ☐ c. C) Aumento de las resistencias vasculares sistémicas.
- ☐ d. D) Todas las anteriores son correctas. 

¡Bien, correcto!

### Pregunta 42

Correcta


Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

414.- Son arritmias hipoactivas todas las siguientes, excepto:

Seleccione una:

- ☒ a. A) Flutter auricular. 
- ☐ b. B) Bradicardia sinusal.
- ☐ c. C) Impulso y ritmo de escape.
- ☐ d. D) Bloqueo AV.

¡Bien, correcto!

### Pregunta 43

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

406.- En el síndrome de preexcitación. Indique la correcta.

Seleccione una:

- ☐ a. A) La prevalencia de este síndrome en la población general se estima entre el 10-30%
- ☐ b. B) Es más frecuente en mujeres que en hombres.
- ☐ c. C) La adenosina lo hacen ser el fármaco de elección.
- ☐ d. D) Es la segunda forma más frecuente de TSV.

¡Bien, correcto!

### Pregunta 44

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

305.- La angioplastia primaria se recomendaría para; señale la falsa.

Seleccione una:

- ☐ a. A) Pacientes con by-pass coronario en los que los trombolíticos son poco eficaces.
- ☐ b. B) Pacientes con shock cardiogénico mayores de 85 años y tras 12 horas de la instauración del shock.
- ☐ c. C) Pacientes con IAM extensos o historias de infartos previos.
- ☐ d. D) A y c son correctas.

Mal, debes repasar un poco

### Pregunta 45

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

316.- Qué agente trombolítico de los que a continuación se enumeran posee una vida media más alta:

Seleccione una:

- ☐ a. A) La uroquinasa.
- ☐ b. B) La estreptoquinasa.
- ☐ c. C) Alteplasa.
- ☐ d. D) Reteplasa.

Mal, debes repasar un poco



## Pregunta 46

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

209.- ¿Qué presión pulmonar capilar se debe alcanzar para el desarrollo de edema pulmonar?

Seleccione una:

☐ a. A) 15 mmHg.

☐ b. B) 20 mmHg.

¡Bien, correcto!

☐ c. C) 8 mmHg.

☐ d. D) Ninguna es correcta.

## Pregunta 47

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

314.- Son indicadores clínicos de mal pronóstico tras un IAM, todos los siguientes, excepto:

Seleccione una:

☐ a. A) Edad menor de 70 años.

¡Bien, correcto!

☐ b. B) Diabetes mellitus.

☐ c. C) No recibir tratamiento de revascularización.

☐ d. D) Incapacidad para realizar una prueba de esfuerzo.

## Pregunta 48

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

419.- La realización de un EEF debe plantearse en pacientes que cumplan una de estas características, señale la opción incorrecta:

Seleccione una:

☐ a. A) Crisis de taquicardias frecuentes (5 o más episodios anuales)

☐ b. B) Mala tolerancia hemodinámica de la arritmia: síncope, hipotensión, etc.

☐ c. C) Preferencia del paciente.

Mal, debes repasar un poco

☐ d. D) B y c son correctas.

## Pregunta 49

Correcta


Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

328.- ¿En cuál de estas complicaciones mecánicas en un IAM pueden aparecer zonas disquinéticas en el Ventrículo izquierdo que pueden acabar desarrollando un aneurisma?

Seleccione una:

- ☐ a. A) Rotura de pared libre.
- ☐ b. B) Aneurisma ventricular. 
- ¡Bien, correcto!
- ☐ c. C) Pseudoaneurisma ventricular.
- ☐ d. D) Trombosis intraventricular.

## Pregunta 50

Correcta


Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

306.- La complicación mecánica que se manifiesta clínicamente por la aparición de edema de pulmón y cuadro de bajo gasto es:

Seleccione una:

- ☐ a. A) Rotura de pared libre.
- ☐ b. B) Aneurisma ventricular.
- ☐ c. C) Insuficiencia mitral aguda. 
- ¡Bien, correcto!
- ☐ d. D) Síndrome de Dressler.