

Pregunta 1

122.- ¿Cuál de los siguientes no es un signo de hematoma subdural agudo?

Seleccione una:

- a. A) Convulsiones. Correcta|Bien, correcto!
- b. B) Fluctuación del nivel de conciencia.
- c. C) Hemiparesia.
- d. D) Cefalea.

Pregunta 2

205.- Son signos de sospecha de fractura de base de cráneo de la fosa anterior todos los siguientes, excepto:

Seleccione una:

- a. Hematoma subcutáneo en gafas.
- b. Otorragia o licuorrea. Correcta|Bien, correcto !!
- c. Salida de líquido cefalorraquídeo.
- d. Lesión de los 6 primeros pares craneales.

Pregunta 3

123.- Son todas posibles lesiones ante un traumatismo craneoencefálico, excepto:

Seleccione una:

- a. A) Conmoción cerebral.
- b. B) Edema cerebral.
- c. C) Fractura de fémur. Correcta|Bien, correcto!
- d. D) Hemorragia intracraneal.

Pregunta 4

128.- En las fracturas de cráneo compuestas:

Seleccione una:

- a. A) Existe comunicación directa entre la laceración del cuero cabelludo y la sustancia cerebral.
- b. B) La interconsulta con el neurocirujano está indicada siempre.
- c. C) Suelen administrarse antibióticos.
- d. D) Todas son correctas. Correcta|Bien, correcto!

Pregunta 5

119.- Los ojos de muñeca aparecen cuando están afectados los siguientes pares craneales:

Seleccione una:

- a. A) III, IV y VI. Correcta|Bien, correcto!
- b. B) II, IV y VI.
- c. C) II, V y VI.
- d. D) III, V y VI.

Pregunta 6

125.- Una puntuación menor de 8 puntos en la escala de trauma pediátrico requiere:

Seleccione una:

- a. A) No requiere una atención especial.
- b. B) Ser ingresado en el hospital de día.
- c. C) Un centro especializado. Correcta|Bien, correcto!
- d. D) Ser intervenido urgentemente.

Pregunta 7

124.- Uno de los principales objetivos en el tratamiento de la lesión cerebral es:

Seleccione una:

- a. A) Controlar la presión arterial.
- b. B) Vigilar la presión venosa central.
- c. C) Controlar la presión intracraneal. Correcta|Bien, correcto!**
- d. D) Ninguna es correcta.

Pregunta 8

117.- ¿Qué entendemos por TCE lo suficientemente importante para provocar lesión tisular y/o vascular?

Seleccione una:

- a. A) Edema cerebral.
- b. B) Contusión cerebral. Correcta|Bien, correcto!**
- c. C) Conmoción cerebral.
- d. D) Todas son verdaderas.

Pregunta 9

118.- ¿Qué Glasgow tendrá un niño menor de 2 años con apertura ocular espontánea, llanto irritable y retirada al tacto?

Seleccione una:

- a. A) 10.
- b. B) 11
- c. C) 13. Correcta|Bien, correcto!**
- d. D) 16.

Pregunta 10

203.- Aplicando la escala de trauma pediátrico que puntuación obtendría un niño que ha sufrido un TCE y en la que tras valorarlo obtenemos los siguientes datos; peso 16 kg. Vía aérea normal, SNC, obnubilado, TIC >90mmHG, heridas leves y sin fractura ósea:

Seleccione una:

- a. 10 puntos.
- b. 9 puntos. Correcta|Bien, correcto !!**
- c. 19 puntos
- d. 12 puntos.