

Comenzado el	sábado, 25 de agosto de 2018, 18:30
Estado	Finalizado
Finalizado en	sábado, 25 de agosto de 2018, 19:04
Tiempo empleado	34 minutos 26 segundos
Puntos	13,00/20,00
Calificación	6,50 de 10,00 (65%)
Comentario -	Ha superado el examen, pero recuerde que es necesaria una nota media final superior al 80% para superar el curso

Pregunta **1**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Con qué tipo de mascarilla podemos llegar a una FiO2 del 100 por ciento usando un flujo de entre 6-15 l/min

- Seleccione una:
- ☐ a. Mascarilla Venturi.
 - ☐ b. Ninguna de las opciones es correcta
 - ☐ c. Mascarilla simple.
 - ☒ d. Mascarilla con reservorio. ✓

La respuesta correcta es: Mascarilla con reservorio.

Pregunta **2**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Con respecto a la administración de enemas. Indica el correcto.

- Seleccione una:
- ☐ a. Ninguna de las opciones es correcta.
 - ☐ b. Opción 2: Presionar e introducir lentamente la solución. En caso de sensación de plenitud, calambres, dolor o reacción vagal, disminuir o suspender la infusión.
 - ☒ c. Las opciones 1 y 2 son correctas. ✓
 - ☐ d. Opción 1: La profundidad es variable dependiendo de la edad del paciente: 2.5-3.5cm en lactantes y 5-7.5cm en niños.

La respuesta correcta es: Las opciones 1 y 2 son correctas.

Pregunta **3**
Incorrecta
Puntúa 0,00 sobre 1,00

Con respecto a la toma de la frecuencia respiratoria. Indica la incorrecta:

- Seleccione una:
- ☐ a. Dejar al descubierto el tórax de paciente. Observar y contar las elevaciones del tórax y abdomen del paciente durante 1 minuto.
 - ☐ b. Si durante la toma el paciente tose, habla o experimenta algún cambio que pueda alterar el parámetro, se anota y no se repite la medición.
 - ☒ c. Se debe realizar sin que el paciente ejerza ningún tipo de acción sobre su respiración, haciendo que sea lo más natural posible. Comprobar que no haya realizado ningún ejercicio físico ni emocional antes, si es así, esperar 30 - 40 min para realizar la técnica. ✗
 - ☐ d. Ninguna de las opciones es correcta.

La respuesta correcta es: Dejar al descubierto el tórax de paciente. Observar y contar las elevaciones del tórax y abdomen del paciente durante 1 minuto.

Pregunta **4**

Incorrecta

Puntúa 0,00
sobre 1,00

Con respecto a la toma de la saturación de oxígeno. Indica la correcta.

Seleccione una:

- ☐ a. Ninguna de las opciones es correcta.
- ☐ b. Comprobar que la toma de la saturación que registramos es la que coincide cuando la curva del aparato es correcta.
- ☐ c. En condiciones normales debe estar por encima del 90%.
- ☒ d. Hay que tener en cuenta que si vamos a mantener puesto el pulsioxímetro durante días hay que cambiar la localización del sensor una vez al día, para evitar lesiones en la piel. ✖

La respuesta correcta es: Comprobar que la toma de la saturación que registramos es la que coincide cuando la curva del aparato es correcta.

Pregunta **5**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Con respecto a las consideraciones a tener en cuenta con el niño a la hora de la realización de una técnica. Indica la correcta.

Seleccione una:

- ☒ a. Las opciones 1 y 2 son correctas. ✔
- ☐ b. Opción 1: Siempre hay que decir la verdad al niño, ya que la mentira hace perder la confianza del niño hacia los profesionales.
- ☐ c. Opción 2: Tener en cuenta que cada niño reacciona de manera diferente ante una misma situación, que su reacción no es mejor ni peor, no se debe comparar. Si el niño presenta una rabieta debemos obviarla, manteniendo una actitud firme y positiva.
- ☐ d. Ninguna de las opciones es correcta.

La respuesta correcta es: Las opciones 1 y 2 son correctas.

Pregunta **6**

Incorrecta

Puntúa 0,00
sobre 1,00

Con respecto a las consideraciones que tenemos que tener en cuenta con la familia del paciente a la hora de realizar una técnica. Indica la incorrecta

Seleccione una:

- ☐ a. Ninguna de las opciones es correcta.
- ☐ b. Siempre que el procedimiento lo permita, serán los padres los que lo realicen, como la toma de medicación oral, recogida de muestra de orina, etc.
- ☐ c. La presencia de los padres durante la realización del procedimiento debe ser obligatoria en todos los procedimientos; en muchas ocasiones la familia va a ser el mejor apoyo que el niño puede tener durante la realización de la técnica.
- ☒ d. Es adecuado pedir ayuda a los familiares para inmovilizar al niño, ya que suponen un apoyo en procedimientos desagradables. ✖

La respuesta correcta es: Siempre que el procedimiento lo permita, serán los padres los que lo realicen, como la toma de medicación oral, recogida de muestra de orina, etc.

Pregunta **7**

Incorrecta

Puntúa 0,00
sobre 1,00

Con respecto a las recomendaciones comunes para la preparación del niño antes de la realización de cualquier procedimiento, durante y después del mismo. Indica la incorrecta

Seleccione una:

- ☐ a. Ninguna de las opciones es correcta.
- ☒ b. Limitar el número de personas extrañas durante el procedimiento. Centrarse primero en el procedimiento y luego en el niño. ✖
- ☐ c. Comprobar la correcta identificación del paciente.
- ☐ d. No avisar al niño del inicio del procedimiento, no pedir su colaboración ni ir explicándole en todo momento paso a paso todo lo que le vamos haciendo para no crearle más ansiedad.

La respuesta correcta es: No avisar al niño del inicio del procedimiento, no pedir su colaboración ni ir explicándole en todo momento paso a paso todo lo que le vamos haciendo para no crearle más ansiedad.

Pregunta **8**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Cuál es la técnica de elección para recoger una muestra de orina cuando los niños no controlan la micción

Seleccione una:

- ☒ a. Con bolsa adhesiva perineal. ✔
- ☐ b. Sondaje vesical.
- ☐ c. Por micción espontánea.
- ☐ d. Ninguna de las opciones es correcta.

La respuesta correcta es: Con bolsa adhesiva perineal.

Pregunta **9**

Incorrecta

Puntúa 0,00
sobre 1,00

En la colocación de una férula, indica lo incorrecto:

Seleccione una:

- ☒ a. Se procede a la realización de la férula. Para ello se mide la longitud necesaria de la zona donde se vaya a colocar la férula. A continuación, se realizan dobleces de la venda de escayola utilizando entre 10-12 capas. ✔
- ☐ b. Todas son correctas
- ☐ c. Se retirarán pulseras, anillos y otros enseres que puedan entorpecer la realización de la técnica y para prevenir la posible aparición de edema del miembro que se va a inmovilizar.
- ☐ d. Se procede a proteger la piel: Vendaje tubular: se realiza para evitar que el vello del miembro se quede pegado al yeso, facilitando la transpiración, elimina las asperezas de los extremos del yeso y facilita la retirada del mismo. La venda tubular se dobla sobre el yeso una vez colocado éste.

La respuesta correcta es: Se procede a la realización de la férula. Para ello se mide la longitud necesaria de la zona donde se vaya a colocar la férula. A continuación, se realizan dobleces de la venda de escayola utilizando entre 10-12 capas.

Pregunta **10**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

En la técnica de aspiración de secreciones. Indica lo correcto

Seleccione una:

- ☒ a. Esta técnica se realiza para la toma de muestras de un esputo inducido o de muestras de secreciones faríngeas. ✔
- ☐ b. Es una técnica no estéril.
- ☐ c. Se puede realizar tras las comidas.
- ☐ d. Ninguna de las opciones es correcta

La respuesta correcta es: Esta técnica se realiza para la toma de muestras de un esputo inducido o de muestras de secreciones faríngeas.

Pregunta **11**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

En la ventilación con bolsa autohinchable. Indica la incorrecta.

Seleccione una:

- ☐ a. Se retira el cabecero de la cama en el caso que el paciente esté en una cama y se separa de la pared.
- ☒ b. Se conecta la bolsa autohinchable a la toma de oxígeno para realizar una hiperoxigenación con una FiO2 del 50% según indicaciones. Colocar la mascarilla en la cara del paciente cubriendo nariz y boca con la mano dominante abarcando la mascarilla y el mentón del paciente. ✓
- ☐ c. Hay que comprobar el correcto funcionamiento de la toma de oxígeno.
- ☐ d. Colocar al paciente en posición olfateo. Coger la bolsa autohinchable del tamaño adecuado al niño y colocarle la mascarilla apropiada.

La respuesta correcta es: Se conecta la bolsa autohinchable a la toma de oxígeno para realizar una hiperoxigenación con una FiO2 del 50% según indicaciones. Colocar la mascarilla en la cara del paciente cubriendo nariz y boca con la mano dominante abarcando la mascarilla y el mentón del paciente.

Pregunta **12**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

En qué etapa del desarrollo del niño, la comunicación con su entorno se produce principalmente por el tacto y el contacto

Seleccione una:

- ☐ a. Niño pequeño.
- ☒ b. Neonato. ✓
- ☐ c. Ninguna de las opciones es correcta.
- ☐ d. Lactante.

La respuesta correcta es: Neonato.

Pregunta **13**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Indica cuál de los siguientes no es un objetivo para colocar una sonda nasogástrica.

Seleccione una:

- ☐ a. Aspiración o drenaje del contenido gástrico con fines diagnósticos o terapéuticos.
- ☒ b. Administración de alimentación oral. ✓
- ☐ c. Realizar lavado gástrico en caso de intoxicaciones.
- ☐ d. Ninguna de las opciones es correcta.

La respuesta correcta es: Administración de alimentación oral.

Pregunta **14**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Indica la afirmación correcta de la administración de carbón activado.

Seleccione una:

- ☐ a. No se puede repetir la dosis si lo vomitan.
- ☒ b. Está contraindicado en la ingestión de cáusticos. ✓
- ☐ c. Ninguna de las opciones es correcta.
- ☐ d. Si se administra por vía oral, se puede dar solo o mezclar con agua, zumo, lácteos o bebidas carbonatada.

La respuesta correcta es: Está contraindicado en la ingestión de cáusticos.

Pregunta **15**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Indica qué tenemos que tener en cuenta cuando retiramos un catéter periférico

Seleccione una:

- ☐ a. No es necesario observar el punto de inserción del catéter ya que lo estamos retirando.
- ☐ b. Ninguna de las opciones es correcta.
- ☐ c. Mantener la presión durante 5-7 minutos. Si el paciente tiene algún problema de coagulación mantenerla durante 15 minutos.
- ☒ d. Observar que el catéter está íntegro, si no lo estuviera hay que notificarlo al personal responsable inmediatamente. ✓

La respuesta correcta es: Observar que el catéter está íntegro, si no lo estuviera hay que notificarlo al personal responsable inmediatamente.

Pregunta **16**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

La temperatura central se toma en

Seleccione una:

- ☐ a. La cavidad oral.
- ☐ b. Ninguna de las opciones es correcta.
- ☒ c. El recto. ✓
- ☐ d. La axila.

La respuesta correcta es: El recto.

Pregunta **17**

Incorrecta

Puntúa 0,00
sobre 1,00

Para la administración de fármacos por vía respiratoria a través de aerosoles/inhaladores con cámara expansora. Indica lo incorrecto.

Seleccione una:

- ☐ a. Acoplar en el lado contrario la mascarilla del tamaño del paciente y se le coloca en la cara abarcando sólo la nariz.
- ☐ b. Sin separar la mascarilla de la cara del paciente de administra un puff del fármaco mientras contamos hasta 10 a un ritmo normal mientras que el paciente va respirando, cuando hemos terminado podemos o retirar la mascarilla o volver a administrar
- ☒ c. Se colocará al paciente en decúbito supino. ✗
- ☐ d. Acoplar el inhalador a la cámara en posición vertical haciendo forma de L.

La respuesta correcta es: Sin separar la mascarilla de la cara del paciente de administra un puff del fármaco mientras contamos hasta 10 a un ritmo normal mientras que el paciente va respirando, cuando hemos terminado podemos o retirar la mascarilla o volver a administrar

Pregunta **18**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Qué férula es la que va desde las cabezas de los metatarsianos hasta el extremo superior de la pantorrilla, en un punto situado 3-4 cm por debajo del tubérculo de la tibia

Seleccione una:

- ☐ a. Férula isquiomaleolar.
- ☐ b. Férula isquiopédica.
- ☐ c. Ninguna de las opciones es correcta.
- ☒ d. Férula posterior de tobillo o suropédica. ✓

La respuesta correcta es: Férula posterior de tobillo o suropédica.

Pregunta **19**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Qué material es necesario para colocar una férula de Zimmer

Seleccione una:

- ☒ a. Las opciones 1 y 2 son correctas. ✓
- ☐ b. Opción 2: Venda de algodón y venda elástica.
- ☐ c. Opción 1: Tiras de esparadrapo y férula de aluminio.
- ☐ d. Ninguna de las opciones es correcta.

La respuesta correcta es: Las opciones 1 y 2 son correctas.

Pregunta **20**

Incorrecta

Puntúa 0,00
sobre 1,00

Si tomamos la frecuencia cardíaca a través de un monitor. Dónde se coloca el electrodo amarillo previa limpieza de la piel del paciente

Seleccione una:

- ☐ a. Debajo de la clavícula, cerca del hombro izquierdo.
- ☐ b. Ninguna de las opciones es correcta.
- ☒ c. Debajo de la clavícula, cerca del hombro derecho. ✗
- ☐ d. En el lado inferior izquierdo debajo del abdomen, o debajo del apéndice xifoides.

La respuesta correcta es: Debajo de la clavícula, cerca del hombro izquierdo.

[◀ Anexo: Planificación de cuidados](#)

Ir a...

[Examen final del curso ▶](#)