

## Test 2

### Radiografía simple de tórax

#### Pregunta 1

De las siguientes entidades cual no presenta brocograma aéreo:

- a. Enfermedad de la membrana hialina
- b. Adenocarcinoma de pulmón**
- c. Linfomas con afectación pulmonar
- d. Neumonía

#### Pregunta 2

Es cierto respecto al signo cervico – torácico:

- a. No es de utilidad localización de lesiones pulmonares
- b. Si la lesión es posterior se ve solo parcialmente
- c. Si la lesión es anterior se visualiza de forma parcial hasta las clavículas en RX de tórax**
- d. Todas las lesiones anteriores se localizan en el tórax

#### Pregunta 3

Son hallazgos propios de las neumonías víricas:

- a. Nodulillos centro lobulillares mal delimitados de 4-10 mm
- b. Opacidades en vidrio deslustrado
- c. Consolidación pulmonar e hiperinsuflación
- d. Todas son ciertas**

#### Pregunta 4

Las infecciones pulmonares por micobacterias atípicas:

- a. El germen más frecuentemente es el micobacterium avium intracelulare
- b. Se dan en pacientes VIH inmuno deprimidos
- c. Cursas adenopatías hiliares y mediastínicas
- d. Todas son ciertas**

#### Pregunta 5

¿Qué cuadro de los siguientes puede cursar con megaesofago en una placa de torax?

- a. Amebiasis
- b. Equinocosis
- c. Enfermedad de chagas**

- d. Paludismo

Pregunta 6

Respecto al tumor de Pancoast no es cierto:

- a. **La mayoría son adenocarcinomas**
- b. Es un 4% de los cánceres de pulmón
- c. Invade el plexo braquial en ocasiones
- d. Más frecuente en LSD

Pregunta 7

El signo de nenúfar y de la semiluna es típico de uno de los siguientes cuadros:

- a. Aspergilosis
- b. **Equinocosis**
- c. Sida
- d. Tuberculosis

Pregunta 8

En las neumonitis por hipersensibilidad es falso:

- a. **Siempre evoluciona a fibrosis pulmonar**
- b. La fibrosis pulmonar es más frecuente en el pulmón de criador de pájaros
- c. Cursa con nodulillos centro lobulilares
- d. Puede aparecer enfisema pulmonar

Pregunta 9

La neumopatía intersticial usual cuando evoluciona a fibrosis pulmonar empieza normalmente por:

- a. Lóbulos superiores
- b. **Lóbulos inferiores**
- c. Lóbulo medio
- d. Ninguna es cierta

Pregunta 10

La radiografía simple de tórax es respecto al total de las exploraciones radiológicas supone aproximadamente:

- a. 20% del total
- b. 80% del total
- c. 60% del total

**d. 40% del total**