

Pregunta **1**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué conceptos básicos deben tenerse en cuenta en la elección de métodos anticonceptivos?

Seleccione una:

a.

Inseguridad, poco efectivo y dificultad.

b.

Ayudan a conocer el funcionamiento del cuerpo, requieren por parte de la mujer habilidad y destreza.

c.

Seguridad, eficacia y facilidad.

Pregunta **2**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuáles son los métodos naturales?

Seleccione una:

a.

Dispositivos hormonales de liberación local o anillo vaginal.

b.

Temperatura basal, abstinencia periódica, duchas vaginales, lactancia materna.

c.

Píldora postcoital, diafragma, ligadura tubárica.

Pregunta **3**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La lactancia materna, ¿qué % cubre de anticoncepción?

Seleccione una:

a.

El 80%.

b.

El 50%.

c.

El 75%.

Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El diafragma, ¿qué contraindicaciones absolutas presenta?

Seleccione una:

a.

El útero en retroversión severa.

b.

Prolapso uterino severo y el rectocele.

c.
El puerperio hasta la 6º semana.

Pregunta **5**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué información debemos ofrecerle a una mujer que desea tomarse la píldora (anticoncepción hormonal)?

Seleccione una:

- a.
No es necesario seguir indicaciones médicas ni de laboratorio a la hora de la toma de la píldora.
- b.
Recordamos que tomará la píldora durante 21 días y descansará 7 días.
- c.
No es necesario elegir un día y una hora para tomarla todos los días.

Pregunta **6**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los posibles efectos adversos que puede encontrar una mujer con la píldora son:

Seleccione una:

- a.
Pérdida de peso, aumento del estado del ánimo.
- b.
Aparición de estreñimiento.
- c.
Retención hídrica y cefaleas.

Pregunta **7**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Al hombre que se realiza la vasectomía, ¿qué medidas debe seguir?

Seleccione una:

- a.
Se aconsejará utilizar otros medios de anticoncepción durante los seis primeros siguientes hasta que dé negativo dos espermogramas realizados.
- b.
Es importante informar al hombre vasectomizado que existen efectos secundarios en la actividad sexual y el volumen de eyaculación se mantiene.
- c.
Estos medios de esterilización no previenen de enfermedades de transmisión sexual.

Pregunta **8**
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El aborto eugenésico:

Seleccione una:

- a.
Por las causas supuestas según la legislación vigente. Se realizará antes de las 12 semanas de gestación.
- b.
La intervención será hasta las 22 semanas de gestación por defecto físico o psíquico importante del feto.
- c.
Se realiza en caso de violación, previa denuncia en los 5 primeros días siguientes y hasta las 12 semanas de gestación.

Pregunta **9**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué pautas de administración se deben seguir en la píldora del día después?

Seleccione una:

- a.
Sería antes de las 96 horas tras el coito desprotegido, acudiendo a los lugares de dispensación.
- b.
En caso de vómito tras la inyecta poner antieméticos y no repetir la dosis al día siguiente.
- c.

La administración se efectúa en dos fases, en donde la 1º toma es en el mismo momento tras la prescripción, 12 horas después la 2º toma.

Pregunta **10**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuándo está contraindicada la pastilla del día después?

Seleccione una:

- a.
En mayores de edad se precisa consentimiento de los padres o tutores.
- b.
Anteriores coitos protegidos.
- c.

En caso de test de embarazo positivo.