

Pregunta **1**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Las ITUS se definen como la presencia de microorganismos en el tracto urinario, incluyendo vejiga, próstata, sistema colector y riñones. Señale a respuesta correcta en relación a su sintomatología:

Seleccione una:

a.

Ninguna es correcta.

b.

Urgencia urinaria: Necesidad imperiosa de orinar.

c.

Disuria: Micciones frecuentes de escasa cantidad de orina.

Pregunta **2**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale la respuesta incorrecta en relación a las ITUS:

Seleccione una:

a.

El 80% de las ITU intrahospitalarias están asociadas al sondaje vesical.

b.

Suele ser más frecuente en la mujer que en el varón debida a la anatomía de la uretra de esta, que favorece la presencia de infecciones urinarias, siendo máxima en los periodos de actividad sexual y embarazo.

c.

Ninguna es correcta.

Pregunta **3**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De acuerdo con los siguientes conceptos relacionados con las ITU señale la respuesta correcta:

Seleccione una:

a.

Orina contaminada: Presencia de 5 o más bacterias en grandes cantidades y que pueden expresar una mala recogida de la muestra.

b.

Reinfección: Aparición de un germen distinto tras un tratamiento eficaz. Suele producirse en mujeres jóvenes.

c.

Ninguna es correcta.

Pregunta **4**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Algunos de los tipos de infecciones urinarias son:

Seleccione una:

a.

Infección urinaria baja: Pielonefritis.

b.

Síndrome uretral agudo.

c.

Ambas son correctas.

Pregunta **5**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Dentro de la infección urinaria alta: Pielonefritis, la podemos clasificar en complicadas y no complicadas. Señale la respuesta correcta:

Seleccione una:



a.

La pielonefritis complicada cursa con fiebre y escalofríos.



b.

El hecho de que la mujer en las relaciones sexuales utilice espermicidas o diafragmas con espermicidas puede derivar en una pielonefritis complicada.



c.

Ninguna es correcta.

Pregunta **6**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Para el tratamiento de la pielonefritis complicada es cierto que:

Seleccione una:



a.

Se debe iniciar el tratamiento de urgencias con antibióticos de amplio espectro.



b.

Ninguna es correcta.



c.

Se debe hospitalizar si existe hipotensión arterial.

Pregunta **7**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La cistitis es un proceso inflamatorio de la mucosa de la vejiga urinaria. Es considerada:

Seleccione una:

a.

Infección urinaria media.

b.

Infección urinaria baja.

c.

Infección urinaria alta.

Pregunta **8**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La cistitis poscoital en mujeres jóvenes sexualmente activas se presenta en las horas siguientes a las relaciones sexuales. Este proceso se puede evitar con:

Seleccione una:

a.

Aplicación de cremas antisépticas periuretrales antes del mismo.

b.

Ambas son correctas.

c.

Vaciamiento vesical completo antes del coito y poscoito.

Pregunta **9**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Para el tratamiento de la cistitis simple utilizaremos:

Seleccione una:

a.

Cefalosporinas de 1ª o 2ª generación durante 7 días.

b.

Fluoroquinas.

c.

Ninguna es correcta.

Pregunta **10**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El síndrome uretral agudo puede estar producido por:

Seleccione una:

a.

Traumatismos génito-urinarios.

b.

Tricomoniasis, candidiasis, neisseria gonorrhoeae y herpes simple.

c.

Ambas son correctas.

Pregunta **11**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Para el diagnóstico del síndrome uretral agudo, señale la respuesta correcta:

Seleccione una:

a.

Cultivo de orina: Bacteriuria significativa.

b.

Sistemático de orina: Normal o piuria > 8 leucocitos/campo.

c.

Ninguna es correcta.

Pregunta **12**

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Algunos factores que favorecen el riesgo de infección son:

Seleccione una:

a.

Ambas son correctas.

b.

Utilización de diafragmas y espermicidas.

c.

Las relaciones sexuales.

Pregunta **13**

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Entre las recomendaciones generales, se debe indicar:

Seleccione una:

a.

El aumento de la ingesta de líquidos, 2.000 ml de agua cada 48 horas, ingerida en cantidades que no sobrepasen los 50 ml.

b.

Ninguna es correcta.

c.

Abstinencia sexual en la fase aguda e higiene personal.

Pregunta **14**

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Para la prevención de la litiasis está indicado:

Seleccione una:



a.

Ambas son correctas.



b.

Pauta dietética y medicamentosa a demanda, según composición de cálculos.



c.

Realizar las pruebas diagnósticas correspondientes.

Pregunta **15**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale la respuesta correcta en relación al reflujo vesículo-uretral:

Seleccione una:



a.

La presencia de malformaciones de las válvulas uretrales, puede provocar daños del parénquima renal.



b.

El reflujo está presente aproximadamente en el 70-80% de los niños con bacteriuria sintomática o asintomática.



c.

Ninguna es correcta.

Pregunta **16**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Para la prevención del reflujo vesículo-uretral está indicado:

Seleccione una:



a.

Realización de sedimentos y cultivos periódicos.

b.

Tratamiento antibiótico de elección durante periodos cortos de tiempo.

c.

Ambas son correctas.

Pregunta **17**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale la respuesta correcta en relación a las anomalías del tracto urinario durante el embarazo:

Seleccione una:

a.

Ninguna es correcta.

b.

La infección urinaria en la gestante aparece con mayor frecuencia entre las 20-25 semanas de gestación.

c.

Entre el 2-12% de las embarazadas padecen bacteriuria que si no se trata puede desarrollar pielonefritis aguda.

Pregunta **18**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale la respuesta correcta en relación a las anomalías del tracto urinario en diabéticos:

Seleccione una:

a.

Se debe valorar la presencia de necrosis papilar.

b.

Ambas son correctas.



c.

Este grupo de pacientes suelen desarrollar más episodios de bacteriuria que otros.

Pregunta **19**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale la respuesta correcta en relación al Test de esterasa leucocitaria:

Seleccione una:



a.

Tira reactiva que sumergida en orina se vuelve de color marrón en 6 o 7 minutos.



b.

Tira reactiva que sumergida en orina se vuelve de color verde en 1 o 2 minutos.



c.

Tira reactiva que sumergida en orina se vuelve de color azul en 1 o 2 minutos.

Pregunta **20**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En los episodios aislados de infección del tracto urinario, es cierto que:

Seleccione una:



a.

La clínica de presentación vendrá dada por un síndrome miccional, a veces con fiebre y orina clara.



b.

El grupo más afectado serán mujeres y el microorganismo más común es E. coli.



c.

Ninguna es correcta.