

Comenzado el lunes, 17 de agosto de 2020, 11:52

Estado Finalizado

Finalizado en lunes, 17 de agosto de 2020, 11:58

Tiempo empleado 5 minutos 56 segundos

Puntos 13,00/17,00

Calificación 7,65 de 10,00 (76%)

Pregunta **1**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Señala la respuesta incorrecta:

Seleccione una:

- a. La ventilación con balón sin bolsa reservorio proporciona concentraciones de O₂ del 90%. ✓
- b. Mediante balón acoplado a bolsa reservorio y O₂ a alto flujo, se consiguen concentraciones de O₂ próximas al 100%.
- c. La mayor dificultad en la ventilación con balón de reanimación, reside en el sellado de la mascarilla.

Pregunta **2**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuáles de estos grados de la clasificación de Cormack y Lehane son indicativos de dificultad laringoscópica?

Seleccione una:

- a. Grado 2.
- b. Grado 1.
- c. Grado 3. ✓

Pregunta **3**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La ventilación pulmonar (respiración), consta de:

Seleccione una:

- a. Inspiración.
- b. Inspiración y Espiración. ✓
- c. Espiración.

Pregunta 4

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

El modo de ventilación mecánica que, habitualmente, se usa en el paciente intubado de emergencia es:

Seleccione una:

- a. CPAP. ✘
- b. SIMV.
- c. CMV.

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál sería el segundo método de elección (tras la intubación orotraqueal) en el medio extrahospitalario?

Seleccione una:

- a. Intubación nasotraqueal.
- b. Mascarilla laríngea. ✔
- c. Punción cricotiroides.

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La Ventilación mecánica:

Seleccione una:

- a. Todo es cierto. ✔
- b. Puede provocar barotrauma.
- c. mejora la hipoxemia.

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de los siguientes enunciados define de manera más precisa la situación de shock?

Seleccione una:

- a. Acidosis metabólica.
- b. Hipoperfusión hística. ✔
- c. Oligoanuria.

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La adrenalina está indicada principalmente en el tratamiento del shock:

Seleccione una:

- a. Obstructivo.
- b. Distributivo.
- c. Anafiláctico. ✔

Pregunta **9**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

De entre los signos precoces que aparecen en el shock ¿Cuál es el primero en aparecer?

Seleccione una:

- a. Taquicardia.
- b. Piel fría, sudorosa, pálida. ✓
- c. Pulso filiforme.

Pregunta **10**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cuál de los siguientes enunciados es verdadero?

Seleccione una:

- a. El shock cardiogénico es secundario a un fallo miocárdico extrínseco.
- b. Entre las causas de shock refractario no se encuentra el neumotórax. ✗
- c. La hipotensión arterial es un signo tardío.

Pregunta **11**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cuál de los siguientes enunciados es verdadero?

Seleccione una:

- a. Una fractura cerrada puede ser causa de shock hipovolémico.
- b. Todas son verdaderas.
- c. La taquipnea, la disnea y la cianosis son signos específicos de shock. ✗

Pregunta **12**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

El centro de ritmicidad bulbar, genera el ritmo básico del ciclo respiratorio, está formado por dos centros de control interconectados:

Seleccione una:

- a. El centro inspiratorio y el centro espiratorio. ✓
- b. El centro espiratorio que estimula la espiración y el bulbar.
- c. El centro inspiratorio que estimula la inspiración y el piramidal.

Pregunta **13**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Las paredes del corazón están formadas por tres capas distintas:

Seleccione una:

- a. Epicardio, miocardio y endocardio. ✓
- b. Epicardio, miocardio y subendocardio.
- c. Epicardio, pleura parietal y viscaeral.

Pregunta **14**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Las válvulas aurículo-ventriculares, impiden que la sangre retorne a la aurícula una vez que comienza la contracción ventricular:

Seleccione una:

- a. La válvula mitral, corresponde al corazón derecho.
- b. La válvula tricúspide, corresponde al corazón izquierdo.
- c. Las válvulas semilunares, son válvulas con forma de media luna que salen del revestimiento interior de la arteria pulmonar y de la arteria aorta; impiden que la sangre retroceda a los ventrículos desde la aorta y pulmonar. ✓

Pregunta **15**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

El Gasto Cardíaco (GC):

Seleccione una:

- a. Está determinado por el volumen sistólico (VS) y la frecuencia respiratoria (FR).
- b. Está determinado por el volumen diastólico (VD) y la frecuencia cardíaca (FC). El GC se calcula mediante la fórmula de Fick.
- c. Está determinado por el volumen sistólico (VS) y la frecuencia cardíaca (FC); siendo el volumen sistólico el volumen bombeado en cada latido. ✓

Pregunta **16**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Señale la respuesta incorrecta:

Seleccione una:

- a. El encéfalo comprende el cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo. ✗
- b. La sustancia gris es la parte del cuerpo más noble, porque en ella se halla el asiento de los movimientos voluntarios y de las funciones intelectuales más elevadas.
- c. El bulbo raquídeo o medula oblonga es una prolongación de la medula ósea y viene a ser el órgano que establece una comunicación directa entre el cerebro y la medula.

Pregunta **17**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Desde el exterior, el encéfalo aparece dividido en tres partes distintas pero conectadas:

Seleccione una:

- a. Cerebro, cerebelo y tronco encéfalo. ✓
- b. Cerebro, tronco encéfalo y bulbo.
- c. Encéfalo, cerebelo y tronco encéfalo.