

El papel de la Enfermera frente a la Vacunación

Página Principal

ENFERMERÍA Y VACUNAS

CUESTIONARIO EVALUACIÓN FINAL

Cuestionario Evaluación Final

Comenzado el miércoles, 31 de octubre de 2018, 20:08

Estado Finalizado

Finalizado en miércoles, 31 de octubre de 2018, 21:16

Tiempo empleado 1 hora 8 minutos

Puntos 40,00/48,00


Calificación 8,33 de 10,00 (83%)

Principio del formulario

Pregunta 1

Finalizado

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La anafilaxia es una reacción alérgica grave de instauración rápida y potencialmente mortal. Responda de las siguientes respuestas cual no es cierta.


Seleccione una:

- ☐ a. En todo punto de vacunación no hospitalario debe de haber un protocolo de actuación, con de adrenalina y de material de reanimación cardiopulmonar para atender una eventual anafilaxia.
- ☒ b. La anafilaxia es una reacción leve.
- ☐ c. La adrenalina intramuscular es el tratamiento de elección y debe administrarse precozmente, aunque el diagnóstico no sea de certeza.
- ☐ d. Suele manifestarse con síntomas cutáneos como urticaria y angioedema, junto con la afectación de otros sistemas como el respiratorio, el cardiovascular o el digestivo

Pregunta 2

Finalizado

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El toxoide tetánico está considerado como una vacuna muy segura. De las siguientes respuestas cual es falso.


Seleccione una:

- ☐ a. Las mujeres embarazadas con antecedentes de inmunización insuficientes o desconocida deberán recibir como mínimo dos dosis de una vacuna que contenga el toxoide tetánico: la primera, lo antes posible durante el embarazo, y la segunda, al menos cuatro semanas después ya que la antitoxina tetánica materna se transfiere al feto a través de la placenta.
- ☒ b. Las mujeres embarazadas con antecedentes de inmunización insuficiente o desconocida no deben de recibir ninguna dosis de vacuna dosis de una vacuna que contenga el toxoide tetánico.
- ☐ c. Las situaciones de inmunodeficiencia o inmunosupresión no contraindican la administración de la vacuna
- ☐ d. Las respuestas a y c son verdaderas.

Pregunta 3

Finalizado

Puntúa 0,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La vía de administración más utilizada en lactantes de peso normal es:

Seleccione una:


- ☐ a. Intramuscular con ángulo de 90º
- ☐ b. Subcutánea con ángulo 45º
- ☐ c. Intradérmica (ángulo de 15º).

- ☒ d. Se pueden utilizar las tres vías

Pregunta 4

Finalizado

Puntúa 0,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Entre las actuaciones a realizar sobre una enfermera que se incorpora tras una baja laboral prolongada por enfermedad común, se encuentra:


Seleccione una:

- ☒ a. Acudir a la dirección de enfermería para actualizar su alta
- ☐ b. Notificar su reincorporación al servicio de prevención
- ☐ c. Realizar un examen de salud y considerar, si es necesario en función de la situación, cambio de puesto de trabajo.
- ☐ d. Asignarle provisionalmente un puesto laboral en otro servicio

Pregunta 5

Finalizado

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Las vacunas se pueden clasificar en:

Seleccione una:


- ☐ a. Vivas o inactivadas y muertas o atenuadas.
- ☐ b. Atenuadas e inactivadas muertas
- ☐ c. Vivas y muertas

- ☒ d. Vivas o atenuadas y muertas o inactivadas.

Pregunta 6

Finalizado

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En caso de picadura de serpiente, escorpión o araña:


Seleccione una:

- ☐ a. No es una emergencia médica
- ☒ b. Es una emergencia médica y se debe trasladar al paciente al centro médico más cercano
- ☐ c. Se debe realizar una incisión en el lugar de la picadura y succionar el veneno
- ☐ d. Si hay inflamación local y daño del tejido próximo a la mordedura hay que vendar

Pregunta 7

Finalizado

Puntúa 0,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuando un trabajador sanitario se niega a la administración de una vacuna recomendada, procederá:


Seleccione una:

- ☐ a. Declaración de "no apto" para el puesto laboral que ocupa
- ☒ b. Apertura de expediente disciplinario por la empresa
- ☐ c. Valorar la aptitud psicofísica para el puesto por vigilancia de la salud
- ☐ d. Trasladar la negativa a la Dirección de Enfermería correspondiente

Pregunta 8

Finalizado

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuáles son las reacciones adversas más frecuentes de la vacuna frente al Meningococo C?


Seleccione una:

- ☐ a. Cefaleas, vómitos y diarrea
- ☐ b. Muerte súbita del lactante.
- ☐ c. Convulsiones
- ☒ d. Reacciones locales leves (enrojecimiento e hinchazón) y reacciones sistémicas (irritabilidad y fiebre).

Pregunta 9

Finalizado

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Algunas vacunaciones administradas en la infancia, no inducen inmunidad duradera para toda la vida, teniendo que reforzar en edades adultas, de las siguientes respuestas, cual es falsa.

Seleccione una:


- ☐ a. La vacuna frente a la Gripe. Una dosis anual. La vacunación antigripal en algunas CCAA se recomienda desde los 60 años.
- ☐ b. La vacuna frente a la rubeola: todas las mujeres en edad fértil, deben estar vacunadas (utilizando vacuna triple vírica).
- ☐ c. La vacuna frente a la varicela: todas las mujeres en edad fértil, deben estar vacunadas siempre que no exista historia anterior de haber padecido la enfermedad.

- ☒ d. Desde el año 2017 se están produciendo problemas en el suministro de vacunas frente a la hepatitis B, sobre todo de vacunas para adultos. Esta situación no hace necesario establecer recomendaciones de priorización de uso de las dosis disponibles.

Pregunta 10

Finalizado

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Ante la ruptura de la cadena de frío es necesario:


Seleccione una:

- ☒ a. La inmovilización de las vacunas afectadas dentro del frigorífico.
- ☐ b. Almacenar las vacunas en un sitio protegido de la luz.
- ☐ c. Destruir inmediatamente las vacunas.
- ☐ d. Administrarlas inmediatamente

Pregunta 11

Finalizado

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿A qué temperatura se deben conservar las vacunas en el frigorífico?

Seleccione una:


- ☒ a. Entre 2°C y 8°C
- ☐ b. A 0°C
- ☐ c. Entre 0°C y – 2°C

- ☐ d. Ninguna temperatura es correcta.

Pregunta 12

Finalizado

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Una vacuna inactivada o muerta es aquella que:


Seleccione una:

- ☐ a. Los microorganismos que contiene se activan con medios químicos.
- ☐ b. Su respuesta inmunitaria es muy potente.
- ☒ c. Los microorganismos se inactivan por métodos físicos o químicos.
- ☐ d. No existe este tipo de vacuna

Pregunta 13

Finalizado

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Entre los elementos determinantes de la escasa adherencia de los enfermeros/as a la vacunación, se encuentran:


Seleccione una:

- ☐ a. Los comentarios de las redes sociales y de los medios de comunicación
- ☐ b. El miedo a los efectos secundarios de las vacunas
- ☒ c. Falta de información sobre beneficios y seguridad clínica de las vacunas
- ☐ d. Elevada percepción del riesgo en aquellos que trabajan en contacto con los enfermos y su entorno

Pregunta 14

Finalizado

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Como regla general, en el almacenamiento de las vacunas y conservación responda cuál de las siguientes respuestas es cierta.


Seleccione una:

- ☒ a. El intervalo ideal de temperatura para asegurar su perfecta conservación es entre 2 - 8 °C.
- ☐ b. No hay intervalo ideal.
- ☐ c. El intervalo ideal de temperatura para asegurar su perfecta conservación es entre 10 - 12 °C.
- ☐ d. El intervalo ideal de temperatura para asegurar su perfecta conservación es entre 13 - 18 °C.

Pregunta 15

Finalizado

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De las siguientes respuestas indique cuál es verdadera.


Seleccione una:

- ☐ a. La vacunación es una de las intervenciones sanitarias que más influencia tiene en la salud de la población.
- ☐ b. El establecimiento, ejecución y evaluación del calendario de vacunación es competencia de las comunidades autónomas.
- ☐ c. El establecimiento, ejecución y evaluación del calendario de vacunación es competencia del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
- ☒ d. Las respuestas a y b son ciertas.

Pregunta 16

Finalizado

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Según la ficha técnica, ¿Desde qué edad está indicada la vacuna antineumocócica conjugada 13 valente?


Seleccione una:

- ☐ a. Desde las 6 semanas a los 5 años
- ☐ b. A partir solo de los 12 meses.
- ☐ c. Solo en adultos.
- ☒ d. Desde las 6 semanas hasta la edad adulta sin límite de edad

Pregunta 17

Finalizado

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Las personas afectadas por enfermedades crónicas:


Seleccione una:

- ☐ a. No deben preocuparse por su medicación. Hoy en día hay farmacias en todas las ciudades
- ☐ b. No es necesario que avise a su médico
- ☐ c. Con llevar la medicación en el equipaje de mano, para que no la pierdan, es suficiente
- ☒ d. Debe llevar consigo la medicación necesaria para todo el tiempo que dure el viaje

Pregunta 18

Finalizado

Puntúa 0,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Las vacunas frente a la tosferina actualmente utilizadas en España, cuál de las siguientes respuestas es no correcta.


Seleccione una:

- ☐ a. Las vacunas frenen a la tosferina actualmente utilizadas en España No son vacunas inactivadas acelulares.
- ☐ b. La vacunación en la embarazada ha demostrado ser efectiva para prevenir la tos ferina en menores de 3 meses.
- ☐ c. La pauta de vacunación recomendada es de una dosis de dTpa entre las semanas 27 y 36 de gestación (idealmente entre la 28 y la 32). Independientemente de su estado previo de vacunación.
- ☒ d. Las respuestas b y C son correctas.

Pregunta 19

Finalizado

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuando un profesional sanitario ha rechazado la vacunación frente a la gripe, y posteriormente padece un cuadro clínico gripal, podría considerarse:


Seleccione una:

- ☐ a. Que se trata de un trabajador susceptible frente a la vacuna frente a la gripe
- ☐ b. Que no procede otorgarle la baja laboral por enfermedad
- ☒ c. Que podría cuestionarse la patología como enfermedad profesional
- ☐ d. Ninguna de las anteriores

Pregunta 20

Finalizado

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El adyuvante de una vacuna es:


Seleccione una:

- ☐ a. Líquido de suspensión que mezcla los virus de la vacuna
- ☐ b. La solución salina, agua destilada o en ocasiones productos derivados de los cultivos necesarios para la obtención de las vacunas.
- ☐ c. Los preservantes, estabilizantes y antibióticos.
- ☒ d. Compuestos incorporados a las vacunas inactivadas para aumentar la inmunogenicidad de los antígenos.

Pregunta 21

Finalizado

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Entre las vacunas eficaces y recomendadas para las enfermeras embarazadas en el tercer trimestre de su embarazo, no encontramos:


Seleccione una:

- ☐ a. Vacuna frente a la gripe
- ☐ b. Vacuna frente a la hepatitis B
- ☐ c. Vacuna frente al tétanos-difteria
- ☒ d. Vacuna frente a la varicela

Pregunta 22

Finalizado

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La consulta del viajero significa una excelente oportunidad para revisar el historial de inmunizaciones y completar dosis perdidas de vacunas. Esta consulta se realizará:


Seleccione una:

- ☐ a. De 15 a 30 días antes del viaje
- ☒ b. Un mínimo de 4 a 8 semanas antes del viaje
- ☐ c. En cuanto sepamos cuando vamos a realizar el viaje, aunque sea 2 años antes
- ☐ d. Depende del país al que vayamos a viajar

Pregunta 23

Finalizado

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué vacuna está contraindicada en niños con VIH?


Seleccione una:

- ☒ a. La BCG por riesgo de enfermedad local o diseminada en caso de inmunosupresión evolutiva.
- ☐ b. La vacunación antineumocócica con pauta secuencial (VNC13 +VNP23)
- ☐ c. La vacuna VHA.
- ☐ d. Ninguna vacuna está contraindicada

Pregunta 24

Finalizado

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué es el cólera?:


Seleccione una:

- ☐ a. El riesgo de contagiarse en los viajes es alto
- ☐ b. Se contagia por insectos
- ☒ c. El cólera es una enfermedad bacteriana intestinal aguda, causada por el *Vibrio cholerae*
- ☐ d. La vacuna es de virus vivos

Pregunta 25

Finalizado

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Un compañero enfermero tiene interés en conocer su estado vacunal frente a la hepatitis B; para informarse deberá dirigirse a:


Seleccione una:

- ☐ a. Servicio de medicina preventiva de su hospital o centro de salud
- ☐ b. Supervisor/a de su servicio para que le indique como proceder
- ☐ c. Delegado/a sindical de su centro de trabajo
- ☒ d. Servicio de prevención de riesgos laborales de su centro sanitario

Pregunta 26

Finalizado

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál es una de las funciones de la persona responsable de vacunas en un centro?


Seleccione una:

- ☒ a. Vigilar la caducidad de las vacunas existentes y retirar las caducadas.
- ☐ b. Asegurar que la enfermera elige la vacuna correcta.
- ☐ c. No tiene ninguna función específica.
- ☐ d. Registra la vacuna de cada persona vacunada en la historia.

Pregunta 27

Finalizado

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los hijos de madres HBsAg positivas deben recibir:


Seleccione una:

- ☐ a. La vacuna frente a la Hepatitis A y una dosis de inmunoglobulina específica.
- ☒ b. La vacuna frente a la Hepatitis B y una dosis de 0.5 ml de inmunoglobulina específica.
- ☐ c. Una dosis de vacuna en las primeras 12 horas de vida.
- ☐ d. Las vacunas según la pauta establecida en calendario vacunal

Pregunta 28

Finalizado

Puntúa 0,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Es obligatorio someterse a la vacunación en el ámbito laboral, en caso de:


Seleccione una:

- ☐ a. Una epidemia que suponga un riesgo para la salud pública de terceras personas
- ☐ b. El trabajador/a padezca una enfermedad inmunosupresora
- ☐ c. Requerimiento por parte de la jefatura del servicio de prevención
- ☒ d. Orden formulada por la Inspección de Trabajo

Pregunta 29

Finalizado

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Frente a qué tipo de enfermedades infecciosas protege la vacuna de la triple vírica?


Seleccione una:

- ☒ a. Sarampión, rubeola y parotiditis
- ☐ b. Sarampión, rubeola y meningitis
- ☐ c. Difteria, rubeola y meningitis
- ☐ d. Meningitis, hepatitis y rubeola

Pregunta 30

Finalizado

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En las recomendaciones del paciente con enfermedad cardíaca o respiratoria crónica y pacientes alcohólicos indique cuál es la respuesta cierta.


Seleccione una:

- ☐ a. Las vacunas se deben de administrar para prevenir este tipo de complicaciones y considerar en el manejo terapéutico de estos pacientes.
- ☐ b. La Vacuna frente Streptococcus pneumoniae está indicada.
- ☐ c. La Vacuna frente a la gripe está indicada
- ☒ d. Todas son ciertas.

Pregunta 31

Finalizado

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En los pacientes con procesos crónicos, las exacerbaciones son frecuentes y generan aumento en la demanda asistencial, aumento en el gasto sanitario y una importante morbilidad y mortalidad en grupos de riesgo. Indique la respuesta correcta.

Seleccione una:


- ☐ a. La vacunación cuenta en el momento con evidencia científica suficiente para justificar la vacunación en procesos crónicos como la EPOC.
- ☐ b. Para mejorar las coberturas de los pacientes con procesos crónicos, es necesario mejorar los conocimientos, actitud de los profesionales sanitarios, el papel de las enfermeras es clave, para sensibilizar a la en situación especial, fomentar la vacunación en los grupos de riesgo ya que se obtendrá un impacto significativo en disminución de morbilidad y mortalidad en los pacientes con patologías crónicas y de enfermedades prevenibles.
- ☐ c. Hay evidencia contundente que demuestra los beneficios de la inmunización como una de las intervenciones sanitarias más exitosas y rentables conocidas.

- ☒ d. Todas son correctas.

Pregunta 32

Finalizado

Puntúa 0,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De las siguientes respuestas indique cual es verdadera.


Seleccione una:

- ☐ a. Ante cualquier mujer en edad fértil que acuda para ser vacunada se debe preguntar sobre la posibilidad de embarazo a efectos de no administrar vacunas no recomendadas en el embarazo de manera inadvertida.
- ☐ b. A las mujeres que acuden a ser vacunadas en edad fértil, nunca se debe de preguntar sobre la posibilidad de embarazo.
- ☐ c. Existe evidencia de riesgo para el feto por la administración a la madre de vacunas de virus o bacterias inactivadas o toxoides.
- ☒ d. B y c son falsas.

Pregunta 33

Finalizado

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Si te has vacunado de una enfermedad:

Seleccione una:


- ☐ a. Estas protegido al 100% de esa enfermedad
- ☐ b. No necesitas tomar ninguna otra precaución para evitar la enfermedad
- ☒ c. Siempre existe riesgo de contraer la enfermedad contra la que te has vacunado

- ☐ d. Si se esta vacunado no hay que evitar los alimentos y el agua potencialmente contaminados

Pregunta 34

Finalizado

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Selecciona cual es una contraindicación permanente para administrar una vacuna:


Seleccione una:

- ☒ a. Reacción alérgica anafiláctica a una dosis previa
- ☐ b. Embarazo. De forma general, se contraindica la administración de vacunas vivas.
- ☐ c. Inmunodepresión. Contraindicadas también, en general, las vacunas atenuadas.
- ☐ d. Ninguna respuesta es correcta.

Pregunta 35

Finalizado

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El ofrecimiento de la vacuna al trabajador por parte del empresario, deberá efectuarse:


Seleccione una:

- ☐ a. A criterio siempre del empleador sanitario
- ☐ b. Bastará con el consentimiento explícito verbal del trabajador/a
- ☒ c. Deberá ofrecerse siempre por escrito
- ☐ d. Cuando la evaluación de riesgos laborales no refleje la existencia de un riesgo para la seguridad del profesional, frente al cual exista vacuna eficaz

Pregunta 36

Finalizado

Puntúa 0,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La vacunación frente a la meningitis tipo C, está especialmente indicada en:


Seleccione una:

- ☒ a. Trabajadores sanitarios de las unidades de cuidados intensivos
- ☐ b. Enfermeras de instituciones sociosanitarias
- ☐ c. Personal sanitario de las áreas de laboratorio
- ☐ d. Enfermeros/as del área de urgencias

Pregunta 37

Finalizado

Puntúa 0,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La diarrea del viajero:


Seleccione una:

- ☐ a. Afecta al 100% de los viajeros
- ☐ b. La mayoría de los casos son debidas a parásitos
- ☒ c. La mayoría de los casos son debidas a virus
- ☐ d. La mayoría de los casos son debidas a bacterias

Pregunta 38

Finalizado

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señala cual no es una actividad relacionada con el proceso de vacunación:


Seleccione una:

- ☐ a. Identificación de la persona que debe vacunarse
- ☐ b. Seleccionar las vacunas en la nevera teniendo en cuenta que ésta debe estar abierta solo el tiempo imprescindible
- ☐ c. Asegurar que se elige la vacuna correcta, comprobando el nombre comercial y su composición.
- ☒ d. Realizar la lectura de los monitores de temperatura de vacunas del interior de los contenedores cuando se recibe el pedido.

Pregunta 39

Finalizado

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué hay que tener en cuenta para colocar adecuadamente las vacunas en el frigorífico?


Seleccione una:

- ☐ a. Las indicaciones del fabricante.
- ☒ b. Fecha de caducidad, termoestabilidad y fotosensibilidad.
- ☐ c. La resistencia de la vacuna al calor
- ☐ d. Ninguna respuesta es correcta

Pregunta 40

Finalizado

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Para evitar la invaginación intestinal, actualmente se recomienda que la 1ª dosis se administre:


Seleccione una:

- ☐ a. Entre 6 y 12 años
- ☒ b. Entre las 6 y las 12 semanas de vida.
- ☐ c. A partir de los 12 meses
- ☐ d. A cualquier edad

Pregunta 41

Finalizado

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Una vacuna de microorganismos enteros es aquella que:


Seleccione una:

- ☐ a. No contiene ningún tipo de agente bacteriano
- ☒ b. Contienen el agente infeccioso completo
- ☐ c. Contiene una parte del agente infeccioso
- ☐ d. Contiene el agente vírico inactivado con bacterias

Pregunta 42

Finalizado

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Las personas de 13 años o más que nunca hayan tenido varicela o recibido la vacuna contra esta enfermedad, ¿Cuántas dosis deben recibir?


Seleccione una:

- ☐ a. No es necesario que reciban ninguna dosis.
- ☐ b. Una única dosis
- ☒ c. 2 dosis con un intervalo de al menos 28 días.
- ☐ d. Las dosis según la pauta de 0, 1 y 6 meses

Pregunta 43

Finalizado

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La hepatitis B:


Seleccione una:

- ☒ a. Es una enfermedad viral que puede cursar sin síntomas o presentar síntomas leves inapreciables, o de manera progresiva
- ☐ b. Se contagia por animales
- ☐ c. Los tatuajes y piercing no son un riesgo
- ☐ d. Aunque viajes a un país con alta endemicidad no se recomienda la vacuna

Pregunta 44

Finalizado

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuándo se deben administrar 2 dosis de la vacuna antigripal en niños?


Seleccione una:

- ☒ a. En los niños menores de 9 años que se vacunan por primera vez,
- ☐ b. En los niños que han tenido reacción independientemente de los años que lleven vacunarse.
- ☐ c. En todos los menores de 14 años.
- ☐ d. No es necesario utilizar 2 dosis en los niños.

Pregunta 45

Finalizado

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

A propósito de la normativa vigente, el Director Gerente de un hospital podría obligar a un profesional sanitario a vacunarse, siempre que:


Seleccione una:

- ☐ a. La no administración de la vacuna al profesional pueda poner en peligro la seguridad del paciente
- ☐ b. La no administración de la vacuna al profesional pueda poner en peligro la salud de terceras personas
- ☐ c. La vacuna esté indicada por el servicio de prevención
- ☒ d. Nunca podría obligar a vacunarse al trabajador en cuestión

Pregunta 46

Finalizado

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La vacuna hexavalente contiene:


Seleccione una:

- ☐ a. Difteria -dTpa-VPI - Tosferina acelular.
- ☐ b. Difteria-Tétanos-Tosferina acelular-Polio inactivado- Triple vírica.
- ☒ c. Difteria-Tétanos-Tosferina acelular-Polio inactivado-Haemophilus influenzae tipo b y Hepatitis B
- ☐ d. DTPa-VPI- SRP y hepatitis A

Pregunta 47

Finalizado

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál de las siguientes respuestas es cierta sobre las vacunas y la prevención de las enfermedades.


Seleccione una:

- ☒ a. Las vacunas representan un hito fundamental en la prevención de las enfermedades infectocontagiosas, con repercusión excepcional en la salud mundial.
- ☐ b. Las vacunas no representan un hito en la prevención de las enfermedades infectocontagiosas.
- ☐ c. Ninguna es cierta.
- ☐ d. a y b son ciertas.

Pregunta 48

Finalizado

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La fiebre amarilla:

Seleccione una:

- ☐ a. Las aves son el principal reservorio de la infección
- ☐ b. La vacuna no es obligatoria para los viajeros en ningún país
- ☐ c. Hay que vacunarse al menos 30 días antes del viaje
- ☒ d. La fiebre amarilla es una enfermedad vírica infecciosa aguda de gravedad variable

Final del formulario