

Comenzado el	viernes, 26 de junio de 2020, 17:52
Estado	Finalizado
Finalizado en	viernes, 26 de junio de 2020, 18:25
Tiempo empleado	32 minutos 55 segundos
Puntos	15,00/20,00
Calificación	7,50 de 10,00 (75%)

Pregunta **1**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Se puede saber con certeza el momento exacto de la infección inicial por VPH oral?

Seleccione una:

- a. Sí, unos diez años antes del desarrollo del cáncer de orofaringe causado por el VPH
- b. En algunos casos sí, en otros no
- c. No
- d. Sí, unos dos años antes del desarrollo del cáncer de orofaringe causado por el VPH

Respuesta correcta

Pregunta **2**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

En un paciente con un cáncer de orofaringe asociado al VPH localmente avanzado T3N2M0, se preferirá un tratamiento con:

Seleccione una:

- a. Radioterapia y quimioterapia con cisplatino 100 mg/m²/3 semanas
- b. Radioterapia y cetuximab
- c. Radioterapia y pembrolizumab
- d. Radioterapia y quimioterapia con cisplatino 40 mg/m²/semana

Respuesta correcta

Pregunta **3**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

En un carcinoma escamoso de cavidad oral, determine la respuesta correcta:

Seleccione una:

- a. Debemos determinar siempre la presencia del VPH.
- b. No se recomienda la determinación del estado de VPH fuera de la orofaringe, pero en el caso de querer determinar la asociación al VPH, la técnica de elección es la determinación de p16 por inmunohistoquímica.
- c. No se recomienda la determinación del estado de VPH fuera de la orofaringe, pero en el caso de querer determinar la asociación al VPH deberemos usar un biomarcador directo del virus.
- d. Ninguna opción es correcta

Respuesta correcta

Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Si soy hombre o mujer que no se vacunó contra el VPH a la edad de vacunación sistemática, ¿me puedo vacunar?

Seleccione una:

- a. No, la vacuna sólo está indicada en niñas de 11 a 14 años
- b. Sí, la vacuna está indicada tanto en hombres como mujeres
- c. Las mujeres sí pero los hombres no
- d. Las mujeres no pero los hombres sí

Respuesta correcta

Pregunta **5**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La determinación inmunohistoquímica de p16:

Seleccione una:

- a. Es un marcador directo de causalidad de asociación del cáncer de orofaringe al VPH.
- b. La sobre-expresión de p16 se produce por la acción de la oncoproteína E6.
- c. La sobre-expresión de p16 se produce para intentar inhibir la degradación de pRB y por tanto la activación del ciclo celular.
- d. Debe realizarse de rutina en todos los cánceres de orofaringe.

Respuesta correcta

Pregunta **6**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Hay un porcentaje de pacientes de cánceres de orofaringe asociados al VPH que tienen mal pronóstico

Seleccione una:

- a. Falso, todos tienen buen pronóstico
- b. Verdadero, alrededor de un 20% y aún no están bien caracterizados
- c. Verdadero, alrededor de un 20% y están muy bien caracterizados
- d. Verdadero, alrededor de un 40% y aún no están bien caracterizados

Respuesta incorrecta.

Pregunta 7

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

En el caso anterior, según la octava clasificación de TNM, ¿cuál es el estadio clínico del paciente?

Seleccione una:

- a. III
- b. IV
- c. I
- d. II

Respuesta incorrecta.

Pregunta 8

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

En la octava edición, las principales diferencias entre la clasificación TNM de los carcinomas escamosos de orofaringe asociados al VPH y la de los no asociados son las siguientes excepto una. Señale cuál:

Seleccione una:

- a. En la clasificación clínica de N de los tumores asociados al VPH un parámetro con peso pronóstico es el número de ganglios afectados.
- b. Los pacientes con M1 a distancia se clasifican como estadio IV si tienen un tumor asociado al VPH, y como estadio IVC si tienen un tumor no asociado al VPH.
- c. La subcategoría Tis no se incluye en la categoría T de los tumores asociados al VPH.
- d. En ambas clasificaciones los tumores T1 son ≤ 2 cm y los T2 > 2 cm pero ≤ 4 cm

Respuesta incorrecta.

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

El informe de anatomía patológica de un paciente intervenido de un tumor de orofaringe nos da la siguiente conclusión: carcinoma escamoso, pT1pN1, p16 positivo.

¿Cuál de las siguientes definiciones se corresponde con este pTNM, según la octava edición?

Seleccione una:

- a. Tumor de 1,5 cm de diámetro mayor, 4 ganglios metastásicos bilaterales, el mayor de 6 cm.
- b. Tumor primario de 3cm de diámetro mayor, 3 ganglios metastásicos ipsilaterales, el mayor de 5 cm.
- c. Tumor de 1,5 cm de diámetro mayor, 5 ganglios metastásicos ipsilaterales, el mayor de 6 cm.
- d. Tumor de 3 cm de diámetro mayor, 4 ganglios metastásicos ipsilaterales, el mayor de 2 cm.

Respuesta correcta

Pregunta **10**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

En un paciente con un cáncer de orofaringe no asociado al VPH estadio IVb, con una gran adenopatía de 8 cm que genera muchos síntomas al paciente, se preferirá:

Seleccione una:

- a. Iniciar tratamiento con quimioterapia de inducción
- b. Realizar cirugía seguido de radioterapia
- c. Realizar radioterapia y pembrolizumab
- d. Iniciar tratamiento con radioterapia y cetuximab

Respuesta correcta

Pregunta **11**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Respecto a las diferentes técnicas de detección del VPH en el carcinoma escamoso de orofaringe:

Seleccione una:

- a. La detección del ARNm de E6/E7 del VPH es la técnica considerada "gold standard"
- b. La detección del ARNm de E6/E7 del VPH es una técnica fácil de implementar en el entorno clínico.
- c. La detección del ADN del VPH por PCR presenta una alta especificidad.
- d. Todas las respuestas son verdaderas.

Respuesta incorrecta.

Pregunta **12**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuántos casos nuevos de cáncer de cabeza y cuello asociados al VPH se estima que cada año se producen en el mundo?

Seleccione una:

- a. Cerca de 20000
- b. Cerca de 50000
- c. Cerca de 4000
- d. Cerca de 400000

Respuesta correcta

Pregunta **13**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Los cánceres de orofaringe asociados al VPH o aquellos producidos por factores clásicos como el tabaco y el alcohol...

Seleccione una:

- a. Son tumores que se comportan de manera equivalente
- b. Representan tumores distintos a nivel epidemiológico
- c. Representan tumores distintos a nivel clínico y molecular
- d. Las respuestas B y C son correctas

Respuesta correcta

Pregunta **14**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cómo se puede contagiar una persona con un VPH a nivel de la cavidad oral?

Seleccione una:

- a. Practicando sexo oral
- b. Besando en la mejilla o compartiendo bebidas con una persona infectada
- c. Practicando sexo oral y también es posible que el virus pueda llegar a la boca por otras vías como un beso profundo
- d. Las respuestas B y C son correctas

Respuesta correcta

Pregunta **15**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Ante el diagnóstico de un cáncer de orofaringe cT1N2c, debemos:

Seleccione una:

- a. Determinar la causa etiológica y descartar que se trate de un tumor asociado al VPH.
- b. La determinación del VPH se debe hacer mediante un marcador específico del VPH: la determinación de p16 por inmunohistoquímica.
- c. Debido a que se trata de un tumor localmente avanzado, la determinación del VPH no es necesaria.
- d. Todas las respuestas anteriores son correctas.

Respuesta correcta

Pregunta **16**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Los cánceres de orofaringe asociados al VPH...

Seleccione una:

- a. Se mantienen estables
- b. Están en aumento en todo el mundo
- c. Están en aumento en algunos países del mundo
- d. Están en descenso

Respuesta correcta

Pregunta **17**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

En un paciente, sin comorbilidades y buen estado general, con una recidiva irreseccable de crecimiento rápido de un carcinoma de orofaringe asociado al VPH a los 10 meses de una cirugía seguido de radioterapia. La mejor opción es:

Seleccione una:

- a. Iniciaremos quimioterapia con una combinación de platino
- b. Iniciaremos quimioterapia con una combinación de platino y pembrolizumab si el estudio histológico presenta un PDL1 por CPS>1
- c. Iniciaremos tratamiento con nivolumab
- d. Iniciaremos una monoterapia con cisplatino

Respuesta correcta

Pregunta **18**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Los cánceres de orofaringe asociados al VPH son más frecuentes en países...

Seleccione una:

- a. Del Sur de Europa como España.
- b. Del Norte de Europa y Estados Unidos.
- c. Las respuestas A y B son correctas.
- d. De renta baja.

Respuesta correcta

Pregunta **19**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Llega a nuestra consulta un paciente de 45 años, nunca fumador, sin otros antecedentes de interés, derivado para estudio de un probable tumor de orofaringe. Aporta un TC en el que se observa una lesión de 1,5cm en la amígdala izquierda, 2 adenopatías en nivel II izquierdo de 3 y 4 cm respectivamente y una adenopatía en nivel III derecho de 2cm. La biopsia es positiva para carcinoma escamoso con tinción inmunohistoquímica para p16 positiva. No hay enfermedad a distancia.

¿Qué clasificación TNM tiene el paciente según la octava edición?

Seleccione una:

- a. T1N2M0
- b. T2N1M0
- c. T4bN2cM0
- d. T2N2M0

Respuesta correcta

Pregunta **20**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Dentro de los cánceres de cabeza y cuello, los que están más fuertemente asociados al VPH son los de:

Seleccione una:

- a. Orofaringe, con fracciones atribuibles estimadas a nivel global alrededor del 30%.
- b. Cavidad oral.
- c. Orofaringe, con fracciones atribuibles estimadas a nivel global alrededor del 80%.
- d. Las respuestas A y B son correctas.

Respuesta incorrecta.