

# INTERVENCIONES ENFERMERAS ANTE URGENCIAS EN S...

[Página Principal](#) / [AV.M021\\_1](#) / Evaluación Febrero / [Curso: Intervencion...](#)

Comenzado el	lunes, 28 de febrero de 2022, 21:08
Estado	Finalizado
Finalizado en	lunes, 28 de febrero de 2022, 21:43
Tiempo empleado	35 minutos 10 segundos
Puntos	25,00/30,00
Calificación	8,33 de 10,00 (83%)
Comentario -	Apto

**PREGUNTA 1**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La enfermera, en el momento de hacer la valoración de enfermería a una persona, debe tener en cuenta que los síntomas negativos de la esquizofrenia son:

Seleccione una:

- ☐ a. Lenguaje y pensamiento desorganizado, alucinaciones y comportamiento desorganizado.
- ☐ b. Retraimiento social, ideas delirantes, alucinaciones, falta de energía y motivación.
- ☒ c. Trastornos emocionales, alogia, falta de energía y motivación, abulia y retraimiento social. ✓
- ☐ d. Abulia, alogia, ideas delirantes, lenguaje y pensamiento desorganizado.



**PREGUNTA 2**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los síntomas positivos de la esquizofrenia:

Seleccione una:

- ☐ a. Son productivos.
- ☐ b. Uno de ellos puede ser lenguaje desorganizado.
- ☐ c. Incluyen los delirios.
- ☒ d. Todas son correctas. ✓

**PREGUNTA 3**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Dentro de los trastornos psicóticos se encuentra (señale la INCORRECTA):

Seleccione una:

- ☒ a. La neurosis obsesiva. ✓
- ☐ b. El trastorno esquizofreniforme.
- ☐ c. El trastorno delirante.
- ☐ d. El trastorno esquizoafectivo.

**PREGUNTA 4**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los síntomas negativos de la esquizofrenia:

Seleccione una:

- ☐ a. Es poco frecuente el aplanamiento afectivo.
- ☒ b. Tienen que ver con la disminución o pérdida de funciones normales. ✓
- ☐ c. Afectan a la capacidad intelectual de la persona.
- ☐ d. Aumentan el nivel de energía.



**PREGUNTA 5**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En cuanto a los trastornos del estado de ánimo señale la INCORRECTA:

Seleccione una:

- ☐ a. Presentan síntomas físicos.
- ☐ b. Presentan síntomas interpersonales.
- ☐ c. Presentan síntomas conductuales.
- ☒ d. Presentan síntomas neurológicos. ✓

**PREGUNTA 6**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El factor determinante del fenómeno depresivo es:

Seleccione una:

- ☐ a. La biología.
- ☐ b. Factores personales.
- ☐ c. Factores ambientales.
- ☒ d. La interacción de varios factores entre los que se encuentran los anteriores. ✓

**PREGUNTA 7**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En cuanto a la ansiedad:

Seleccione una:

- ☐ a. No es un motivo frecuente de consulta.
- ☒ b. Se convierte en patológica cuando supera la capacidad de adaptación de la persona. ✓
- ☐ c. Ante una crisis de ansiedad no es necesario descartar patología somática.
- ☐ d. Todas son incorrectas.



**PREGUNTA 8**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Según las fases de la entrevista semiestructurada de la GPC para el manejo de pacientes con Trastorno de Ansiedad en Atención Primaria, uno de los objetivos de la fase exploratoria es:

Seleccione una:

- ☐ a. Recepción empática. Conocer el motivo de consulta.
- ☒ b. Obtener información específica básica. ✓
- ☐ c. Síntesis y enumeración de los problemas.
- ☐ d. Toma de precauciones.

**PREGUNTA 9**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En la crisis de angustia:

Seleccione una:

- ☒ a. La aparición de los síntomas es súbita. ✓
- ☐ b. Si aparecen palpitaciones u opresión torácica se trata de otro cuadro.
- ☐ c. No aparecen pensamientos de muerte inminente.
- ☐ d. No es común la sensación de atragantamiento.

**PREGUNTA 10**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

En los trastornos de ansiedad podremos observar siguientes síntomas (señale la INCORRECTA):

Seleccione una:

- ☐ a. Palpitaciones y taquicardia.
- ☒ b. Parestesias producidas por la alcalosis respiratoria. ✗
- ☐ c. Náuseas y malestar abdominal.
- ☐ d. Taquipnea e hipoventilación.



**PREGUNTA 11**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los actos suicidas y parasuicidas o ideación suicida:

Seleccione una:

- ☐ a. No suponen un problema de salud pública.
- ☐ b. No suelen asociarse a consumo de alcohol.
- ☒ c. Debe ser considerado siempre como una emergencia psiquiátrica. ✓
- ☐ d. Son poco frecuentes en los trastornos de personalidad.

**PREGUNTA 12**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Sobre los factores determinantes del fenómeno depresivo, una enfermera debe saber que:

Seleccione una:

- ☐ a. La depresión mayor siempre se produce tras una fase maníaca.
- ☒ b. La depresión es el resultado de un diálogo altamente interactivo entre la biología, los factores personales y psicológicos y el medio ambiente. ✓
- ☐ c. La depresión delirante siempre ocurre como respuesta a una situación estresante.
- ☐ d. La depresión nunca se relaciona con enfermedades médicas o con el consumo de sustancias.

**PREGUNTA 13**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Señala cual de las siguientes actividades no es una de las que se ponen en práctica según NIC 5270 sobre el apoyo emocional:

Seleccione una:

- ☐ a. Escuchas las expresiones de sentimientos y creencias.
- ☐ b. Determinar la capacidad mental y cognitiva.
- ☐ c. Animar a que exprese sentimientos como la ansiedad.
- ☒ d. Proporcionar sentimiento de seguridad. ✗



**PREGUNTA 14**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Señala cual de las siguientes actividades no es una de las que se ponen en práctica en NIC 6450 para el manejo de las ideas delirantes:

Seleccione una:

- ☐ a. Administrar antipsicóticos si es necesario.
- ☒ b. Hacer ver al paciente que lo que dice no es real. ✓
- ☐ c. Dar la oportunidad al paciente de que comente los delirios con sus cuidadores.
- ☐ d. Vigilar el estado psíquico del paciente.

**PREGUNTA 15**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En cuanto a la agitación psicomotriz:

Seleccione una:

- ☒ a. Puede variar desde una mínima a una máxima agitación. ✓
- ☐ b. No se debe a causas orgánicas si no psicológicas.
- ☐ c. Los trastornos metabólicos no se incluyen entre sus causas.
- ☐ d. Es un estado de hiperactividad con intencionalidad y excitación mental.

**PREGUNTA 16**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El objetivo de la fase preliminar de la entrevista semiestructurada de la GPC para el manejo de pacientes con Trastorno de Ansiedad en Atención Primaria:

Seleccione una:

- ☒ a. Recepción empática. Conocer el motivo de consulta. ✓
- ☐ b. Recoger información sobre la presencia de patología orgánica.
- ☐ c. Explorar la esfera psicosocial.
- ☐ d. Enumeración de las problemáticas.



**PREGUNTA 17**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En cuanto a las causas que pueden producir un ataque de pánico, señale la INCORRECTA:

Seleccione una:

- ☐ a. Infarto agudo de miocardio.
- ☐ b. EPOC.
- ☒ c. Consumo de sustancias depresoras del SNC. ✓
- ☐ d. Situaciones ambientales de estrés.

**PREGUNTA 18**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En el tratamiento de la ansiedad:

Seleccione una:

- ☐ a. No es necesario valorar la tensión arterial.
- ☒ b. Hay que descartar origen orgánico. ✓
- ☐ c. No es necesario descartar la hipoglucemia.
- ☐ d. No es necesario valorar la frecuencia respiratoria.

**PREGUNTA 19**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cual de los siguientes factores no es uno de los que se encuentran entre los factores de riesgo para el suicidio:

Seleccione una:

- ☐ a. Historia previa de intentos autolíticos.
- ☒ b. Fluidez cognitiva. ✓
- ☐ c. Desesperanza.
- ☐ d. Factores sociales.



**PREGUNTA 20**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Ante un intento de suicidio:

Seleccione una:

- ☐ a. Hay que administrar ansiolíticos.
- ☐ b. Hay que cuestionar la intencionalidad.
- ☒ c. Se hará la valoración en presencia de un familiar cercano para facilitarla. ✖
- ☐ d. Si la amenaza parece una "llamada de atención" no se tomará en serio para no reforzar la conducta.

**PREGUNTA 21**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La escala de Intencionalidad Suicida de Beck:

Seleccione una:

- ☐ a. Valora la presencia o ausencia de factores de riesgo.
- ☐ b. No hace referencia a causas objetivas sobre el intento autolítico.
- ☒ c. Cuantifica la gravedad de la conducta suicida reciente. ✔
- ☐ d. Consta de 7 items.

**PREGUNTA 22**

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Para el manejo de la conducta autolítica en urgencias (señale la INCORRECTA):

Seleccione una:

- ☒ a. Se debe explorar la presencia o descompensación de un posible trastorno mental. ✖
- ☐ b. Se dejará la valoración física completa para más tarde, cuando todo esté calmado.
- ☐ c. Se realizará valoración de riesgo suicida.
- ☐ d. Se valorará la necesidad de tratamiento farmacológico posterior.



**PREGUNTA 23**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Es falso en relación al paciente con ideas suicidas:

Seleccione una:

- ☐ a. Piensa a menudo en el suicidio.
- ☒ b. Todo intento de suicidio, no precisa ser valorado de manera urgente por el psiquiatra. ✓
- ☐ c. Reconoce sentirse solo, aislado y se ve incapaz de aguantarlo o solucionarlo.
- ☐ d. Son factores de riesgo la depresión el alcoholismo y la adicción a sustancias.

**PREGUNTA 24**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marca cuáles de estos síntomas NO son de los llamados negativos de la esquizofrenia:

Seleccione una:

- ☐ a. Abulia.
- ☒ b. Catatonia. ✓
- ☐ c. Apatía.
- ☐ d. Anergia.

**PREGUNTA 25**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La esquizofrenia, presente en el 1% de la población, no se caracteriza por:

Seleccione una:

- ☐ a. Deformación de la personalidad.
- ☐ b. Distorsión del pensamiento.
- ☐ c. Alucinaciones.
- ☒ d. Deterioro de la capacidad intelectual. ✓



**PREGUNTA 26**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La atención correcta durante una crisis de ansiedad, será:

Seleccione una:

- ☐ a. Informar al paciente de que si no se calma su problema puede entrañar un riesgo vital.
- ☐ b. Si tiene una pulsioximetría menor o igual al 95%, se administrará O2 al 50%.
- ☒ c. Si persiste hiperventilación tras intentar calmar al paciente, intentar que respire (no más de 10 minutos) en un circuito cerrado. ✓
- ☐ d. Si persiste hiperventilación, indicar que respire en una bolsa durante, al menos, 15 minutos y administrar rápidamente ansiolíticos intramusculares.

**PREGUNTA 27**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es la patología psiquiátrica que se relaciona de forma más frecuente con los suicidios cometidos?

Seleccione una:

- ☐ a. Trastornos derivados del abuso de alcohol.
- ☐ b. Trastornos neuróticos.
- ☒ c. Trastornos depresivos. ✓
- ☐ d. Esquizofrenia.

**PREGUNTA 28**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En la valoración de enfermería, al paciente con alteraciones psíquicas, la disforia persistente es característica de (señale la opción correcta):

Seleccione una:

- ☒ a. La Depresión Mayor. ✓
- ☐ b. El Trastorno Bipolar.
- ☐ c. La Esquizofrenia.
- ☐ d. El trastorno de ansiedad.



PREGUNTA 29

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Respecto a la graduación del suicidio, ¿cómo se denomina el riesgo máximo?

Seleccione una:

- ☐ a. Amenaza suicida.
- ☐ b. Tentativa suicida.
- ☐ c. Ideación suicida.
- ☒ d. No existe ningún término para denominar el riesgo máximo. ❌

PREGUNTA 30

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Es un indicador de trastorno mental de origen orgánico:

Seleccione una:

- ☐ a. Comienzo reciente o brusco.
- ☐ b. Sintomatología psiquiátrica atípica (desorientación, fluctuación del nivel de conciencia, disartria).
- ☐ c. Sintomatología psicótica en mayores de 40 años, sin antecedentes de episodios anteriores.
- ☒ d. Todas son correctas. ✔️

◀ Documento de estudio genérico

Ir a...

Encuesta de satisfacción del  
alumnado ▶

MENÚ PRINCIPAL

- FUDEN
- Campus Virtual
- Campus Postgrados
- Fuden inclusiva
- Tienda

ACTIVIDADES SATSE

- Aula Virtual
- Evaluación de las Competencias
- Oposiciones

ÁREA PERSONAL

- Mi cuenta
- Preferencias
- Subir documentación
- Mis diplomas



