

<b>Comenzado el Estado Finalizado en Tiempo empleado</b>	miércoles, 19 de septiembre de 2018, 22:00 Finalizado miércoles, 19 de septiembre de 2018, 22:20 20 minutos 49 segundos
<b>Puntos</b>	19,00/20,00
<b>Calificación</b>	<b>9,50</b> de un máximo de 10,00 ( <b>95%</b> )
<b>Comentario -</b>	Apto

### Pregunta 1

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En un paciente afectado de la onda expansiva de una explosión bajo el agua, ¿qué aparato es el más comúnmente afectado?:

Seleccione una:

- a. El aparato digestivo. ✓
- b. Aparato circulatorio.
- c. Aparato reproductor.
- d. Ninguno de los anteriores.

### Pregunta 2

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Cuál de estos dispositivos no están diseñados para el traslado de un paciente politraumatizado hasta un centro hospitalario?

Seleccione una:

- a. Un inmovilizador espinal
- b. Un colchón de vacío
- c. Una camilla de cuchara
- d. A y c no están diseñados para traslados largos ✓

### Pregunta 3

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Qué conducta adopta si al colocar el collarín cervical aparece dolor durante la alineación?

Seleccione una:

- a. Realizo tracción del cuello hasta la posición neutra aunque haya dolor.
- b. Retiro el collarín.
- c. Se inmoviliza en posición no neutra, sin dolor, tal y como estaba ✓
- d. Utilizo un colchón de vacío.

**Pregunta 4**

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Qué dispositivos complementan la inmovilización cervical?

Seleccione una:

- a. La colocación de un colchón de vacío y un collarín cervical
- b. La colocación de un inmovilizador espinal y un collarín cervical
- c. Un collarín cervical y una férula tetracameral situada sobre un tablero espinal largo
- d. Las tres opciones complementan una inmovilización cervical correcta ✓

**Pregunta 5**

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Respecto a las recomendaciones a la extracción en un accidente de tráfico, señale la incorrecta

Seleccione una:

- a. La rotación permitida para la extracción no debe superar los 90° para giros laterales
- b. Mientras sea posible todos los pacientes serán extraídos con movilizaciones lineas a través del maletero



c. Tras la movilización es urgente la analgesia de la víctima extraída ✓



d. Las movilizaciones laterales en paciente sentado deben realizarse siempre con un inmovilizador espinal

### Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Peso: 18Kg, tensión arterial 70/50, Glasgow 8, bradipnea, respiración irregular, fractura abierta de cúbito/radio y quemadura eléctrica en la espalda. En este paciente pediátrico ¿Cuál sería el Índice de Trauma Pediátrico?

Seleccione una:



a. -4



b. -6



c. -2 ✓



d. 0

### Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Respecto al Soporte Vital al Atrapado, indique la respuesta correcta:

Seleccione una:



a. No atenderemos al paciente, hasta que lo saquen los equipos de rescate, bajo ningún concepto.



b. Realizaremos intubación orotraqueal a todo paciente que se encuentre atrapado.



c. Respecto a la extracción, debemos inmovilizarlo correctamente antes de movilizarlo. ✓



d. Respecto a la extracción, debemos movilizarlo correctamente antes de inmovilizarlo.

### Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Respecto al colchón de vacío, indica la respuesta incorrecta:

Seleccione una:

- a. Para que realice perfectamente su función debe cubrir 2/3 de la superficie corporal del paciente.
- b. Para que realice perfectamente su función debe cubrir 1/3 de la superficie corporal del paciente. ✓
- c. Por las características del material con el que está confeccionado, es ideal para evitar la hipotermia
- d. Ninguna de las anteriores

**Pregunta 9**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Respecto a la los puntos clave de la movilización de víctimas

Seleccione una:

- a. Son necesarios para el reparto de cargas entre los reanimadores y para el entendimiento entre ellos
- b. Son cinco puntos: cabeza cuello, cintura escapular, cintura pélvica, rodillas y tobillos
- c. Cuanto mayor sea el número de reanimadores que asuman puntos clave para la movilización mejor, pero pueden ser menos
- d. Todas son correctas ✓

**Pregunta 10**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Respecto a la oxigenoterapia en pacientes pediátricos politraumatizados, señale la correcta:

Seleccione una:

- a. Es suficiente administrar oxígeno al 50% de FiO<sub>2</sub> para no causar retinopatías
- b. Es necesario oxígeno al 100% con mascarilla reservorio a 15 l/min ✓
- c. Es necesario oxígeno al 85% con mascarilla reservorio a 10l/min
- d. Ninguna es correcta

### Pregunta 11

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Tras un accidente con explosión. ¿Qué lesiones puede hallar en las víctimas?

Seleccione una:

- a. Quemadura de vías aéreas.
- b. Lesiones por onda expansiva.
- c. Lesiones por segunda colisión.
- d. Todas son correctas. ✓

### Pregunta 12

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En un paciente atrapado, al cual solo podemos acceder por un espacio alejado y de unos 5 cm<sup>2</sup>, ¿cuál sería el fármaco de elección para su sedoanalgesia, mientras los equipos de rescate abren un acceso hasta él?:

Seleccione una:

- a. Fentanilo IV
- b. Midazolam IV
- c. Ketamina IV
- d. Ketamina IM ✓

### Pregunta 13

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Que diferencia hay entre extracción y excarcelación?

Seleccione una:

- a. Ambos son distintos nombres de llamar a lo mismo, sacar a un accidentado del vehículo
- b. Extracción es una acción sanitaria y excarcelación el rescate con herramientas de corte
- c. La excarcelación siempre precede a la extracción, si es necesaria
- d. B y c son correctas ✓

**Pregunta 14**

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Con respecto al paciente politraumatizado pediátrico señale la respuesta incorrecta:

Seleccione una:

- a. Para la reposición de volumen es de elección la vía periférica y si esta no es posible se puede utilizar una vía intraósea
- b. La hipotermia no es un factor esencial en la inestabilidad hemodinámica aunque si la hipoxia y la hipovolemia ✓
- c. Las fracturas costales de la 5ª a la 8ª costilla hacen sospechar lesiones abdominales altas (hígado y bazo)
- d. La diuresis normal del lactante es de 2ml/Kg/h

**Pregunta 15**

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Las muertes evitables en el paciente pediátrico son:

Seleccione una:

- a. Hipoxia, hipovolemia e hipotermia
- b. Asfixia, hipovolemia y lesiones secundarias a un TCE
- c. Asfixia, hipoxia, hipovolemia y lesiones secundarias a un TCE
- d. Asfixia, hipoxia, hipovolemia, lesiones secundarias a un TCE e hipotermia ✓

**Pregunta 16**

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿A partir de cuánto tiempo de compresión, se estima que existe un elevado riesgo de sufrir el síndrome de aplastamiento?

Seleccione una:

- a. 1 hora.
- b. 12 horas.
- c. 8 horas.
- d. 4 horas. ✓

**Pregunta 17**

Incorrecta  
Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Tras un accidente con explosión. ¿Cuál de las víctimas es más grave?

Seleccione una:

- a. Paciente con taquipnea, que dice «- Me duele el tórax».
- b. Paciente con fractura de miembro superior derecho.
- c. Paciente disfónico, que camina y no se queja de dolor. ✗
- d. Paciente con quemaduras en las piernas.

**Pregunta 18**

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Cuál de estos dispositivos es de inmovilización integral?

Seleccione una:

- a. Una férula de vacío de miembro inferior
- b. Una tabla espinal larga ✓



c. Una camilla de cuchara



d. Unas correas de inmovilización

### Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Tras la liberación de los miembros inferiores atrapados de un paciente traumático, indique la respuesta correcta:

Seleccione una:



a. Le aplicaremos de manera rápida un torniquete en los miembros afectados.



b. Estaremos preparados, pues es posible la presencia de arritmias en éstos pacientes tras su liberación. ✓



c. Estos pacientes una vez liberados, no presentan mayores problemas.



d. Ninguna es correcta.

### Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Respecto a la aproximación a un accidente de tráfico, señale la incorrecta:

Seleccione una:



a. Debe realizarse con precaución dando una vuelta al coche accidentado en busca de riesgos de incendios o orografía. ✓



b. Se deben tomar precauciones de seguridad individual (equipos de protección individual EPIs), doble guante, casco, ropa reflectantes y botas de protección



c. Se deben tomar medidas de seguridad global del escenario, siendo primordial la colocación adecuada del vehículo asistencial como señalización, protección ante accidentes, iluminación y material logístico sanitario



d. Debe ser la más segura, rápida y corta posible