

[Saltar a contenido principal](#)



[Postgrados
Universitarios](#)

[Formación
acreditada](#)

[Evaluación de las
Competencias](#)

[Oposiciones](#)

[Formación EIR](#)

[Proyectos 2018](#)

[Aula Virtual](#)

[CISCEM](#)



Maria Gomez Ponce | [Perfil](#) | [Salir](#)

Navegación por el cuestionario

[Pregunta 1 Esta página](#) [Pregunta 2 Esta página](#) [Pregunta 3 Esta página](#) [Pregunta 4 Esta página](#) [Pregunta 5 Esta página](#) [Pregunta 6 Esta página](#) [Pregunta 7 Esta página](#) [Pregunta 8 Esta página](#) [Pregunta 9 Esta página](#) [Pregunta 10 Esta página](#) [Pregunta 11 Esta página](#) [Pregunta 12 Esta página](#) [Pregunta 13 Esta página](#) [Pregunta 14 Esta página](#) [Pregunta 15 Esta página](#) [Pregunta 16 Esta página](#) [Pregunta 17 Esta página](#) [Pregunta 18 Esta página](#) [Pregunta 19 Esta página](#) [Pregunta 20 Esta página](#)

[Finalizar revisión](#)

Comenzado el	miércoles, 4 de julio de 2018, 08:47
Estado	Finalizado
Finalizado en	miércoles, 4 de julio de 2018, 08:56
Tiempo empleado	8 minutos 18 segundos


Puntos	15,00/20,00
Calificación	7,50 de un máximo de 10,00 (75%)
Comentario -	Apto

Principio del formulario

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Sobre el tubo esofago-traqueal, señale la falsa:


Seleccione una:

- a. La elección del tamaño adecuado se relaciona con el peso del paciente. ✓
- b. Dispone de dos balones de neumotaponamiento.
- c. Permite el establecimiento de una vía aérea segura y efectiva.
- d. Está provisto de dos luces unidas en su extremo distal.

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

El punto de punción indicado para la canalización de una vía intraósea en niños menores de 8 años se encuentra en:


Seleccione una:

- a. Tibia proximal. ✓
- b. Tibia distal.
- c. Fémur distal.
- d. Región media esternal.

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Dentro de las indicaciones de la intubación orotraqueal, encontramos:


Seleccione una:

- a. Saturación de oxígeno mayor de 90%.
- b. Glasgow mayor o igual a 8 puntos.
- c. Paciente incapaz de proteger la vía aérea por si mismo. ✓
- d. Paciente con obstrucción de la vía aérea.

Pregunta 4

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En cuanto a la ventilación con resucitador manual:


Seleccione una:

- a. Es un buen método de aislamiento de la vía aérea. ✘
- b. Permite retirar la cánula de Guedel.
- c. Es el sistema preferido de ventilación cuando no es posible el aislamiento de la vía aérea mediante otros sistemas.
- d. Es preferible a la intubación orotraqueal como sistema de ventilación por ser menos traumática.

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

A la hora de canalizar una vía umbilical es importante que tengamos en cuenta que:

Seleccione una:


- a. La vena umbilical se encuentra situada de forma tangencial a la arteria umbilical y es de menor calibre.
- b. La vena umbilical se encuentra situada en el centro del cordón umbilical y es de mayor calibre que las arterias. ✔
- c. Las venas umbilicales tienen las paredes más gruesas que las arterias.

- d. Las venas umbilicales se localizan alrededor de la arteria umbilical, que se encuentra a su vez en el centro del cordón.

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Cuándo debe realizarse una cricotiroidotomía de emergencia?


Seleccione una:

- a. En ahogamientos en agua salada.
- b. Siempre que no se tenga experiencia en la intubación orotraqueal.
- c. Para poder retirar la mascarilla laríngea.
- d. Ante una obstrucción insalvable de la vía aérea. ✓

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Con respecto a la mascarilla laríngea, es falso que:

Seleccione una:


- a. Permite una ventilación adecuada en condiciones de parada cardiorrespiratoria.
- b. Es el mejor método de aislamiento definitivo de la vía aérea. ✓

- c. La punta de la mascarilla queda alojada en el esfínter esofágico superior.
- d. El aprendizaje para su colocación es más simple que para la intubación oro-traqueal.

Pregunta 8

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Dentro de los condicionantes que pueden interferir en los resultados de una glucemia, no se encuentra:


Seleccione una:

- a. Muestra de sangre insuficiente. **X**
- b. Acceso venoso con fluidoterapia en el mismo miembro.
- c. Esmalte de uñas.
- d. Falta e higiene de la piel.

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a las complicaciones de las cánulas orofaríngeas?


Seleccione una:

- a. Un tamaño inadecuado puede producir obstrucción de la vía aérea.
- b. La lengua puede desplazarse hacia atrás a colocar una cánula de tamaño mayor y colapsar las vías aéreas.
- c. Si el paciente no está inconsciente puede provocar el vómito.
- d. Todas las respuestas anteriores son correctas. ✓

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Entre las complicaciones más frecuentes en la canalización de una vía central, no se encuentra:


Seleccione una:

- a. Embolia gaseosa.
- b. Neumotórax.
- c. Arritmias cardíacas.
- d. Todas son posibles. ✓

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Cuál de los siguientes no es un factor que modifica la toma de tensión arterial?


Seleccione una:

- a. Uso de un manguito más estrecho.
- b. Uso de un manguito más ancho.
- c. Ropa holgada por encima del lugar de colocación del manguito. ✓
- d. Todas modifican los valores.

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

La colocación de una cánula orofaríngea, exige que:


Seleccione una:

- a. Que el paciente colabore.
- b. Que el enfermo esté intubado previamente.
- c. Que el enfermo esté inconsciente. ✓
- d. Que el enfermo hable.

Pregunta 13

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Con respecto al sondaje vesical es falso que:


Seleccione una:

- a. Se debe fijar la sonda vesical al muslo del paciente con esparadrapo para evitar retiradas traumáticas. **X**
- b. Si no se dispone de bolsas antirreflujo, no se deberá colocar la bolsa por encima del paciente.
- c. Una vez colocada se hinchará el globo con 10 ml de suero fisiológico.
- d. La postura para el sondaje femenino es en decúbito supino con rodillas flexionadas.

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Sobre la mascarilla laríngea Fastrach®, es cierto que:


Seleccione una:

- a. Permite el aislamiento definitivo de la vía aérea al pasar un tubo orotraqueal a su través.
- b. No existen tamaños para niños menores de 30 kg.
- c. Permite la posición neutra del cuello durante su inserción.
- d. Todas son correctas. **✓**

Pregunta 15

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Con respecto a la intubación orotraqueal, ¿cuál de las siguientes respuestas es incorrecta?:


Seleccione una:

- a. Debe ser realizada en un tiempo breve, menor de 30 segundos.
- b. Se deberá comprobar siempre la correcta ubicación del tubo orotraqueal. **X**
- c. Se deberá comprobar siempre el correcto estado del material, previamente a la realización de la técnica.
- d. Todas son correctas.

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

El transductor, en la canalización de una vía arterial tiene como función:


Seleccione una:

- a. Mantener la permeabilidad del catéter.
- b. Obtener una onda de pulso.
- c. Facilitar la medición de la PVC.
- d. A y b son correctas. **✓**

Pregunta 17

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Entre las ventajas que ofrece e acceso central por vía periférica, no se encuentra:


Seleccione una:

- a. Disminución de la tasa de infecciones.
- b. Permite infundir líquidos con mayor rapidez que una vía central.
- c. Genera menos complicaciones y de menor gravedad.
- d. Ofrece mayor comodidad al paciente. **X**

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

La fórmula para calcular el número del tubo orotraqueal en niños entre 1 y 8 años es:


Seleccione una:

- a. $2 + \text{edad en años}/2$
- b. $4 + \text{edad en años}/4$ **✓**
- c. $3 + \text{edad en años}/3$
- d. $4 + \text{edad en años}/2$

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

La colocación de la cánula nasofaríngea:


Seleccione una:

- a. Está contraindicada en pacientes con sospecha de fractura de la base del cráneo.
- b. Se puede colocar en pacientes conscientes.
- c. No protege contra la broncoaspiración.
- d. Todas son correctas. ✓

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Qué nombres reciben los rudos percibidos durante la toma de tensión arterial?

Seleccione una:

- a. Stamirnoff.
- b. Korotkoff. ✓
- c. Strogoff.

 d. Kotrokoz.

Final del formulario

[Finalizar revisión](#)

